





IOANNIS HEVRNII  
VLTRAIECTINI,  
*In Academia Leidensi primarij*  
*Medicina Professoris,*  
DE  
MORBIS PECTORIS

*ex Legato* Liber, D. *Gu: de Ruy*

*Editus post mortem auctoris, ab eius filio*

OTHONE HEVRNIO.



EX OFFICINA PLANTINIANA  
RAPHELENGI.

M. D. CVIII.





*Illustrissimo Principi*

M A V R I C I O,

PRINCIPI ORANGIÆ,

Comiti Nassouia, Ditzij, Viandæ, Cattorum, Moersia &c. Marchioni Veræ & Vlissingæ : Gubernatori Gelriæ, Hollandiæ, Zelandiæ, Vltraiekti &c. Præfecto Maris Belgici,

OTHO HEVRNIVS,

*defuncti parentis nomine*

IOANNIS HEVRNII,

*dedicæ consecratq̃.*



QVÆ DE MORBIS PECTORIS parens noster  
pax memoriæ scripsit, Inuicissime PRINCEPS,  
etiam tunc cum scriberet animo tibi destina-  
uit & inscripsit. Eius conamen ab inuida  
morte interruptum nos pro parte nostra, eius  
iussu, implemus, ad vestram aram hoc opus  
suspendentes. Nam ad quem, nisi ad te, Illustrissime PRIN-  
CEPS, hoc iret opus? tua in hanc patriam, & nos omnes qui  
in eâ, merita, omnem gratitudinem à nobis erga te requirunt.  
Cum enim viri boni officium sit, ut se omnibus virtutibus af-  
fectum esse cupiat, tamen nihil est quod magis studere debeat  
quàm ut & gratus sit & videatur. Quare ex grato pectore, Inui-  
cissime PRINCEPS, hoc tibi offerimus, patris nostri nomine,  
donarium, DE PECTORIS MORBIS: nam tuo pectore, in quod  
tot Illustrium Generosæ NASSOVIÆ stirpis Heroum, proaue-  
rum tuorum, virtutes confluxere, nos contra hostiles insultus  
defendis. Tales tantæque tuæ, Illustrissime PRINCEPS, sunt  
res gestæ, quæ loquuntur quod post natos Principes Ducesque  
te in bellis consilio prudentiorem, fortitudine clariorem soli  
non vidit, certè patria nostra non habuit vnquam. Tu ad salu-

rem Batauiæ, imò Belgij totius, natus. Bellorum incendio antea circumdati eramus, iam tranquillo in otio quiete fruimur. Intimos patriæ nostræ recessus antea bellum vrebatur, nunc irritâ flammâ margines lambit. Hæc tua illustria, Illustrissime PRINCEPS, gesta, pertinax posteritatis memoriâ viribus æternis comprehendet. Quin præter hæc tua in Batauiæ omnes incolas merita, trahitur & ab alia ad aram tuam hoc opus cathena: excellenti nimirum tua in nobilioribus disciplinis peritia, & erga eas amore. Tanta enim tua, Inuictissime PRINCEPS, in Mathefi excellentia, ut iure dubitari possit Martis potius an Musarum alumnus censeri debeas. ut magni illius Romanorum Imperatoris Iulii Cæsaris vocem, Veritate applaudente, usurpare queas:

Apud  
Lucanum  
lib. 10.

— *media inter prælia semper,*

*Stellarum, calig. plagis superiùs, vacauit.*

Sed non vltra in laudum tuarum hoc campo prouehor, nec ad intimos recessus penetro. Sed ut sacra cum silentio potius quam plausu spectamus, sic tuas ego virtutes, tuasque illustres res gestas: de quarum ne quid magnitudine orationis tenuitate deterram metuo potius, quam eas me verbis exæquare posse, confidam. Hoc igitur munus serena fronte, Illustrissime PRINCEPS, excipe, tamquam animi cultusque HEVRNIANÆ familiæ erga te pignus: quod illa nomine I. HEVRNII, olim (ô fatum durum!) patroni sui, fidissimi que EXCELLENTIÆ vestræ Medici, tibi dedicat & consecrat: rogans ut vltimas has eius reliquias eadem benignitate amplectaris quâ ipsum viuentem solebas: easque Illustri tuo tutelari numine contra maligni lioris dentem defendas: & benefico tuo fauore, nunquam ab Illustri NASSOVIA stirpe indigis negato, HEVRNIANAM familiam foueas & erigas. Deus Opt. Max. Illustrēm EXCELLENTIAM vestram ad veræ Religionis tutelam, Prouinciarumque confœderatarum incrementum ac gloriam æternum incolumem tueatur. Ex Academia Leida in Batauis, ANNO CIO. 10. CII.

IOHAN.

IOHANNIS HEVRNII  
VLTRAIECTINI  
DE  
PARTIVM SPIRABILIVM  
MORBIS.

CAPVT I.

DE ANGINA.

Nomen.



YNANCHE nomen à  
suspendij similitudine  
habet, quòd non aliter  
atque laqueus præfo-  
cans interficit. Nam, vt  
autor est Suidas, ἄγχιον,  
cum accentu in penulti-  
ma, celsus, id est, laqueus est : ἄγχιον verò  
ipsum actum denotat : vnde Græci ancho-  
nas, inquit Cælius Aurelianus, suspendia  
vocauerunt. Siue quòd synanche spiritum  
continento, spirationem neget. Nam  
Græci σνινχὴ continere appellât. Alij ve-  
rò cynanchen vel lycanchen hanc passio-  
nem vocauerunt, à canibus & lupis: siqui-  
dem, ob ingluuiem, frequenter hæc ani-  
malia afficit. quorum etiam similes voces  
siue vlulatus in hac passione constituti,  
cum præfocari cœperint, emittunt. Quin,  
inftar horum animalium, interdum ob  
phlegmone magnitudinem lingue, etiam  
& maxillarum, linguam extra dentes pro-  
ferunt. Latinis Angina, ab angendo dici  
videtur. præceptis enim & anceps hoc vitii  
est, ac quasi laqueo iniecto homines ene-  
cans. Est autem vera Angina, dolorifica  
strangulatio & orthopnoea, quâ facit phle-  
gmone musculorum propriorū laryngis, à  
rhumate acri & tenui cōcitrato è capite, ad  
vulvæ vsq. laryngis, vnde prohibetur ad-  
itu spiritus, quem ducendo vivimus, & su-  
midus vapor exitu. Dico me hic definire  
verâ anginâ, quæ phlegmone est soboles.  
Alioqui cum fauciu gulæque partes aded  
insurgūt tumoris, vt summæ gulæ gut-  
turisq. partes quasi ab his ocludantur, spi-  
ritus & alimentij vias ferè interceptantes,  
etiâ angina vocatur. Etenim ἄγχιον  
hoc est ἰσθμὸς, hoc est epiglottis, ab ἰσθμῷ

ludis verbum, quod ad agioni locum dedit,  
ἰσθμὸς deducitur, quo nō optimè valen-  
tē vitâ ducere significât Græci. puto quòd  
Isthmiorum ludorum tempus esset in ἰσθ-  
μῷ, morbidum & pestilens, ob confluen-  
tem Græcorum multitudinem. De his  
iam non ita agimus, sed maxime de vera  
Angina: qui enim atrocissimi huius mor-  
bi medelam nouit, facile etiam mitiorem  
abiget. Dixi in definitione, hanc esse do-  
lorificam strangulationem. nam est spi-  
ritus compressio, vt rectè scripsit Aretæus,  
ab oppressione laryngis & œsophagi. Ta-  
le malum sæpe orthopnoeam iunctam ha-  
bet. Dixi esse phlegmonem musculorum  
laryngis propriorum. nam hæc angina est  
peracutissima, alioqui etiam alij laryngis  
musculi, qui communes dicuntur, & vt  
ait Aretæus, tonsillæ, epiglottis, columel-  
la, fauces, summa pars asperæ arteriæ, lin-  
gua & maxillæ cum phlegmone occupantur  
valida, etiam anginam adferunt, sed non  
tam præcipitem. Dixi, vnde prohibetur  
aditu spiritus. nā larynx vtepi glottis clau-  
ditur tumore ac opprimitur. Hæc clausio  
est hic morbus, causa eius est tumor phle-  
gmonodes: propterea huc cuncta remedia  
diriguntur, vt nimirum id, quod compri-  
mit vel occludit laryngem abigatur. Dixi à  
rhumate acri & tenui. nam pituitosa ef-  
funduntur ad gulæ solum vasa: sed bilio-  
sa ad gulæ & ad gutturis etiam vasa: sunt  
enim angustæ venæ laryngis, id est guttu-  
ris: at gulæ venæ, sunt latæ. Et quia à rheu-  
mate nascitur, propterea subito ingruit hoc  
malum. Hæc de definitione. Morbus hic  
est angustia laryngis, & vnâ œsophagi.  
Hanc verò facit phlegmone harum vel  
vicinarum partiu. Nascitur autem hæc phle-  
gmone

ἰσθμὸς  
ἐστὶ  
quid.

Definitio  
enquirit  
angina.

4. loc.  
aff. 3.

aph.  
16.

CAV.  
SAB.

gmore ex concitato rheumate plerumque  
aeri & tenui, sanguineque à bilioso, & etiā  
à pituitoso. Sed exquisita angina est à bi-  
lioso sanguine, indeque nascitur inflama-  
tio erysipelatos, vel erysipelas phle-  
gmonodes. Irruit sanguis à toto capite &  
e ceruice, malum nostræ regionis sequens.  
Cum enim mera phlegmone ibi in vitio  
est, à iugularibus tunc magna sanguinis ir-  
ruit copia, & Galenus asserit, omne rheu-  
ma, quod auihor est anginx, à capite ad  
iugulares venas ferri. Atrocissimi namque  
angina nascitur à sanguine bilioso, sobole  
ardentioris hepatis. Sed illud obseruabile,  
Anginam generaliter sumpnam Hippocra-  
ti significare quicquid triangulandi vim  
habet. Atque eidem tres anginx sunt spes-  
cies; prima in triangulatis laqueo, de qua  
secundi Aphorismorū, quadragesimo ter-  
tio. Altera à luxatione vertebrae ceruicis,  
in anticam vel posticam partem, vel in la-  
tus alterutrum: vertebrae inquam primæ  
& secundæ, quibus maximè dorſi medul-  
la comprimitur. Tertia est ab inflamma-  
tione, de qua hic loquimur: hoc est, à tu-  
more præter naturam, cum rubore, pulsu,  
& cæteris talibus, à sanguinis synceri aut  
biliosi affluxu. Cuius quidem ratio multi-  
plex est, à causa, essentia, parte & acciden-  
tibus. Quia aliquando incidit ab orgas-  
mo, vel attractione, vel exclusionē partis  
quæ continet, in eam quæ continetur.  
Materia aliquando est crassa, aliquando  
tenuis. Si crassior fuerit, in faucibus ea  
consistet. Hinc est quod Hippocrates asser-  
at, hybernas anginas esse longiores, au-  
tumnales verò & æstiuas esse breuioreſ:  
Quod hæc superatis faucibus, in interiores  
venulas, materię suæ tenuitate penetra-  
runt, quæ laryngis musculos alunt. Hæc  
autem, quæ ab inflammatione incidit An-  
gina, Hippocrati est triplex: vna laryngis,  
quæ maiorem spirandi adfert difficul-  
tatem, & propriè dicitur Hippocrati *αἰσθη-  
σις*: est inflammatio duodecim proprio-  
rum musculorum laryngis; & est insana-  
bilis, eius signum pathognomoniceum est  
orthopnoea cum valido dolore, sine calo-  
re, colore, & mole præter naturam appa-  
rente. Altera, faucium, quæ glutinendi ma-  
iorem difficultatem adfert, quàm spirandi,  
& dicitur propriè Hippocrati *ῥωδύτης*.  
Tertia est inflammatio exteriorum fau-

cium: cuius signum est rubor in ceruice &  
sterno. Alias tum Æginetæ tum aliorum  
distinctiones ridet Galenus multis locis.  
Nam vi materia fuerit tenuior vel crassior,  
ita dupliet idèa enascitur anginx. De  
recentiorum tamen distinctione, mox pau-  
cis transigam. Anginx biliosæ maximè  
proueniunt autumnis: quod acerrima tunc  
renouatur bilis, quæ gentia erat per æsta-  
tem, at pituitosa, vere fit, quia hyeme ge-  
nita, tunc mouetur & in musculos cerui-  
cis ruit. Auicenna asserit ex pituita calida  
(nimirum salsa, eam gigni interdum: quin  
& ex frigida; scilicet insipida, cum putre-  
scit pituita: & quæuis, inquit, hoc qui-  
dam negarunt, ex melancholia. Notha  
angina est citra phlegmonem: cum fuit  
quidem ad laryngem pituita, sed non ad-  
fert phlegmonem, quin hæc nascitur inter-  
dum à crasso pituitosoque nutritu duo-  
decim musculorum laryngis propriorum:  
nam hi indureſcunt, ac laryngem premunt:  
hoc etiam fit à causis quibus areſcit gut-  
tur, hoc malum interdum integro durat  
anno. Et à colli luxis venterbus notha an-  
gina prouenit, si inflammationis sit expers  
luxatio. Colli autem vertebrae inflamma-  
tionem adferunt, quia laxatæ sunt: vel lu-  
xantur, quod vicinæ illis partes inflama-  
tæ sunt, nam dolor in se trahit rheuma.  
Luxantur itaque, tractis in sympathiam,  
faucium inflammatarum, neruis & liga-  
mentis: aut communicato tuberculo. Et  
in hac inflammatione, fouea apparet in  
ceruicis postica parte. Rara est hæc an-  
ginæ species: vix eam vides nisi in tenera  
ceruice prædiis, vt in pueris, dum durius  
à nutrice tractantur. Galenus quartii Apho-  
rismorum trigesimo quoque, Cum, inquit,  
nihil apparet, nec deglutire potest, sympto-  
ma id perniciosum est, ob inflamma-  
tionem musculorum stomacho substrato-  
rum: interdum ad stomachum ipsum. An-  
ginæ occultæ causam referebat Arehige-  
nes ad affluctum neruorum qui ad stoma-  
chum deferuntur, cum calida falsaque flu-  
xione occupantur. Occasione à foris  
interdum habet, vt si quis sub Ioue frigi-  
do somnum ineat, huic nonnūquam sub-  
itò faucium viæ intercipiuntur, raptim ab  
expressa materia è iugulatis venis. nam,  
vt auihor grauissimus scribit Aretæus, re-  
frigerationes magis, exustiones minus in  
causa

4. De  
caus. pul-  
s. & 1.  
aut. 13.

4. aut.  
30.

Quid  
Hippo-  
crati  
Angina,  
& quæ  
triplex.

1. Epid.  
2. in fine

4. aut.

4. loc. off.  
& 44.  
aph. 39.  
aut. 10.  
6. Epid.  
7. 2. E-  
renouatur  
bilis, quæ  
gentia erat  
per æsta-  
tem, at pitui-  
tosa, vere fit,  
quia hyeme ge-  
nita, tunc mouetur  
& in musculos  
ceruicis ruit.  
Auicenna asserit  
ex pituita calida  
3. aph. 23.

Notha  
angina.

1. Trar.  
rhet. 2.  
11. &  
4. aph.  
31.

1. aph. 16

Externa  
causa.

causa esse solent: frigida potus, ebrietates, saturnitates. Provenit etiam à nimia violentia, vel nimis potatione, aut exclamatione vehementi, quam monotonon vocant Græci, vel etiam ex acrioribus cibis præter consuetudinem acceptis. Id etiam possunt feruentia & ignita medicamina pota, purgatio per elæborum prouocata, menstrualis purgationis retentio. A fungus etiam, & a venæis siccandi vi præditus, ab vna taminia, & solano maiori. Solanum id Itali vocant *Herba bella donna*. Sanè huius bacca devorata, & ipsa radix, hæc vi strangulandi pollent. Et ioci causa parasitis exhibetur radix his, qui ad lautas mensas etiam inuitis dominis accedere solent in aula: quæ res oblectamenti non parum conuivialibus adferre solet. Siquidem si cultello dextra, & scriptuli pondere in vini sefancia maceretur, horis ad summum duabus, & deinde percolato diluto ac digius pressio, id vini recentis addatur quod poculum repleat, totumque potandum propinetur, si paulo post vi qui biberint, nihil prorsus edere possint, magno spectantium oblectamento. Verùm qui hoc fuso viuunt, prorsusquam mensæ assideant, parasitis ad ientaculum inuiant, ut sucatum vinum propinent. Discutitur fucus, à risu, aceto potui dato: id enim præsentaneum antidotum est. Sed ne quid nimis: nam copiosius sumpsum strangulat. Aconitum sumpsum strangulat. Ceraforum largior usus postrema in mensa, anginam adferre potest. Præterea iustus, anisæ faucibus hærentes, acus, ossiculorum ad fauces adhæsus. Magis affligit viros quam mulieres, magisque iuuenes quam alios: nam hi tenuioribus circumfluunt succis. Differentiæ anginarum maximè petuntur à loco affecto, & causa efficiente. A loco affecto. Nam peracutissima ac vera angina hæc est, quæ nascitur ex duodecim priorum laingis musculorum (qui efformandæ voci dicati sunt) phlegmone. In hac, nec iniuriæ, nec foris rubor aut tumor notati potest: & tamen promptè enecat. Et hæc videtur ea anginæ species de qua Aræteus, ubi collapsionem adesse instrumentorum ait, & strangulationem vehementem: ut ipsismet in pectore latentibus patibus circum cor atque pulmones abdita esse inflammatio videatur. Et *Συναφ-*

*χλω* hanc proprietate dici ait, quasi *συνω-*  
*σται* *ἰδὲν* *ἔξ* *ἀγγύων*, hoc est, interius ver-  
geneticus & angenicus. Ego verò existimo,  
inquit, solius spiritus id vitium esse, ad  
calidissimum siccissimomque conuersi,  
nulla corporis parte inflammatione labo-  
rante. Id autem mirandum non est: nam  
in Charonæis strangulatus, circa vllum  
corporis affectum, acutissimi contingunt.  
Imò vel vnta inspiratione, priusquam  
corpus aliquod maleficium contingat,  
moriuntur. Quin etiam & à rabido cane,  
qui in faciem, dum spiritus adducitur,  
tantummodò inspirauit, & nullo pacto  
momi derit, in rabiem homo agitur. Ego  
sanè phreniticum iam phanaticum reddi-  
tum, qui septem diebus *κακὸν* *ἔξ* *παραλ-*  
inuens quousvis inuadebat, à fatis secui,  
nec vllum vsquam phlegmonem vestigium  
deprehendere potui. Corpus hoc athleno  
æra robore & habitu, constantisque æta-  
tis, vini vsu rigatum calore. Sunt itaque  
Aræteoduz anginæ species. vna, cum tu-  
more ingenti ac robore tonsillarum, & for-  
ris versus: quin etiam interdum, inquit,  
lingua, gurgulio, cæterisque partes in tu-  
morem efferuntur. Altera efficitur, illis lo-  
cis collapsis: sed interius compellio mai-  
ore strangulatu discruciat, ut interna in-  
flammatio ad cor vsque pertinere videatur.  
Sæpe dubitanti num illa symptomata, quæ  
de occulta illa angina narrat Aræteus, ori-  
tur ab inflammatione eius nerui, profe-  
rò magni, qui enatus ex vertebri colli, ac  
per pericardium elatus, vnà cum illo pe-  
ricardio diaphragmati impliatur. Sciunt  
enim illi qui anatomica trāsant, pericar-  
dium & diaphragma consocialia & iuncta  
ad eò esse, ut vi dicas, num hoc ab illo, vel  
num pericardium à diaphragmate nascatur.  
Adnexio vel symphytis illa pericardij ad  
diaphragma, æquat quattuor digitos si ferè  
amplitudinem, ad sinistram si ab offe ster-  
no abeat, & ab ipsa ossis sterni superficie si  
duorum digitorum latitudine deflectat.  
Hinc, valida illa symptomata nasci posse  
quis dubitet? Talis antiquorum medi-  
corum anginæ distinctio erat. Imò, in-  
quit Traillianus, antiqui medici om-  
nem circa gulam phlegmonem, siue in-  
tus, siue à foris, suffocationis metum  
adferens, synanchen nominant. Pau-  
lus verò, Aethuaria, & cæteri ætæ

Historia.

Herba  
bella do-  
na vni-  
tam na-  
rasini.Differen-  
tia.à loco af-  
fecto.Aræteus  
angina  
mirabilis  
lib. 1. de  
causis &  
signis an-  
torum 7.Reueren-  
tiam dis-  
simul.

rici hoc modo interstinguunt: Si interni musculi laryngis inflammantur, *κωρυζή* vocant illum affectum, si exteriores, *κωρυζή*. Si internæ fauces inflammantur, *κωρυζή* nominant: si exteriores, *κωρυζή*. Latini omnes hæc species vna voce Angina expriment. Quamvis autem exquisitissima angina illa est, cum duodecim proprii laryngis musculi phlegmone occupantur: attamen cum cæteræ in faucibus & ad laryngem, asperam arteriam & œsophagi superioris posticæ partes omnino inflammantur, anginam etiam non exquisitissimam adferunt. Ita œsophagus muscularis, qui, circa laryngem, œsophagum ambr, deglutitioni opitulans, ac vtrique necitur lentiformis cartilaginis lateribus, subduiturque vna cum œsophago, quem ambit, asperæ arteriæ; hic, inquam, si inflammetur, calamitatem adfert, deglutitionem enim nullam admittit. Quin ad latus forisformis cartilaginis, foris spectans, glans sita est vtrique pollicis magnitudine, incipiens à capite asperæ arteriæ, totum latus laryngis, & œsophagi ibi positi partem, tegens. hæc si phlegmone occupetur, anginam etiam proferet, sed non adeo funestam: quod enim longius abest à larynge, eo securior. ab his in faucibus tumor & rubor apparet. Aliæ præterea sunt quedam glandulæ intus in faucibus posticæ, vtrique ad latus gargarconis, antixadas & amygdalas appellant, vbi magna inflammatione tentantur, anginam faciunt. Tertium etiam genus quoddam est glandularum, quod sub inferiore maxilla faucibus apponitur: & vsque ad aurem pertingunt, & spacia illa replent. Appositæ sunt hæ glandulæ vtrique illis muscularis qui (vntique vnus) oriuntur à clavicula & circa os pectoris, duplici nimirum initio, & inseruntur vtrique in os mastoideum, hic ad claviculam tendinem habet latè se pandentem, optimè hic depingitur in Plantinianis tabulis à Valuerda editis, paginæ trigessimæ nonæ, liera A notatus. foras vergunt his concepti affectus. Quin aspera arteria, inquit Galenus, inflammata strangulat, ob tunicæ eius tenuitatem. Veram anginam simpliciter nomine vocat Hippocrates *κωρυζή* alteram illam, quæ est communium muscularum laryngis, *κωρυζή* & hæc degenerat in

pleurindem; vera autem angina, in pulmoniam. Altera hæc Hippocratis, est sex communium muscularum laryngis; prodi ferubore in ceruice, & in sterno interdū. Aurelianus hæc breuiter ita interstinguit. alia est sine manifesto indicio, alia cum visibili & manifesto, alia intra ois spaciū, alia exterius, alia ex viroque. A causæ efficientis varietate etiam variæ differentiæ ducuntur. Sanguis enim qui hunc tumorem facit, modo bilefcit, modò pituitescit, sanguinea ac biliosa materia, exquisitam anginam facit: pituitosa, veram. Varia est etiam ex eius motu. Scribit Hippocrates aliquam anginam quarto die internecionem adferre. hæc peracutissima est. Sed subdit, hanc diem interdum ab angina superari: nam excurrit ferè ad septimum: diciturque peracuta. Quin vltra septimum nonnunquam abire hanc affirmat: appellatur hæc acuta. Proprieta scripsit Autecenas hanc interdum proferri in 40 diem. Proprieta Aurelianus scribit hanc passionem esse celerem, vehementem, acutam, & sæpissimè continuam: & aliquando intercapedinatam. Iam ad signa eius veniamus. *Signa.* Hæc in genere, anginam adesse probant: vel distinguunt eam à similibus passionibus: vel monstrant vt differat vera angina à notha: aut quænam eius sit species aperiant. In genere, inquit Aurelianus, quærela adest sine vlla ratione, & difficilis motus colli & gutturis, saluatio plurima, diffcultas transuorandi liquoris soliti. Cum peius increuit, linguæ vltra dentes ad exteriora prolapsio. auditas faucium. sedendi cupiditas, locutio confusa, cum dolore. Spirandi & deglutendi maior minorque difficultas, pro affectus magnitudine: nam in omni angina aliquo modo hæc percelluntur ambo. Et dolore etiam adest in vera angina, nam phlegmone iungitur. Cum vero à duritie musculorum, vel à pituita sine phlegmone concipitur, doloris est expertus: nam non violatur vniò partium, quæ violatio, omnis doloris causa est. Facet, inquit Areæus, inflata est, & rubicunda, oculi ceteri rubent: in vera angina, tensionem sentiunt, inquit Actuarius. *Vbi sit.* Sed vbi huius sedes sit, iam zimmerus, & quænam phlegmone obfesse sint. Si inflammata fuerit aspera arteria, respiratio maximè sangabitur, minus deglutitio, quænam

*Difficilis motus colli.*

*Difficilis motus colli.*

*A causæ efficientis.*

*A motu.*

*Signa.*

*In genere.*

*Vbi sit.*

quamvis hæc etiam ægræ officium suum præstabit, nam œsophagus asperæ arteriæ subest proximè, & vndique eam tangit. Cum verò ad œsophagum vergit phlegmone, deglutitio maiori molestia peragitur. Cum interni, hoc est duodecim laryngis muscoli fuerint inflammati, nihil apparet, nec foris nec intus vlla coloris aut molis mutatio: nam phlegmone non ferit has quæ foris sunt partes. oculi rubent, & vertuntur: ac his qui strangulantur, vox impedita nihil significat, hiant aperto ore, & lingua exerunt, audiunt obscure, iactant se. dolor acerbissimus adest, sed, inquit Aræteus, strangulatione vexati, cum obscure sentiunt. pectus & cor ardent. frigidi aëris desiderium adest, nec aliter, quàm recta cervice spirant; spiritus sublimis, inquit Hippocrates, hoc est, cum summa difficultate attrahitur, elatio thorace, paulisperque omnibus eius musculis opemque ferentibus: arcumen admodum exiguum inspirant. collapsio, gracilitas, pallor comitantur, oculi concavi, fauces & gurgulio retrahi, tonsillæ subsidentes, vocis privatio, eodem die, inquit Aræteus, moriuntur. Et hæc est biliosa vel sanguinea: nam sanguis pituitosus aut melancholicus, ad parvas illas laryngis venas abduci nequit. Si inflammatio confederit in externis laryngis musculis, foris calor & color ruber id significabunt. Dolor quidem acerbus aderit, non tamen tantus, quantus est cum propriis eius inflammantur musculi: nec ita anxie respirant. ante octauum diem hi non solent enecari. æger tamen non rectè loquitur: excurrit interdum in decimum quartum diem. Si glans illa magna, quam utrumque externum externum latus laryngis foritur vnam, inflammetur, mediam quandam anginam faciet inter hæc quæ musculorum est proprium laryngis, & inter illam, quæ occupat musculos eius communes, tumor aliquis deprehendi poterit, at parum ruboris. Non tantum periculi hæc habet, nam hæc glandes propè absunt à faucibus, ita ut in has transfundi materia possit. Si fauces interea ad œsophagum inflammantur, maximus committitur deglutienti labor, respiratio nō tam ægrè ducetur, porus etiam hic per nares remeare, & de pressa lingua fit tumor conspicuus. Rectè hoc Rases,

modò grauior, modò leuior est angina, pro transglutienti respirandi. difficultatis magnitudine. His itaq. iam dictis symbolis locum ægrum deprehendimus. Iam videamus quibus notis venemur causam efficienem hanc angustiam. Si fuerit notha angina, à pituita enata, non aderit dolor, nisi eo tempore cum deglutitioni operam dant: color erit albus, sapor salis; viscositas rigat ora, nec valida febris fatigabit: imò interdum febris erit hic morbus expers. Cum vera est angina, eaque à sanguine nata, atrox fatigabit dolor, sapor aderit dulcis: oculi, facies, & lingua rubebunt: interdum solennis euacuatio supprimitur: corpus triguum est à sanguine: victus vberimus in sanguinem: pulsus plenus & vndosus: venis sunt amplis. Maior hic dolor fatigat, quàm cum bilis hoc facit. irruens namque sanguis tendit nimium, ac violenter vnionem violat partium. quæ sola violatio, dum est cōgrua, author est dolorum omnium. A bilioso sanguine profectum hoc esse malum, denunciat mordens vehemensq. dolor: amarus adest sapor, color flauescit in homine illo. nihil tumoris elucet: tota vitæ ratio, ætas, temperies, regio in bilem conspirant. Hæc materia biliosa author est erysipelatis phlegmonodis, ac facile peruenit partes, siccat, luxat, strangulat. Si fuerit à melancholico sanguine, aderunt succi melancholici noxæ, color nigricans, sapor acidus, dolor stupidor. Sæpe in cancerum degenerat. hoc maximè fit in puellabus melancholicis, quibus refluunt menses. Nuper tres vidi, duas puellas, & vnam senescentem iam ferè, nuptam. Nigredo quædam ad epiglottida ferè appareret, nupta præglutienti difficultate perierat, aliis exedebantur œsophagus ac musculi sterni. hyoidæi, ita ut cibis per antelora profluere, ac ex his iugularibus hæmorrhagiis interiret earum vna. altera sensim exstabit. Nonnunquam dolor perennat toto anno: id non ab angina vera est, sed à scirrhuso tumore frigido, pituitoso, phlegmone experte. Talem hic sceminam vidi, quæ deglutire non poterit: quod illi laterale fuit. Pestilens interdum febris causa est angina, peripneumonix, parotidibus iunctis, non absque lipothymia. Cum misceantur symptomata absque excretionem, & dum excurrit

Signa  
causarum  
efficien-  
tium.

Hist. v. 14.

malum ultra quartum diem, plerumque ab initio in suppurationem, vi euenit in piruosis, dum foras nuntiat tumor. Perfecta ex mali natura, notas abigendi hoc colligimus. Hæc coarctatio causam habet prementem materiam. Hæc autem vel influcere iam incipit, vel iam influxit; aut partim influit, & partim influxit. Ratione materię fluentis, nascitur Indicatio eam reuellendi, & reprimendi modeste: ratione verò influxę materię, eam exhauriendi. Sin partim influit, partim verò iam influxit, vitæque remedia locum habebunt mixtim. Sed cautio tamen adsit, ne valide reprimas, ob vicinas nobiles partes, & meatuum, qui ibi sunt, periculosam (quæ inde nascitur) occlusionem. Sed, cum hoc malum ab influxu materię nascatur, studiosè prouidè habenda est de toto corpore. Quo modo fiat ea excussio, præclari docet Galenus secundi De Differentiis febrium decimo quarto. Sed æqueum ad nodelam pergamus, perpendemus num remediabile sit malum. quare iam quid suadeat Prognosis perpendamus. His indicationibus non facile satisfieri potest: nam summa est vis huius mali; etenim respiratio, quæ vita caret, nequit, maximè affligitur. Monet Aëtius, in ea mitescente interdum discrimen esse, translatò succo moribifico ad pulmones, unde inexpectata mors. Hoc accepit ab Hippocrate, qui ait: Si cynanche euanescat (sine signis & sine crisi; quæ nimirum cynanche constitit in communibus & externis laryngis musculis, & etiam in faucibus) nullo eiysipelas foris exoritur: (exclusa materia, robore naturæ, à larynge in ceruicem & stenum. sed vide ne te fallat effusa bilis, quæ eò prœcipit, nec abit eius pars à larynge: hoc dicitur & dicitur in ducendo spiritu dicenti) nec exsiccatò putre \* *epelas mai dicitur*: (nam hoc est sine crisi euanescente. his restituitur quidem libertas deglutienti, sed suspecta sua bona habere debent:) neque diebus criticis (nam excretionē hic tumor residere debet, aut certe metaplasiam habere debet ad ceruicem & pectus, idq. diebus criticis,) mortifera est: (translati humoribus è faucibus in laryngē, unde cito mors, eodem ipso die quo hoc euenit, interimens. nam hæc angina, primigeniā verā crudeliore est, ac citatiore morte funesta) nonnunquam in

empyema iam enabit. Nam, si qui Hippocrates, eiysipelas inus foras conuenit, cum nimirum relicto priore foco, à natura vi expellitur, non autem à perenni fluxu humoris noui, superflue priore morbo) eodem modo: (nam vindicatur ab iniuria larynx & œsophagus:) at foris intus, mortificum: (nam spirabilem partem pectoris & conueniam labefactat, ac vltimè eam intercepti, unde cito mors venit; & in larynge iam enata vis moris materię moribificę acris ac tenuis, unde noua angina.) tunc enim pectus opprimitur, ac difficilius spirat æger. (Quare suppurationē aspectabilis tolli omnem suspensionem palindromes.) Itaque sine tumore, aut expectatione bene procedente, et si siglas aut rubor si euanescat, malum. Tibus autem de causis intus recurrit, aut materia malignitate, quam contraxit primo foco, vel eo loco in quem decubuit: vel empyreum aie suspensum in internis partibus: aut chirurgi, adhibentis repellentia, infectiā. His modis sine euacuatione euanescit: am per dicitur dicitur subitò non exhauritur tumoris materia. Vi autem locus inflammatione obfessus facit, aut non ita facile spiratioem intercepti, ita variè pericula & securitatem denotat. Præterea vi materia moribifica fuerit conuacuata ac tenuior acriorque, ita plus periculi aderit. Videamus ergo & explicemus Hippocratis sententiam de locis his obfessis inflammatione. Is ita, Anginæ terribiles maximè sunt illæ, celeritèque hominem de medio tollunt (interceptione respirationis) quæcumque in faucibus nihil, neque in ceruicibus aspectabile relinquunt (inflammatis nimirum duodecim propriis laryngis musculis: quorum venulas, superatis faucibus, subtilissimus accerrimusq. subitò humor. Nec aspectu inflammatio sentiri potest, ideoque curatu est difficillima, nec citam inde facillè quid expui potest. nihil mutatum apparet in colore, calore, aut mole.) Saxuissimos autem hæc, inquit Hippocrates, dolorum excitant, (quia isti muscoli accerrimo sunt sensu præditi: & magnitudinem phlegmones denotat talis dolor:) & suspiciosos anhelitus (ita vi nō nisi recta ceruicē spiritum ducere possit, ob summam laryngis angustiam, decubendo enim opprimitur larynx, iam in angustum adacta ob phlegmo-

Indicatio  
mes nura  
tma.

Prognosis  
fi.

Qua pa-  
riethi ad  
includen-  
tur. sunt  
Hippocra-  
ta verba.

\* Facillè  
& indolenter.

3. Progn.  
16.



phlegmonem.) tales autem eodem ipso die quo inuaserant strangulant, & secundo, & tertio, & quarto, ad summum quinto die, quod anginosæ mulieri euenit. quasi dicat, peracutum malum, ut quod primo quaternario finitur. Huiusmodi ponit signa: fugiēs conspectum, doloris vim, & orthopnoeam. Quæ verò anginx ceteræ, parem doloris vim adferūt (obfessi inflammatione musculi fauciu, æ quali sensu præditis) sed tamen intumescunt, inquit Hippocrates, & fauces rubore suffundunt (quod earū materia crassior sit, à materia nitrosa catarrhali, & consistat in faucibus, nec tanta sit difficultas spirandi, sed deglutienti maior.) perniciosæ quidem valde sunt illæ (doloris acerbitate, à perenni catarrho nitroso è capite fluente: & tandem successione veræ cynanchæ per transitum. Sic enim perit Bythonis cynanchica quinto die: quæ prius verè non erat in rubore ceruicis & sterni: *ἀνδρῶν*, inquit Hippocrates, *καυκὺν*.) sed tamen diuturniores iis, quas ita descripsimus: (nam nō tam citā inuenit mors, nec semper omnino conelamatur hic est. Nam sputo purulento multo & transitu materię purulente ad ceruicem & pectus, multi sic anginosi morbo defunguntur. Quinetiam medicinæ locus est detractio sanguinis à brachio, sub lingua, clysmis, gargarismis, litu, hapso, cucurbitulis. Quod Hippocrates faciendum præcepit, ipseq. adeo factitauit. Diuturniores sunt hæc anginx: quod non tam in propinquo mors est deglutienti vacuitate, quàm respiranti.) præsertim si fauces insigniter rubeant. (ex quo significatio sit crassioris materię quæ in faucibus subsistit, nec laryngis venulas subire potuit. Rubor est argumentū materię quæ in venulis fauciu subsistit. Si tamen hic rubor nō sit à propagatione eò morbificæ materię, manente priori foco in propriis musculis: nec fiat metastasis, fauciu inflammatarū, ad ipsam laryngem: nā hi eodem die moriuntur. Vnde hæc suspicio absit, dicit Hippocrates hic, *ἢ τὸ ἐγγὺς καὶ μακρὸν*: hoc est, si maior assurgat tumor & rubor. hæc itaq. vox tollit omnē *τὸ ἐγγὺς καὶ μακρὸν* suspensionē.) At verò, inquit medendi præceptor, quibuscumq. vnā fauces & vnā ceruicis insigniter rubent, (non per propagationem causæ morbificæ, sed per citā exclusionem inus foras, non expectata

inueieratione morbi, quæ facit corpus infirmum. fauces primum à catarrho rubent & tument. Ceruix rubet per diadochen erysipelatis ad msculos qui à ceruice feruntur circumpectantes gulam, & ad latera cartilaginis scutiformis,) huiusmodi, inquit, anginx sunt diuturniores: (quia toleranter feruntur, nec tantus in deglutendo labor, ac penè nullus in respirando, nec tanta doloris crudelitas, quæ & citò vires exoluat, & citam miseramq. adferat mortem. Ipsa verò erysipelatis materia mansuescit pepasmo & expurgatur: modò per epigenesin non oriatur ceruicis & sterni erysipelas, ut in cynanchica illa Bythonis: sed per metaplasin firmam & stabilem in ius foras, quæque nullam habet palindromen foris intrò. Sed quod materia iam translata sit in partes exteriores, & quod in promptu hic sit curatio. Tres enim, ut hoc obiter repetam, sunt Hippocrati anginx species ab inflammatione: vnā, quæ est inflammatio duodecim propriorum musculorum laryngis; & est insaniabilis. Eius autem signum pathognomonicum est orthopnoea cum valido dolore, sine calore, colore, & mole præter naturam. Altera est inflammatio faucium interiorum. Tertia, de qua hic iam ex Hippocrate ago, est inflammatio exteriorum faucium: cuius est signum rubor in ceruice & sterno. Quod autem scribit Hippocrates in Aphorismis, anginam transire in peripneumonia, & die septimo occidere, nihil repugnat ei, quod dicit in epidemiis notationibus, anginam abire in pleuritidē. quia in Aphorismis intelligit de prima specie anginx: sed in Epidemiis de tertia hac specie, quam nō simpliciter anginam ibi appellat, sed cynanchicum affectum. Nam gutturalis angina metaplasin habet vnā in pulmones, vnde peripneumonia, quæ vel intra septimū diem monifesta est, vel intra vigesimū in pus mutatur. At faucium angina, quam vocat Hippocrates. *καυκὺν ἰσθμικόν*, cōuertitur in latus *καὶ ἰσθμικόν*. Maximeq. nōnulli ab eis euadunt, inquit Hippocrates, si & ceruicis & pectus rubore persusa sint, (nā quod propius abest malū à viā respirationis, eò plus periculi habet: quod longius, minus.) Pectus rubescit ad supremam sterni partem, vnde prorumpunt duo musculi ad basin cartilaginis scutiformis. Euadunt

Tres angina species Hippocrati.

Dubium.

6. apb.

hi pe-

3. Epid.  
2. 7.

3. Epid.  
2. 5.

4. lib.  
deut. 6.  
6. Epid. 7.

hi pepasmo : nam medicinæ hic locus est, tum quia in promptu sunt partes oblesæ, tum quia induciæ dantur à morbo. ) nec erysipelatis fiat intro refluxus. talis recursus est damnosior priore affluxu. Nam sæpe prior effusio est humoris mitificabilis: palindrome verò semper sociam habet feritatem humoris refluui : nã is propriæ substantiæ corruptione in vitio est: nam cunctando computruit. Fit autem palindrome, superstitie adhuc phlegosi & empyreumate venenato partis oblesæ, vnde cita attractio & impetus materiæ tenuis & acerrimæ. Quare ex hoc Dictatoris decreto, in hoc casu, admonemus etiam nunc extra curationis repagula liberè, ne chirurgus adhibeat repellentia : nam talis decubitus est criticus : sed materiam foras euocabit. Non enim licet in inflammationibus quæ ratione critica fiunt, vel quæ à materia venenata, vel quæ in glandulis decumbit, adhibere repellentia. Vt hæc breuiter repetam : Recurrit intro humor triplicide causa, aut materiæ malignitate quam contraxit primo foco, vel eo loco in quem decubuit: vel empyreumate superstitie in partibus internis vel foco : aut infecta chirurgi adhibentis repellentia. Quibus autem cyananche, inquit Hippocrates, ad pulmones abit (vnde orthopnoea peripneumonia) alij quidem intereunt septem diebus: (hoc est primis periodis : à prægrandi peripneumonia extincto oppressoque calore cordis.) alij cum enaserint hos septem dies, purulenti fiunt. euadunt vi vegeta naturæ, ac Augusto quoddam sint pectore, nec à materia ita fera quoddam affligantur, empyre hi fiunt viginti dierum spacio : nisi expectoratum commodè his processerit. Præterea, inquit Hippocrates, Quibus à forti strangulatu facies excrescuntur, calamitosum id est. Fit hoc propter resolutionem partium excretioni dictatarum : & à forti oppressione laryngis, cum quæ obnixè epiglottis gl'osidi, hoc est timæ ayteneoidis carilaginis affigitur : vnde vapor & fluans deorsum tristes sepium transfusum comprimit, vnaque musculos ventris, exclusi omni socum dicates. Deinde ait, Anginosi tumores in lingua clam euanescentes : calamitosi. (ob recursum in laryngē.) Quin etiam dolores sine causa sedau, mortem citam resistantur. (nam his mens ægrotat,

& sensus amissio est in parte afflicta.) Et Anginosi qui pepasmo mitigata citò non expuunt, desperati sunt. Præterea, si nulla sit angina veræ leuatio, superueniat autè cephalalgia prægrandis cum febre (superstite anginae foco, cum pari doloris acerbitate ac orthopnoea) sunt desperate salutis. (ob contagionem quam adferi larynx cerebro, vnde acerrataris hæcapite in laryngem funditur.) Maxima autem syntymonia est capiti cum larynge in hoc malo : nam exprimitur scutum à phlegmone gutturis in venas iugulares internas & arterias carotidas quæ secundum aspectum arteriarum procedunt ad caput, prius larynx furculos laryngi & lingua cum faucibus attingent, indeque subeunt caluani per foramen lacerum choanæ propinquum : Eò prorepunt hi humores feroci, vnde distenditur ac proritatur dura meninx : vnde prægrandis cephalalgia indeq. febris, incrementem semper iam angina. De vera angina ita Hippocrates in Aphorismis, Si cui febris impleto (in qua maxime iuuat spiritum ex facili ducere) strangulatio repente incidat (inflammata larynge, qua spiritus aditu ad cor prohibetur) sine faucium tumore, suessum. (vehementissimum symptomatum, & curandi impotentia. Et mox subdit, Si cui in signiter febricitanti (à doloris vi, obortà à laryngis phlegmone & partium imarum) repente collum veretur (luxatà vertebra, quæ cum occipite vertitur, est enim illi societas cum medulla, per ligamenta, nervos, & meninges, vnde vel ad latus, vel intus trahitur. Hinc secundo Epidemion inquit, Intro cauitas apparebat, in qua si quis tangeretur dolebat) ac vix deglutire possit, ac sine tumore, mortiferum. Nam secundæ vertebrae luxatio est valde funesta, validissimo enim vinculo occipiti nequitur; quo rupto, idu aut casu, comprimatur stomachus & larynx, præsertim si in anteriorem vel posteriorem partem luxetur : nam in alterutrum latus non ita periculosa luxatio. Quæ cum quæ verò inferiorem vertebrae, in alterutrum latus periculosior luxatio, quàm quæ in anteriore & posticam partem. Quæ luxatio angina facit, mortifera est : nam phlegmonem adducit: nec vllum dissolutum membrum reduci potest bonis & græuis, nisi primum sedata sit phlegmone. Vera itaque

Non repellendū.

6. Aph. 37.

5. Aph. 10.

4. Aph. 35.

atque exquisita cynanche, quæ est phlegmone propriorum musculorum laryngis, rapit hominem quarto die, imò tertio & secundo, & eodẽ quo inuaserat die. Quin, inquit Hugo Senensis, vna hora hominem necat. refert doctissimus Fernelius se vidisse horis octodecim sublatum, integris sensibus: ego vno die prostratum vidi. Sed ubi musculus sternohyoidei inflammatur, parum recedit ab eo periculo, nam non enecat nisi à quarto die. Est itaque & hæc enecata, nam interius musculus etiam hic calor communicatur. In ore inflammato minus periculo est. Abscessus ponit aures, inquit Aræteus, boni, si non tardè fiant. Pars anginæ obfissa & materia anginisera ad pericula vel securitatem plerumque conspirant. Periculosa enim angina est quæ à tenui accerrimaque nascitur bile: ab hoc periculo abest pituitosa: hæc enim à pituita est, mitiore succo, ac non premit ita laryngem; illa, laryngem torquet. ad eò ut si pituitosam cum biliosa committat, periculi expertus videatur. Tandem etiam symptomatum vis perpendenda in pulsu, spuma, & neruorum tractione. Mortis prælium adest, ubi suffocari incipiunt cum pulsu minimo & raro, qui deinde fiat crebrior & inæqualis. Nam in suffocationis initio, calor iure deberet recreari à frigore: languet inde virtus, ac extincto calore natio labitur pulsus in paruitatem & raritatem. sed cum ad mortem pergit, fit crebrior, quia æquare ea frequentia magnitudinem studet: sique inæqualis ob languorem summum facultatis, quæ iam immemor redditur sui negotij, & ocium affectat. Autemna cunctos in spasmodum ante mortem trahi affirmat. Præterea spuma, inquit, perniciem denotat, nisi admodum validus fuerit æger, & cibum petat. Color faciei viridis, cum graui febre fociata, periculi plenus: id enim loquitur cor æstuate ab intercepta respiratione. Sudor circa axillas ac pudenda frigidus, certus index mortis: quæ eodem die, vel saltem posttridie sequetur. Si, inquit Aurelianus, in exitium passio cœperit ferri, liuor vultus, vocis amputatio, gutturis atque pectoris stridor, reuersus potus liquoris, asphygmia, & quibusdam caninæ vocis sonitus, quibusdam oris spumatio. tunc necessarius mortis effectus. Sine tu-

more extensio atque subfessio colli inflexibilis, vultus & oculorum cauitas, frontis extensio, color plumbeus, spirationis difficultas plurima, imbecillitas, acutissimus mortis effectus. Saluarum fluor in crassitudinem coactus in statu si apparuerit, mala ostendit. Post statum verò salutaria pollicetur: aliàs enim plurimum præfocationem significat, aliàs laxamentum corporis. Si ex lignis spes salutis aliqua sperabilis affuerit, curationem aggrediemur. Omnisi breuissimè Orribasius ita curationem instituit: Trahatur sanguis: acribus viam. In clysmis: in inedia continetur æger: collo superda quod attrahat: succo ienu hordei, cum melle gargarit. Dein decocto caricarum cum hyssopo, origano, mariubio: lingat steruus cauinum cum melle: sit puluis per pannum exieris. Sed perpendamus singula accuratius. Sententia fuit Galeni quærit acuiorum trigessimis, phlebotomiam prædare ad salutem hæc facere: nam est affectus cum phlegmone, & vehemens: nam hæc arteriæ uelut euacuabitur materia. Heraclydes tamen Tarentinus eos qui perfrixtione synanchici fuerint effecti, phlebotomari prohibet, ait. iubet clysmis depurgari: cæteris verò omnibus ex qualibet causa synanchicis effectis, hæc adhibendam censet. Id reprehendens Cælius, inquit, factorum causa inquiri debet. Sed quam copiam sanguini abducemus? Archigenes, apud Aëtium, facta mediocri sectione, partitam sanguinis vacationem facit: damnat factam ad leipothymiam, vi perquam, in hoc affectu, promptam fluxio in pulmones ruat, & periculum maius adferat. Non itaque vnica vice id fiat, ne homo trahatur in syncopen, ne suffocatus homo inereat, nam in hoc affectu suffocationis metus semper adest. Repetite vices in sanguine abducendo hic mirum in modum profuit: ob rheuma concitatum, à quo subinde nouus sanguis in fauces sentit. propterea Trallianus secundò & tertio abducit; hoc est per *impugnatio* sanguinem auferre. Si tamen, inquit Autemna, fuerit valida ægri vis, copiosè vnica vice emitui poterit. nã est affectus acutissimus, qui negat inducias. Maxime id agendum in angina quæ vera est, suumq. quæ focum habet in duodecim propriis laryngis musculis, etenim tunc ceteri auxilij opus est: tale est

CYRA-  
100.

Phlebotomia.

Copia.

b b phlebo-

Num in  
ingravis  
datus  
agendum.

phlebotomia. Sed si non ita floreat vires,  
repenitis potius vicibus sanguis abducatur.  
Hoc auxilium etiam adhibendum ingra-  
uidatis mulieribus, postremis quoque men-  
sibus: sed ad trium vel quatuor vincturum  
molem. Hoc citra iniuriam sanus & san-  
ctus fieri. Licet enim pluri pabulo grandef-  
centi fortui iam opus sit, quia tamen san-  
guis iam pluribus mensibus his non efflu-  
xit, eo vberius postremis mensibus perfun-  
duntur: argumento est hoc, quo tunc tur-  
gent mammae. Quo tempore hic secan-  
da vena? Illico, reddito clymate, vel à glan-  
de: eodémque id fiat die, quò totum cor-  
pus vindicetur à plenitudine; vique, reuul-  
sione facta, pars afflicta recreetur à perenni  
quæ illi incumbat fluxu. Modum sec-  
tionis proponit Aëcius, qui vult ut me-  
diocriter foramen venæ inferatur: verum  
Aretæus iubet ut lata fiat sectio in vena,  
quò impetu maiore, & copiosior sanguis  
emanet, quò stragulatius solvatur. Sed hæc  
ex iudicio medici varianda; ex eo ut gra-  
uius fuerit malum, vtiq; vires ægri fuerint:  
præterea sanguinis consistentia ut est va-  
ria, nam quibusdam hominibus est ater  
fibrosus crassusq; sanguis, ut fuscis carnosus  
hominibus: alius salsus, ut albis ita tenuius  
vel amplius foramen venæ infligendum,  
quò commode exiliat sanguis. At quænam  
vena hic percutienda? Hic sanè hæreo: cau-  
sa est, auctorum discrepans sententia, ac  
ratio. Libro Hippocratico, qui quartus De  
victus ratione in morbis acutis, scribitur in  
brachiis phlebotomiam molendam esse:  
id omnes de Axillari vena interpretantur:  
Artes interdum saphaia pedis aperiunt.  
Rases ramen cephalicam percuti iubet.  
Rationem si consulas, varia videbitur. Hæc  
enim dicit cubiti potius venam solvendam  
esse quàm pedis: non enim solum, hæc  
secta, sanguis à toto abducitur corpore: ve-  
rum vna prolestatur aliquid à faucibus.  
Verum alia ratio iterum huic obnititur.  
Quòd excurrentem succum ad repagula  
reuocare semper docet incutere affectu rheu-  
matico. Fons autem phlegmone est re-  
cur, sanguinis nimirum officina. Sed eum  
collum obfedit phlegmone, an tunc secta  
in manu vel brachio vena, rheuma illud  
concretaum ad contraria flectitur? non vi-  
deretur: imò potius eò vocabitur. Nam vena  
cava in iugulum delata, primum in binos

magnos scinditur ramos, lævū & dextrum.  
Subdivisa denique in iugulares atque axil-  
lares distribuitur. à iugularibus dein exter-  
nis, laryngis vasa ortum ducunt. An igitur  
secta in brachio vel manu vena, nō sub-  
uehet sanguinem ad iugulares? si ita, an-  
non vicina laryngis pars dolore vexata ac  
calore rarior reddita prolestatibit maxi-  
mam sanguinis copiam? Quare ratio di-  
cat, ut ineunte malo, cum reuulsioni stu-  
demus, vena feriat poplitis vel malleoli,  
cuius sectio periculi est experta. Vbi ita-  
que irriguum corpus sanguine circum-  
fluit, siue hoc euenierit à solemini eva-  
cuatione aliquis suppleat, siue nature vi, pri-  
mum secetur vena poplitis aut malleoli.  
Quà reuulsione facta, veniatur etiam eo-  
dem die vel postidie, vrgente morbo, ad  
cubiti venā, vel cephalicam. atq; illico post  
ad venam linguæ veniendum, si ab antea-  
cta sectione non emittit malum; sique ru-  
bor faciei & oculorum, capitis plethoram  
denotent. Si linguæ venæ non appareat,  
secta venam frontis, vel illas quæ prope  
oculos sunt. hæc caput à plethora vindi-  
cant. Vel non emicantibus sub lingua ve-  
nis, iugulares externas percutiendæ, auctore  
etiam Tralliano. hæc pollicis latitudine à  
scutiformis cartilaginis prominente apicē  
ad latera inclinant. Verum hoc non agen-  
dum in quacumque angina, sed vbi caput  
sanguinis copiā premitur. Sed cum linguæ  
venæ in tumorem crescunt, feriantur, ac  
lingua etiā scarificetur, inquit Aëcius, cum  
aliqui suffocentur ægri. Vrgente itaque  
periculo, vel eodem etiam die vena sub lin-  
gua percutiatur. Memini ante annos vi-  
genti, cum apud Vltraiecinus meos medici-  
nam facerem, me vocatum fuisse ad an-  
ginosam puellam, ad eò oppressam ut loqui  
non posset, scribebat, ac remedium flagitia-  
bat à me. Iussu illico percuti vena malleoli,  
ac eodem die idem in linguam eius  
molitus, S. Dei beneficio, ad pristinum of-  
ficium linguam reuocavi. Alioqui, si tan-  
tum discriminis non addit, in morbi statu  
hoc agemus: tertio autem vel quarto die is  
vigere solet. Hoc itaq; fieri solet post usum  
linctuum strictionum aliquantulum. Pro-  
pterea Rases dicit, ab usu evacuationum &  
reuellentium seceniatur venæ sub lingua, ac  
collo cucurbitæ admoveantur. Cum verò  
plethora grauis corpori molestia non est,

Historia.

nihil

Quid.

Quæ  
mo.

Quæ  
na.

Aphorif.  
mo. 30.

Cucurbit.  
14.

nihil nocuerit, intaſci inferioribus venis; ac illico à cubiti vena auſpicari curationem: ac deinde ad ſuperiores aſcendere venas. Si ætas aut virum proſtratio phlebotomiæ refrigatur, cucurbitæ eius loco veniant. Scarificata inque cute, has dorſo, lumbis, & ſi menſes vel hæmorrhoides in vitio fuerint, cruribus, natibus (ſub his enim magnæ diſcurrunt venæ) umbilico, inquit Auſenna, & illis admovebimus. hoc enim ad reuulſionem facit. Scitarum carneæ molli incidimus alta vulnere, quo inde manet ſanguis, loco venæ ſectiōnis. Nam Dioſcorus, Quos phlebotomia non potes, inquit, ſcarifica. & Oribasius ibi ſcarificat, iubeat, ut quam plurimum ſanguinis effluat. In augmento morbi, hoc eſt, ſecundo die, derivationi ſtudebimus cucurbitulis, ſi latus intumuit, inquit Aëtius, in ipſo tumore ſcarificato. Si verò ſit occulta angina, primæ admove vertebræ, nam carotis arteria iſtine non longè abeſt: & liberaliter trahæ inde ſanguinem. vel perſcinde totam ibi cutem, quo liberali manu effundat ſe ſanguis ex collo. dein cataplaſmata admove: & ſequentibus diebus fiat lenctus. Iam diximus interdum primo die, nonnunquam in ſtatū, venæ linguam ſcindentam eſſe. Hoc etiam Raſer ita, Ab uſu euacuantiū & reuulſientium ſecentur venæ ſub lingua, & cucurbitæ collo admoveantur. Aurelianus admonet ut cucurbitæ colloteus antherioni admoveantur, cervicisq; neruis, quos tenontas vocant Græci. Singulæ itaque cucurbitæ ſub aurium lacunis ad fauces hæreant. Ante horum uſum veniant etiam vincula artubus & frictiones, reuulſionis ergo. In ſtatu pertundatur tumor ceræ candela. Materia frigida cum in vitio eſt, imponemus ſcapulis cucurbitam ſine ſcarificatione, quia ſtatus adſunt. Celſus vltimum remedium eſſe dicit incidere ſatis altis plagis cutem ſub ipſis maxillis, ſupra collum, & in palato circa vnam, vel linguæ venas, quò per illa vulnere morbus erumpat. Sed dices, cur æſperæ arteriæ ſpaciū interannulare non recta ſectatur lincola ac pertunditur, cum ſtrangulationem ab angina veremur? eo enim laxius ſpiriū decant ægri. Reſpondet Aretæus, Qui hoc agunt, rem experimento non comprobant. Quippe caliditas inflammationis maior ex vulnere efficitur,

ſtrangulationum adauget, tuſſimq; commouet. Quinciam ſi periculum hoc eualeſcit, vulneris ora in vnum coaleſcere nequeunt, ambæ enim cartilagineæ atque inter ſe ingluſcinabiles ſunt. Quidam tamen affirmant ſe id ſine noxa poſſe. attamen ut verum ſateamur,

— Caſſeri magiſtri,

Phyllirides Chiron, Amiſbaſmiuſq; Melampus.

Nam doloris immanitate enecat oculorum illorum muſculorum phlegmone, & cerebrum ſapè in ſympathiam irahit ac cor. Reuulſoria vincula ſupra talos & genua, & ſupra brachialia verſus cubitos, & ſupra cubitos verſus humeros iniciantur. Iam de Pharmacis. Non vomat æger, ſed reuulſoriè purgetur, & hoc illico fiat: ſi non poterit per os, clyſmis id fiat. Clyſteres ſint primū lenes, quò inueteratæ faeces excludantur. Accipe caſſiæ ſeſcunciam: facchari rubri duas vncias: olei violati & decocti althææ cuiuſque ſemilibram: fiat clyſter. Alius accipe ſoliorum maluz, violariæ, parietariæ, betæ, ſingulorum manipulum: ſicus vndeſcim: ſeminis lini vnciam: ſorum chamæmeli, melliloti, cuiuſque pugillum: fiat coſtio ex aqua. Huius decocti libræ adde diacatholici vnciam, diaphœnici drachmas duas vel tres, ſalis communis drachmam. Deinde adde centaſurium: & decocto remiſce hæræ picræ vnciam, cum quinq; vel ſex granis trochiſcorum alhandel. alternis diebus iniciantur, ſi æger per os purgari nequit. Si os aliquid admittit, lingat caſſiæ ex fiſtula: hæc gulam mulcet, & lenit aluum. Vel accipe mannz ſeſcunciam: cum ſirupo roſato laxatiuo & decocto tamarindorum, fiat potus. Aliter, Accipe caſſiam & diacatholicum, dilue cum decocto pectorali. Vel fiat hoc ſirupo roſato laxatiuo, cui iunge interdum dilutum rhabbarbari ex aqua endiuiz, vel ex decocto glycyrrhizæ & paſſularum: aduice, ſi ita viſum, mannam. Sed quia vehemens malum eſt ac præceps, iungimus electarium de ſucco roſarum. Accipe caſſiæ drachmas ſex: electarij de ſucco roſarum drachmas tres: decocti pectoralis, cui adiecti fuerint tamarindi, quantum ſatis fuerit ad diluenda hæc: fiat hauſtus. Fingietiam poterit apozema ex ſcabioſa, capillis veneris, violis, paſſulis, ſeminibus

Vincula.

PHARMACIA.

Clyſter.

Te u.

ſtrima  
chorragia.

frigidis, rhabarbaro, fenis, polypodio, epithymio, agarico si pituitescit sanguis; Coque ex ferro lactis: adice sirupū rosarū, violarum, vel de iuiuibis, aut de liquiritia. Bibat etiam magnam copiam feri lactis. Iolabio æstus castigetur ex aqua endiuizæ, vel cichorei, cum aqua hordei; iunge sirupum violarum, rosarum, vel de endiuia. Cautè ab emeticis, hoc est vomificis: nam vomitus ingens dilutione & præfocatione sæpè pereunt, inquit Aurelianus. Si pituitescat aluus, vitetur hiera picra. Cum Romæ multos abripere serpens angina, qui post frogalem cenam scriptulis duobus hiezæ picæ vtebantur in pilulis, periculum tam atrocis morbi declinarunt. Accipe turpeti drachmam, coque cum liquiritia: colaturæ adde mannam, vel electariū lenitium. In fine morbi, cum iam deglascire potest, accipies cassiæ recenter extractæ, diacatholici; cuiusque drachmas tres: agarici trochiscati (si si sanguis pituitosus) vel electarij de succo rosarū drachmam vnam aut alteram. Maximè prodest calentioribus sirupus ex multiplici infusione violarum, propinatus quattuor vnciarum pondere. Sumat interdum Cassiæ vnciam. Iam venio ad topica quibus fauces rigantur. Hæc variè præscribi debent, vt per sua tempora variè fertur morbus, vtque fuerit varia materia morbifica. Principium anginz finitur, postquam iam rheumma fluens constitit. augmentū adest, cum coctionis apertè se proferunt symbola. statutus; ex æstus elucenitibus pepasini noris, de-  
*Alia.* clinatione, symptomatum celsatione. Biliosa si fuerit Anginz causa, & si iam tam inuasisit morbus, validè erit intus gula stringenda, si non addit atrox dolor. Linga igitur ilico succum ex moris ismaturis, cum succo prunorum agrestium, vel ex cortice nucum, qui præstans est; aut cum succo vuzæ acerbz. In augmento iunge exhaurientia, vt myrrham, crocum. id fiat sensim; ita vt hæc in agmento tertiam partem succorum æquent: in vigore verò, sint æquæ stringentium & exhaurientium partes. Sed tamen magna cautione exhaurientium vsum inire debemus: irritat enim succos in rheumma: quare verè anodynus & lenientibus id agemus. Et ratione acerbi doloris, in initio biliosi rheumatis præscribimus lactis bulbæ collutionem, cui incoxit vicia feminū

papaueris. Præstat tamen ineunte morbo, dum guttur incurritur a concitato rheumate, non gargarizare, sed remedia ingerere. ablit inuito mel: addit discodii tamen, vel sirupus papaueris. Diacaryon laudatissimum remedium est hoc: ita fit, ex Tralliani sententia; Vigenis nucum fructus cortices externi circumcidantur, & statim eos in pila contunde. cola succum per linteum: & vbi decoxeris dum fordium more crassescat, permisce mellis partem quintam, & coque rursus ad melleam spissitudinem. Inuito hoc ita vitumur & in pueris & in mulieribus. in statu addimus myrrham; & crocum in fine. Poteris, si magnus seruer adsit, loco mellis, ineunte malo, affundi saccharum huic remedio. Si æger gargarismum velit, in morbi initio, fiat is ex balauistiis, psidiis, galla, rhois foliis, rosis rubris, myrto, ozyza, dactylis, lenicula, radice pentaphylli: vel aliqua horum sume: nam, vt rectè dicit Q. Horatianus, hæc specie quidem dissimilia videntur, sed omnibus eadem est virtus idemq. beneficium. His vitumur per initia, cum commoueri aliquid in faucibus sentimus. tunc coquimus illa ex aqua plantaginis, rosarum, aut portulacæ vel equiseti, aut solani, ad libram vnam: colaturæ iungimus succum granatorum, & diamorum, vel dianucum, ad binas vncias: vel succum berberis, vel pomorum acerborum. Vbi bis vel ter eo vsus fuit, addes sirupi violati vncias duas. & reliquo eo die, cum primum scilicet quid commoueri in faucibus sentis, eo vitatur. & ore teneat diatrachacanthum frigidum. His dico vitendum esse antequam fiat angina. Nam si illa grauiter incumbat, ac vrgat si dolor magnus, statim ea quæ dolore mitigant his coniungantur: vt saccharum, psyllij semen & cydoniorum malorum, glycyrrhiza, iuiubæ, passulæ, ficus, scænegræci & lini semen. Imò, premiente dolore, lacte vitatur, cui incoxit vicia feminis papaueris. Inuito etiam hoc vitumur. accipe aquæ hordei semilibrum; succi putaminum nucū, seiscuntum: fiat gargarismus. Vel gargarizet cassiæ recenter extractā ac diluatā aquā plantaginis. Vel vitatur succo granatorum, cum decocto hordei & rosarum rubrarū. potest etiam addi succus pomorum acerborum, qui bullitū saccharo. Vel coquatur amyllum cum aqua hordei: adde  
 sirupum.

TOPICA  
 IN VTE  
 ad morbum  
 66.

Sirupum portulacæ & papaveris, vel dia-  
codion. His vtemur in initio passionis, le-  
uibus adhuc querelis affecto ægrotante.  
Sed secundo die (nam tunc ad augmentum  
venit in biliosa angina, hæc enim quar-  
to ad vigorem surgit) Accipimus aquæ  
distillationis althææ libram: huic incoque  
manipulū malux arborescentis deciduos  
flores rubros: colaturæ adde sirupi de fu-  
co betonice vncias tres. In maximo dolo-  
re coquatur mica panis in lacte, fiat expres-  
sio & gargarismus: tandem adde quid  
croci. Eodem modo fit emulsiō ex fursuri-  
bus sæpe aquæ vel lactis iniectis, ac expres-  
sis repetitis vicibus. Rases in initio huius  
mali gargarismum facit ex integro malo  
punico, & ex succo rubi fructus: coquit  
ex aqua rosata, cui rhois folia incohere.  
hoc ille audeat integro triduo. Sed nos ad  
doloris vim collineabimus, vt antea mo-  
nuī. Si dolor maximus inuenit morbo in-  
cumbit, vtemur aqua lactucæ cui insit  
mucus seminis psylli. Si adsit excoriatio  
quæ fauces fatigat, coques ex aqua hordei  
ficus, malux flores arbores, & althææ,  
cum semine lini vel psylli. Maxime vtile  
tunc erit decoctū fursurum, vel lac in quo  
lens palustris coxit. Vidi atrocissimam an-  
ginam hoc decocto placatam fuisse. Vidi  
etiam eodem successu quosdam vti lacte,  
in quo carbones querni extincti fuerant.  
In augmento iungitur etiam lacti cassia:  
lacti verò primū incoquantur rosæ, myr-  
tus, vel plantago, passulæ, ficus, iuinbæ.  
Eodem ipso primo die admoouemus foris  
oleum chamæmelorum vel oliuarum, aut  
violaceum & amygdalinum dulce recens-  
que: ac locum tegimus cœsypo. Nam, vt an-  
tea, vbi De causis, monui, in nulla angina  
specie admoouenda sunt repellentia foris,  
sed foras euocantia, doloremque vnā mi-  
tigantia, inflammata discutientia, & con-  
coquentia. Initio villia etiam hæc sunt:  
Accipe farinæ hordei manipulum vnum:  
muccaginis althææ & scænuigræci extractæ  
in aqua malux, cuiusque sescunciam: olei  
chamæmelini vncias duas; fiat cataplas-  
ma. Vel fiat cataplasma ex farina seminis  
lini, vel mica panis, chamæmeli floribus,  
& croco: addo pulpa mali assati mollis.  
Interdum sambuci folia, & lapatii acuti,  
cum malua coquuntur in aqua. iunge quid  
farinæ lini seminis, croci, & Rosum cha-

mæmeli: aspergo fursures: addo oleum  
amygdalinum dulce. Tandem addimus  
ficus, adipēs. Et in statu illinimus adipe  
anferis, butyro, croco, & oleo amygdali-  
no vel chamæmelino & anethino. Si in  
statu vehementer vrit dolor, accipimus  
cassie pinguis, & olei amygdalini  
æquales partes: mirum est quantum hoc  
iuuet. Sed ab hoc remedio Cautio sit, vbi  
pestifera angina in vicio est: nam illa hu-  
mectam vim reformidat. Et de hac loquitur  
Triallianus, vbi scribit vitanda esse ca-  
taplasmata quæ tantum laxant: His enim  
cataplasma ex nido hirundinis, de quo  
agam vbi Rituitosæ anginae curationem  
describam, peculiariter dictum est. Se-  
cundo die si vehemens dolor vrit, iungi-  
mus gargarismis vncias tres vel quattuor  
lactis muliebris, & cassiæ recenter extractæ  
vnciam. Vngat assidam pariem foris oleo  
chamæmelino & lilino: vel hoc præcellens  
cataplasma imponatur, quod etiam vel  
primo die vtile: Accipe violarum pulueri-  
satarum, rosarum etiam puluerisatarum,  
cursusque vnciam: farinæ hordei, pulpæ  
passularum infusarum lacti vaccino, vn-  
cias tres singulorum: cum oleo amygda-  
lorum dulcium recenti, oleoque violato  
singatur molliissimum cataplasma. Vel co-  
quatur ex lacte radix althææ: adde farinam  
hordei, oleum oliuarum, ac tandem cro-  
cum, & vinellum oui. Nam larynx inflam-  
mata blandum ac molle medicamentum  
postulat. Tercio die coque ficus, farinam  
scænuigræci & lini: adde cassiæ recenter ex-  
tractæ vnciam: myrrhæ drachmas duas:  
croci scriptulum: iunge lactis muliebris  
vncias duas. Et eisdem lacte coctis (si lo-  
co farinarum semina sumseris) fiat garga-  
rismus. Quarto die adde libæ huius gar-  
garismi, pulueris hirundinum duas vel tres  
drachmas: & mellis sescunciam. Et quia  
quarto die suppurari solet; vt fiat expura-  
tum, adde aliquid fimi asferini siccati &  
in puluerem redacti: vel aliquid sinapi. De-  
inde fiat abstersio cum sero lactis, vel ipso  
cum lacte, cui incoxit saccharum, vel pa-  
rum mellis. Et foris impone emplastrum  
ex nido hirundinis, quo lubenter etiā vtor  
in pestifera angina: quod hoc modo præ-  
scribere soleo. Accipe nidum hirundinis  
cum plumis & fimo: hunc coque ex deco-  
cto radicū althææ, ad pulvis ideam dum

Cautio.

In pesti-  
fera angina.Topica in  
biliosa  
angina.

veniat, adde olei amygdalini dulcis & anethini cuiusque vncias duas: theriacæ drachmas duas: croci semidrachmam: cassiæ semenciam: misce, fiat cataplasma molle. Primum nidus incidatur, tundatur, cribretur. Nil usquam ab ea moneo, ut maximum studium in hac specie anginæ adsit mitigandi dolorem mollibus medicinis. Quare si pungat calidissimus dolor: accipienus etiam aque rosatæ semilibram: cui adde caphuræ grana tria: & cum sirupo rosato fiat gargarismus. Vel accipe decoctum florum & foliorum nymphæ, cum emulsione seminum melonum. hæc incurrunt morbo. Circa statum verò morbi, rigentur fauces decocto cancarum, passularum, plantaginis: cui inde cassiam. Foris verò hoc vtiis etiam in statu, Accipe cassiæ pinguioris medullam, quam æqua parte olei amygdalini dulcis ac recentis dilue. mirum est quantum solarij hoc adferat. Sed cautio sit ab ea, ubi pestifera est angina. Aurelianus mollibus & mundis lanis, dulci ac calido oleo infusis, colla protegenda censet vñ cum thorace: adhibita articulorum blanda fricatione. Et auribus, inquit, aliquid ex eo oleo immittendum. Imò totum corpus vngit oleo, ubi in prima diatrio secta fuit vena. Prudenter moneridem author, Sapius mutanda esse cataplasmata, ne perseveratione sui corrupta, in acotem veniant. Spongia ex decocto althææ & oleo foueatur collum, & hos vapores hauriat: nam intus tumorem relaxant. Saccellorum siccam evaporationem tanquam densabilem reprobamus, cum Cælio. Qui etiam suadet ab vnguenticis & gargarismatibus acerrimis cauendū: etenim staphysagria etiam sanos plerumque synanchicos fecit: sed relaxentur tummenta remissius, vel cataplasmatibus adde pianguedinem gallinæ & anseris, cuiusque binas vncias: olei amygdalini vncias tres: & in fine adice croci drachmas duas: & cingat infra aures totum collum. An Aretæi consilium, desperata in re locum habeat? Si sit angina, inquit, cum coincidentia; foras euoca, quò ea quæ foris sunt extuberent: sive decocto rutæ & anethi, insperso nitro. imò, inquit, fiat ceratum ex nitro & sinapi, ut calorem exciter. Quintus Horatianus idem censet: paregoricis, inquit, reliqui & hordei farinæ misce ali-

quantulum salis vel nitri, quò ab interioribus euoces, custoditis Hippocratis præceptoris nostri præceptis. Propterea empirici quidam hoc in vñ habent, sale nitrum, thus & myrrham coquunt ex aqua, ad mediæ partis exhaustiorem: & madens inde linteum repide collo imponitur. Putarem hæc non tenianda, nisi primum totum corpus ex eadē euacuatum fuerit: ne dum metaprosi studeamus, epigenesim faciamus. Pueritosa si fuerit angina, nec foris, nec intus validā repressione vitendum. Primo die, à vacuato toto corpore, vitetur decocto nucem cupressi, foliorum menthæ, & radicum pentaphylli, cui addemus dianucum. fiat decoctio ex hydromelite: adde aliquid masticis. Vt accipe nucem cupressi manipulum: masticis diachmas duas: coque ex hydromelite ad libram: colaturæ adde dianuci seculicium; & interdum parum aluminis: fiat gargarismus. Sequenti die adde mel rosarum ad duas vncias: myrrhæ, croci, singulorum scriptulum. Vel colluat gulam succo brassicæ facebarato. Vnge primo die collum oleo chamæmelino & lilino. Sequentibus diebus sensim surgat ad exhaustientia. Hæc angina aliquantulum longius excurret. Post tertium diem, inquit Rases, fiat gargarismus ex decocto ficuum, vuarum passulorum: cassia cum hydromelite. & si producit malum, inquit, acrioribus vitetur remedijs; at non ineunte morbo. A primo die, accipe passularum vncias: caricas sex: seminis lini & scougræci, cuiusque vncias: ad dimidias coque partes: adde dianuci vncias duas: myrrhæ, croci, cuiusque scriptulos duos, pulueris hirundinū drachmas duas: fiat gargarismus. Truncetur capite hirundines, & super plumas extiller sanguis. dein sale aspergantur pauco, & ollæ viriatæ imponentur, & comburantur: cineribus adice crocum & nardum. Cum discutierendū fuerit, excipiat hic puluis melle, & illinatur. Ita tunc etiam album Græcum illinatur. Nonus hoc excipit oxymelite. Galenus humana commendat Græca. Aerius id à gallina petit. Ita etiam vitetur puluere carnis cochlearū in hortis inuentarum, has vitabat, & melli miscebat. Cancris etiam vitetur: hos terebat & miscebat cum aqua, quam colabat cribro; ad gargarismi vsum, inde effundi ridebis

Admisi-

Doleri.

Cauenda.

In forma angillæ.



videbis, inquit Aëtius, maximam materiam copiam. Si dolor urget circa statum, accipimus muccaginem seminis malux & seminis caulium, cuiusque ranciam: muccaginis sicum fescunciam: buiyri recentis insulsis femunciam: decocti glycyrrhizæ fescunlibram: coque gargariser, & lingat ex eo. Diabesafa compolitio commendatur à Galeno & Tralliano, cui, inquit Galenus, modò leniora, modò validiora confortiamus, ac omni angina, omnibusque eius temporibus eam accommodamus. Fugienda, inquit Aurelianus, quæ vsque ad sensum veniunt mordicationis. Dicimus leniora, in sanguinea angina & biliosa: fortiora, in pituitosa & melancholica conuenire. Diabesafa, hoc est ex ruta sylvestri & hirundinibus compositio, quæ propterea etiam Diahirundinum, Aretæo diachelidonium appellatur, in sola angina pituitosa commodè præbetur. Lac cum melle, ubi dolor, locum habet: & decoctum hibisci & seminis lini. Vbi suffocationis periculum imminet in statu, Archigenes & Rases surgunt ad decoctum sinapi. Trallianus id coquit ex oxymelite. Ego nuper in hydromelitis libra, coqui iubebam drachmam rano seminis sinapi: & ilico ruptum fuit quatuordecim apostema anginae pituitosum: ac plurimum puris elisit illa mulier per os. Poterit addi interdum quid nitri, ut grana quinque: vel benioini aliquantulum. Archigenes, ut testatur Aëtius, in occulta angina vicbatur gargarismo ex sinapi: mox in balnea ducebat, multoque ita à periculo liberavit. Idem potest decoctum origani & hyssopi, vel accipe agaricum in calcolas confectum: hoc macera ex decocto radicum althææ, sicu, pauco zinzibere, & quarta parte vini albi, adde syrupum de althæa, gargarizer & deglutiat, hoc namque rumpit maturum apostema. Maturitas elucet ex symptomatum mitigatione, restibili tumore. Nam in ebullitione illa vigente exhauritur aliquid, unde laxantur partes. Aperiunt locum ita deterge: Accipe aquæ hordei semilibram: meliis rosati, syrupi de rosis sicis, cuiusque vnciam. Lacti etiam incoque rosas, & saccharum vel mel. Terium vlcus tegatur, adiecto his pauco alumine. Foris autem admovebimus cataplasma ex sicibus coctis & calida, cum oleo amy-

gdalino. vel micam panis macera lacte: adde pulpam passularum, vel pomi assati, cum chamæmelis, & croco. Nonus iubet ut collum inuoluatur lana succida oleo calido imbuta: aut cataplasmate ex lini seminis & fœnugræci hordeique farina, da stylis, mica panis cum croco. Si, dicit, inueterauerit phlegmone & induruerit, adice ficus, lapathium, adipem, cum pauco nitro. Coque radicem incisam althææ, cum foliis malux, bellidis, violariæ, adde flores chamæmelinos, & farinam hordei, fœnugræci, lini seminis: iunge pinguedinem gallinæ, & oleum amygdalinum vel seminis lini, & butyrum. Vidi commodè admoeri sinum recentem bubulum, coctum cum laucudula, tandem iunge nidum hirundinis. Vel vtaris eo, ex nido hirundinis cataplasmate, quod antea descripsi. Accipe radicem liliorum alborum vnciam: radicum althææ vncias tres: foliorum malux, manipulos duos: foliorum violariæ manipulum: florum meliloti pugillum. Coctis & confusis adde nidum hirundinis, farinæ seminis lini, fœnugræci, cuiusque fescunciam: olei lini, & amygdalini dulcis, singulorum vncias duas: buiyri recentis vncias duas: olei anethi vnciam: fiat cataplasma. Cum ad suppurationem vertitur, adde ficus. Vel coque ficus, adde farinam fœnugræci, expata assatam sub cineribus, cum melletritam. Accipe nidi hirundinis vncias tres: vnguenti de althæa cum gummis, vncias quattuor, misce cum oleo amygdalino. Optimum hoc: accipe æquales partes theriacæ & vnguenti de althæa, fiat inunctio. Vel coque passulas, ficus, semen lini, fœnugræci, horum cuiusvis vnciam: coque, inquam, dum media aque exhauriatur pars. huius decocti libram adde farinæ seminis lini & fœnugræci femunciam, pulueris hirondinum drachmas duas: fiat gargarismus. Foris verò hoc, Accipe seminis lini farinam & fœnugræci, cuiusque fescunciam: cum oleo amygdalino dulci & axungia recentis porcina, fiat cataplasma, & vni supparetur. Rumpatur vngue: abscegerit mulsâ: cicatricem ducat bolo remento ore. In statu aliquando iussit coqui nidum hirundinum cum malua, chamæmelis, radice althææ, & glycyrrhizæ, cum sicibus.

Hystoria.

Suppl.  
veterina.Tepica in  
pituitosa  
angina.

In statu.

*Scirrhus  
dus.*

*In pesti-  
fera.*

*Capiti ad-  
monenda  
in putu-  
riscama-  
te.*

*Amelan-  
cholia.*

*EMPI-  
RICA.  
Plin. 26.  
lib. 1. &  
18 lib. 4.*

*Erysipe-  
latum ex  
cellens re-  
medium  
neque ist-  
tunc hinc  
transla-  
tum.*

ficubus: eoque iubebam ut, melle adie-  
cto, gargarizarent: mirum quantum hoc  
iuuerit. Si scirrhus eadum tumor, muc-  
caginibus emollientibus addemus myrrhā  
& hirundinum fecces cum iride: & cum  
oxymelle stillitico fiat linctus. Foris vte-  
mur cataplasmae ex caticis, parietaria, fa-  
rina lini feminis, & sœnugræci, camome-  
lis, origano: cum eroco, butyro, adipibus,  
fimo hirundinum ad viciæ pondus. tan-  
dem adde sulphuris semineam: cum olei  
anethi quod satis sit vti fiat cataplasma. Sis  
memor, In pestilenti angina sicandum  
esse cum leptomeria, iunctis emollienti-  
bus & coquentibus: talia sunt nidus hi-  
rundinum, crocus, scabiosa, theriaca, dial-  
thæa cum gummis: & illud quod modò  
descripsi emplastrum, quod accipit nidum  
hirundinis. Misce interdum nidum hiru-  
ndinis cum cassia, & theriaca, oleoque ane-  
thino. In concitato hoc pituitæ rheumate  
à capite, suffiantur eucuphæ nigellæ semi-  
ne, coriandro, gummi iuniperino, fanta-  
lis: & coronali futuræ admoueat dropax,  
vel sinapisimus. Si fuerit causa morbosica  
melancholica sanguis, gargarisatio fiat ex  
decocto althææ, malux, ficuum, cum mo-  
dico dianuci. Deinde accipe mellis despuma-  
ti vncias duas: butyri infulsi recentis vn-  
ciam: pulueris treos scriptulum, fiat lam-  
bitium. Curationi huic pauca quædam  
empirica subnecto. Archelaus & Orpheus  
sanguinis humani illitu anginam curari  
tradiderunt. Priusquam mitigaueris im-  
mensum corporis calorem, corpusque eua-  
cueris, nihil applica. Accipe dianuci vel  
diamori vnciam: diarragacanthi frigidi  
drachmam: seminis papaueris albi semi-  
drachmam: fiat linctus. Accipe salem ni-  
trum purgatum, bulliat in aqua ad exhau-  
stionem duarum tertiarum. tertiam hanc  
partem, patinā exceptam, cauez impone  
frigida: hoc modo se recolliget salnitrum.  
Accipe, huius salis nitri, vnciam partem de-  
cimam sextam, si vegeta ætate fuerit æger,  
vel scriptulum, si inclinari iam ægri ætas:  
dilueque duabus hanc cochlearibus aquæ  
puræ: bibat. Accipe myrrhā, thuris, cuius-  
que vnciam: aquæ solarii cyathos duos:  
acetis cyathum vnum: caphuræ, eroci, cu-  
iusque drachmam: bulliant dum hæc di-  
luantur ac fundantur: rubedini applica dū  
illa euanuerit, facit hoc ad omnia erysipi-

lata. Spongia purga fauces, & linctu muc-  
caginoso humecta fauces. Quidam audent  
admouere aquam vitæ cum rosis. Alij,  
(quod probò) oleum lini & dialthæam  
panno albo excipiunt. Nili collum inuol-  
uunt. gulam lauant lacte cuius sero: vel  
cremore fursurum, aut succo pitæfæ. hoc  
sanè cōfert si corrosio adsit, aut si in vigo-  
rem iam venis malum. Initio verò decocto  
vriatur pentaphylli radicis, & passularum.  
Ineunte morbo fiat gargarismus ex aqua  
plantaginis & lactedulci. Vel aqua vtiatur  
glycyrrhizæ, cum modico succi myrtillo-  
rum. Et salicis folia ex aqua decocta donec  
colorem mutant. ita etiam fursurum &  
ficuum decoctum cum rosis. Inclinate  
morbo, vtiatur aqua althææ & betonicæ,  
cum sirupo de betonica. aqua etiam sca-  
biosæ. Decoctum plantaginis & auricola-  
rum iudæ cum cassia. Doctissimus Schen-  
kius notat à quibusdam obseruatum esse,  
si quis bibat per guttur lupi, cerdò eum  
euadere. Nostrates in dolote gulæ optimo  
succellu sugunt potum per caulem iuisti-  
ci, quem feruare in hunc vsum toto anno  
solent arefactum etiam. Archigenes, apud  
Ætium, accipit recrementa hominis, sic-  
cat ea, & in panno ligata exurit: & cum  
hydromelitem propinat: hoc, inquit, his qui  
iam suffocantur remedium est. Priscianus cū  
melle tumorem reprimis hoc vulnera, vbi  
exaruerint, melle permixta, gutturi adne-  
xa, censei angina præstantissimum reme-  
dium, curā nunquam fallente. præstat ea  
miscere vnguento dealthææ, & resumpti-  
uo, adipibus & oleis, adde hirundinis fæ-  
ces, Rubeta pro fynanchicis incossa & il-  
lita, à morte liberauit quendam. Credo fi-  
lum, quo suspensio enecat rubeta, con-  
ferre, dicit Cardanus. Compositum Aq-  
gustæ apud Scribonium in fine capitis de-  
cimifexti. Aqua in qua mus coctus fuit, in-  
quit Marcellus, propinata infans ægro,  
præclare iuuat. Sal, lixæ exceptus sacco,  
dimittatur in aquam calidam, & collo im-  
ponatur. Plura lina à purpura marina ru-  
bentia, collo vixere in incia, eamque in li-  
nis suffoca. Vnum illius collo appendas  
alicius: à colli malis liberat. Olei vitrioli  
grana duo vel tria misce in aqua, vbi res-  
cit

7. De  
vitiis  
33.

est desperata. Accipe aquæ nucum vncias duas: aquæ rosarum semunciam: sensim instilleur. Vel, in summo periculo, accipe aquæ nucis vncias duas: liquoris vitrioli scrupulum. instilla. Sunt qui libræ aquæ ex scabiosa miscent aquæ ardentis vnciam: sed iempelluè his viendum, ne augeatur phlegmone. Iam pauca de victu addamus. Aere fruantur frigido, modicè, ne algore stringantur spirabiles partes, iam angustia pressæ. Sint loco lucido, inquit Aurelianus. facendi sint eo schemate, quo se leuari dixerint. Sint capite elaso. Dormiant in eunte morbo, si possunt, quò foras intrò feratur sanguis, & rheuma consistat. Nam quies his initio solatio est: taceat ergo, nec fauces loquendo vexet, risumque vitet. Reuulsoria tamen fiant sudationes. vincula artubus iniice. pedes calidè lauentur. Animus sit quietus. Venter si officium non agnouit, fiat clyster: nam laxatus venter facilius facit spiramenta etiam sanis hominibus. In cibis parca manu indulgum his semper. Adhibenda, inquit Cælius Aurelianus, requies & abstinencia, vsque ad primam diatresin, cum gargarismate laxatiuo. Et ubi difficilis deglutitio est, sufficit, inquit, mulsam, ad declinationem vsque. Et etiam. Heraclides Tarentinus solè aquà vel mulso nutriendos esse voluit; cætera ciborum prohibebat. Trallianus, ad quartum diem mulsà vtatur, inquit, dein succo prisanæ: & cessante phlegmone, da vitellum oui. Alij iubent vt vel bidui inedia serat, vel vt sola fruatur mulsà. Parcè itaque habeatur æger: plus enim ex ciborum copiâ, quàm ex eorum inopia periclitantur: nam copiosus cibis arctat guttur. Triduum transigat tenui ceruissâ saccharatâ. A tertio die pulicula hordei ex eadem saccharata ceruissâ detur; vel cucurbita, aut panatella detur. Dein da iuscula saporata lactucâ, portulacâ, seminibus frigidis. Si fatiscat æger, ouis indulgeat, & caninum succo. vel coque ex aqua passulâ, & cum hac aqua hordei farina coque: adde saccharum. Si declinatio fuerit confirmata, dabimus puluerem, oua que sorbilia. Fugientes acria, inurens, vinolum, asperum, aridum, quodque lacessit deglutitionis loca. Nam faciliè passio ex occasione parua recurrit. Qui frequenter cerassâ & fungu rescantur, ab angina

incurri solent. Potus sit parcus, ne à capite effluens vberima materia fauces riger. Hoc etiam Dioscorides censet, libro De parabilibus primo, vbi ait, Iuuant omnibus his quæ humiditatem auellere possunt: exiccatione enim densitas relaxatur partium. Paulatim mulsam poterit faccharatam ceruissam. Si acerrimus tenuisque fluxus sit, parum farinæ oryzzæ incoque dulci lacte, cum saccharo. est hoc edulum iucundissimum, quodque vna materiam crassiorē reddit. Admonet Hippocrates, vt minimè frigida potent. Hic huius morbi metam ponerem, nisi grauis authoritas maximi Medici Aræti me traheret. qui præter vulgata hæc, aliquid non ita à cunctis animaduersum in hoc morbo latere innuere videtur. Nam ex aphithis tonsillarum cunctas has spirabiles partes conraminari scubit, vocarique Egyptia & Syriaca vlcera: vnde modus mortis miserimus. Ego quater vel quinque hic Leydæ in Batavia hæc obseruaui, eadem qua Aræti refert hæc facie & euentu euensisse. Legite Aræti libri primi, De causis & signis acutorum morborum, Caput nonum. At libro primo, De curatione Acutorum morborum, capite nono, eorum curationem scribit.

## CAPVT II

## DE PLEVRITIDE.

PLEVRITIS propriè pectoris morbus est. Pectoris dico, in quo Cor, princeps partium humani corporis, quo primum viuimus, ultimoque morimur, fons vitalis caloris. Huius domicilium & tuela est pectus, propterea que maximum horum contagium. Ab his itaque morbus, in his cor cingat, arceri debet. Viden vt Summus Deus illam partem, quam nostræ vitæ dominum ac moderatorem posuit, septis munierit: vt ossibus, cartilaginibus, membranis vestieret? Id enim vitalibus spiritibus (non sine valido calore,) fabricandis occupati, euentatione ac frigore perennat suū opus. Omnis enim ignis his fraudatus exinguitur illico. Elabellam hanc illi mouet Pectus respiratione. Sunt autem tria Respirationis instrumenta, alia enim sunt excipientia, vt pulmones; alia deducantia, vt aspera

4. aut.  
10.  
Moralitè  
faucium  
morbum.

Pectoris  
vix.

Respira-  
tionis in-  
strumenta  
ita.

aperta arteria & larynx: alia moventia, vt thorax. Quorum experientia in Asthmaticis spirandi difficultatem præstant in angina, deducenda: in pleuritide, moventia. Moventia sunt thorax, qui cum commocatur plurimam partem, primum agens de continetibus morbo obfessis. maxime verò cuncta ibi continet membrana quæ costas ambit. Est autem Pleuritis, doloris puræ thoracis acerbitas, profecta à continui solutione tunice costis innoxia, cuius causa est phlegmone lythrophica, quæ conicienda habet tussim, alii suam febrem, ac durum pulsum. Dixi autem puncturam doloris acerbantem; eius causa est: dilatio solvens continuum membranae partis acerrimi sensus, cum intertempore magna. Hinc fit difficilis respiratio, quæ coniunctiam thoracis, quæ necesse est non respondet: & conculci thoracis phlegma conorati. Dixi huius causam esse phlegmonem; nec enim hæc symptoma alio modo euentis possunt: sunt enim huiusmodi morbi à partis oblectis propria, cum sympathia paruum solutum & vicinatum, vt pulmonum & cordis: unde sicca tussis & febris. Nam dolor puncturæ & difficultas spirandi, sunt propria tunice costis innoxie; unde contumacia thoraci additur, & impediunt libera respiratio. Et propterea hæc signa sunt verè pathognomonica inflammationis pleuritidis. Nam à phlegmone, vt phlegmonone est, inoperabilia sunt, tumor, calor, pulsus, renixus, & dolor. Adde vt Pleuritis sunt quoddam *subætas* vel acerrum trinum morbum generum innoxiorum. Etenim vt est tumor, referatur ad anæmiam; vt velox est tumor confectio tum cum feruore; ad intertemporem ducitur; vt verò tumor in cuncta fortuna intertempore committatur: partium dilutione sumpti, ad solutionem continui pertinet. Quare hic non ago de omni dolore (nam *ἰσχυρὸν καὶ ἀσθενὲς* fit à fluxu) sed de pleuritidis dolore. Diximus præterea in Definitione; assiduam febrem adesse. Hæc febris provenit ob locum affectum, qui non longè abest à corde. nam arteria etiam aorta lingulis costarum, spaciis ramum de se præbet, conspiciunt admodum; qui sub membrana cæcaris vni cum rãtis venæ zygos. Dolor est ibi affectus: Quæ sed puncturæ, à loco affectu. Tussis est à sedes afflicta. ex qua necesse est duci.

aliquid excludat. Non est autem in Pleuritide dolor lateris puerilis, quia in hac membrana non sunt arteriæ, sed sibi membranam excurrunt. Quare si in musculis interioribus, vel exterioribus hæseat Pleuritidis, adeit dolor pullatorius. Diximus in Definitione, A solutione tunicæ costis interire. Videatur enim veræ Pleuritidis materia hæret in ipsa membrana costarum intertense, et easque substantiam occupare, quæ ob sui densitatem fuscipit biliosum sanguinem. Et quavis iuxta musculi intercostales inflammetur, attamen ea biliosus languis fluxit, causa inflammationis, et idcirco in membranam quæ costas interit. Quare necesse omnino est, partem cum ipsa intimis costarum musculis inflammamur, hanc membranam in eandem iniuriam trahi. Veluti aliquando, vbi costas interens membrana primario ex affectu laborat, intercostalium muscularum partes internæ similiter ei consentiunt. Verum exquisita pleuritis fit, vbi interens costarum membrana primario ex affectu laborat. Semper itaque hæc membrana affligitur in Pleuride, modò tamen acerbior, modò leuius. Hinc autem interitæ membranae costis amentiam ac dyscrasiam, oculis non semper competant puro scilicet in eademque pleuritide. Acerbè enim doli doli à mole non magna. Memini me Phreumum phanaticum immani delirio abreptum fecare, cui nihil in meninge, nihil in cerebro, nihil toto corpore  $\pi\alpha\gamma\epsilon\phi\epsilon\sigma\iota$  oculis notari posuit. Propterea Herophilus, qui in sectione humanæ corporis exercitissimus fuit, dicebat, in hoc affectu pulmonem pati. Attamen Dioscori, qui ante Herophilum fuit, (nam is  $\text{Asculapidiou} \text{ελναιου}$ ), et post eum Erasistratus, & Asclepiades, membranam hanc interitæ costis, adligere hac passione dicebatur; verum duebant non esse in lateribus tumorem, hæc aditæ membrana tenuis ac robusta, costis, dorso, & internis pectoris angulis, quod ossibus inhaerens substrat esse: quod doctæ emantantem Areteus. Hædennus de Definitione eius iam Causam præponens Pleuritidis. Deferimus Pleuritidem, esse acerbioris doloris. Dolor non est morbus; sed quid, constitutum morbo. Sed ne fallamini, Dolor non citri multissimus, sed sentio quo

Sed  
Tentative  
discrepancy.

Gal 5.  
loc. af-  
fect. 2.

de loco  
pienrada  
indemita

CAV-  
SAE.

*Dolar*  
*quist.*

perspiratur & repentina solutione continui. Hæc est, dolor est sensio in perceptione solutionis continui, cum repente quid mutatur ab eo quod naturaliter est, in id quod præter naturam est. Estque *πῆλσος* *ἢ* *οὐ γινώσκουσιν* *ἢ* *ὑψηλὸς*. Sed quæ est huius doloris causa? morbus: quis ille hic? phlegmone. Quid est phlegmone? Est abscessus vel apostema excugum à calida materie assætu (sanguinis videlicet laudabilis, vel sanguinolentæ bilis) cum rubore, dolore, sequitur, calore, pulsu, & tumore præter naturam coniuncto. Talem affectum inuaderetur in Pleurinde existimari est. In Definitione huius phlegmones addidimus [ab assætu] ut intelligatur sanguinem in partem affectam influere plus solito, eoque non nutriti. Nam partes nutriuntur attractione sanguinis. Hæc autem facultas illis insita est, qua quæque pars tantum sanguinis attrahit, quantum ad sui nutritionem & conseruationem sufficit. Causa verò affluxus dolor est. Sed inflammatio Hippocrati duplex est, alia est sicca, alia humida. Inflammatio sicca, est ætus præter naturam alui cuius partis, *φλογὴ* Hippocrati; Diocli est *φλογὴ*. Tale quid sæpe occupat hanc costis inextiam membranam: adeo ut nullus tumor oculis competens sit. Ita Diocles, ut testatur Galenus, Melancholiam hypochondriacam nasci dicebat ex *φλογὴ* partium hypochondriis contentarum. Alia verò Inflammatio est humida. Nascentur vel à bile (contra naturam affectu) nutritia, vel à sanguine. A bile contra naturam, pepasmi capace, vel pepasmi experte. A pepasmi capace, hæc est pars naturalis tenuior & calidior sanguinis. Fit inde Inflammatio ab influxu; appellatur erysipelas. Si verò pepasmi experte fuerit hæc bilis contra naturam, erit viscosa, propriæ substantiæ corruptio; ne, antequam parti insit: hæc corrupta est in hepate; inde herpes pronascuntur. Vel viscosa est hæc æadem bilis mixtionē alienæ materiæ, vnde fit erysipelas phlegmonodes: vel fit Inflammatio, ut diximus, à sanguine contra naturam affecto, eoque laudabili, vel viscoso. Laudabili, qui prima sola qualitate & quantitate peccat in causa antecedente: (vnde, dicitur phlegmone *ἢ* *ἰσχυρὸς*) & in causa coniuncta est corruptus: fit ab ista, lapsu, cum

runt in partem. Vitiolus; corruptione propriæ substantiæ tam in causa antecedente, quàm coniuncta; & est pepasmi experte. Hinc carbunculi surgunt, vel ob alienæ materiæ mixtionem, vel phlegmone erysipeloides. Patet morbum hunc esse quid inflammatorij, ortum ducens à sanguine præter naturam ibi concepto. Is autem sanguis est plerumque biliosus, nonnquam pituitosus, aliquando etiam melancholicus; vel copiam peccat sanguinis. Est tamē discernere inter morbum sanguinem vnde hæc passio nascitur, & cum vnde Peripneumonia. Nam ut Peripneumonia fit ab influxu crassioris sanguinis pituitosi, vel melancholici; ita Pleuritis prodit ex sanguine bilioso, tenui, & melancholice sentente ienuiore. Sed quæ sunt causæ, quæ sanguinem extra suæ naturæ lineam abripiunt, adeo ut pleuritidem gignat? Ex sanæ suæ duplices, alix prauum sanguinem producant, alix productum sanguinem in fluxum abducunt. Producti hepate astuosum, biliosum tenuemque sanguinem, qui in tenues costarum venas & arterias intrat, existitque inter pleuriticam membranam & costas, adeoque membranam in ipsam, vel inter musculos costis intercepro; vel biliosus hic sanguis fertur per illam venam quæ quatuor supremas costas alit, & foras extra thoracem ad eas venit. Vel ratione totius corporis calidi & humiditatis prouenit vberissime sanguis. Ita etiam cor multo tenui ac bilioso sanguine circumdatus, dum ita excandescit, expuit sanguinem in intercostales arterias: ut hec, par per venam id agit azygon. Præterea faciendum est in sanguinis copia ciborum vberitas, & solemnis euacuatio suppressa, & vlcera non cautè oclusa. Vini generosi potius, plethoricis causis implet debite caput. Et si quis præter modum ocium amat, & elus fluctu: vnde liquefit sanguis: quod etià fit usu venereo. Hæc causæ gignunt talem sanguinem: Sunt verò alix causæ quæ productum sanguinem in fluxum prouebunt, ac eum in membranam effundunt. Triplex est huiusmodi causa, organica, attractio (doloris vel caloris vi) & exclusio. Excluditur sanguis irritata ab expultrice à nimia copia, vel ab acri qualitate. A nimia copia, ut abundat se ac æstuat à nimio exercitio, ita, rerum agendarum, ac admonendarum ab

Carbunculi  
causæ.

4. De  
causis  
Pleuritis  
Pul. 8.

Ut differat  
causæ  
Pleuritis  
a Peripneumonia  
causæ.

hæc aff.  
in fieri.  
non in effi.

Inflam.  
ratio  
quid.

Inflam.  
ratio  
quid.

Erysipelas  
causæ.

Herpes  
causæ.

Causæ in  
fluxum  
abducunt;  
sanguinis.

æstu. Nam causa procatastica est calor humores colliquans; & frigus eisdem cōpingens. Aërem enim qui captant foris frigidum per æstus, ita ex capite & aliis partibus excluditor materia in pectus. Ita plurimus potus aquæ algidæ eō stringit sanguinem. Attrahitur autem sanguis, vel ob dolorem, vel ob intextæ costis membranæ calorem. Nam si tunc corpus circumfluū fuerit sanguine, eo modo facili proleclabitur; hoc est, affluet vi attractionis. Ita intempestivæ admota remedia calida lateri, phlegmenem accersunt, ubi corpus irriguum est à sanguine. Eodem modo in se abripit sanguinem dolor, natus à parvis exquisitis sensus tensione. Tensionis causa est materia aliqua, vel status. Dolorem infert etiam ictus. Per orgasmum verò evenit influxus sanguinis, quod membrana hæc exuta nativo robore, exclusos in se succos faciliè admittat. Robore verò exuta est vel à primo ortu, vel quod morbo tentata fuit. Propterea copiā eius graue corpus, onus in hanc deponit. Hæc causa, aliquos Pleuritidis opportunos facit, cum aëri calido se exponunt; vel cum plus iusto se exercent, ac mox frigori se dant. Ita interdum nascitur dolor lateris à catarrho frigido è capite lapsio in externos musculos lateris. Verumtamen is non facit Pleuritidem veram, etiam si ille frigidus humor ipsam membranam intexam costis tetigerit, & ibi tensionem & tumorem præter naturam peperit, nisi præ nimio dolore sanguinem eō attraxerit. Nam nulla pleuritis fieri potest à materia quæ segregata est à sanguinis concrezione. Verum est notum Pleuritidem excitari à cruditate quæ stabulatur in mezarricis venis, à materia viscida, & à fracto calore. Et fluxio, inquit Hippocrates, à capite ad pectus, Pleuritidis causa est. Propterea cum venarum dominatu celsum tenetur, eveniunt pleuritides: & cum à quoque capite ad pectus, tunc his, quibus languet hæc membrana, periculum hoc imminet. Scribit Aurelianus, Pleuritidem masculis frequentiorē esse quādam sceminiis, & senibus; & maxime evenire æstare. Sunt autem tria vasa quæ materiam Pleuritidis trañsmissionē: est vena intercostalis, quæ quatuor superiorum costarum spacia alit: est & vena azygos, quæ originem ducit à trunco venæ causæ

dexira parte, quæ alit costas inferiores octo; earum enim ossibus partibus dicata hæc est. Tertia fertur interna parte ossis sterni ad umbilicum, & surculos impartitur partibus costarum cartilagineis. Est etiam Pleuritis quædam pestilens: quæ videtur inter nothas esse referenda. Fit hæc in Diaphragmatis regione, à sanguine pravo ac putrido. Hæc nasci interdum solet per febres pestilentes: dum orgasmō cōcisa materia naturæ iniqua, nullo consistere loco potest, tandemque per phrenicos ramos in diaphragma eliditur. Diaphragma verò vexatum, illico membranam costis intexam in contactū sui abripit. nam lobole eius superficiē eius interna ad thoracem cingitur. hoc est, nascitur à pleuritica membrana hæc, quæ tegit diaphragmatis superficiem internam. Et est maxima cordi sympathia cum diaphragmate. Cordis enim involucrem innatum est diaphragmati. Vidi qui hanc passionem Pleuritidem veram existimabant, quique à secta vena calamitatem dabant. Suspicio de hac apud nos esse debet, vbi pestifera febris contagia agit. Hæc de causis, iam ad Differentias abeamus. Differentiæ sumuntur à specie doloris: (nam diximus Pleuritidem esse dolorem): quia vel valde pungit, aut non adeo. deinde à parte affecta eiusque situ. & à materia morbifica. A parte affecta, nam hæc est membrana, vel musculus. membrana vel interna, vel externa, musculus pectoris, vel intercostales interni, vel non interni, vel diaphragma: & tandem à causa efficiente, de qua prius dixi. Maxime autem inter costas; & membranam costis intexam se effundere potest sanguis: singula etenim intercostalia spacia rigantur à vena & arteria, quæ à vena azygos, & ab arteria aorta nascuntur. Hæc vasa bina exciuntur inter hanc membranam & musculos intercostales. vel effunditur sanguis in externos musculos thoracis; idque per illum ramum venæ causæ, qui alit profundiores musculos brachij, scapularumque simas partes. Dum enim vena causæ è thorace in axillam fertur, hanc venam eō emittit, arque hæc oculo quodam aditu foras fertur intro, ac ramulis venæ azygos se suis ramulis iungit. Argumento est in statu in hanc venam, quæ exemplo erigit venam azygos, causam, ac iugulares.

Oc.

Omnis  
pleuritis  
à sangui-  
ne.

De locis  
in homi-  
ne.

Tria va-  
sa per  
quæ af-  
fectus fit.

DIFFE-  
RENTI-  
Æ.

A parte.

Occulti hi mændri Medendi præceptorem non latuere; qui iussit, eiusdem lateris venam ferendam hæc esse. Atque veræ Pleuritidis materiam hæc fundit vena: quæ tamen, ratione situs, non iam Pleuritidem parit. Euenit autem, propter materię eiusdem naturæ rationem, vt hæc intrò repar, procreet quæ veram Pleuritidem. Et ex aduerso, vt si primum intus ex vena azygos subierit, transeret se foras; quòd ora venarum quæ à foris, & harum quæ internæ, sese mutuò amplectantur. Quin interdum diaphragmatis membranæ, mediastinum vocant, phlegmone occupantur: cum aimirum medium pectoris punctio læssit. Ita à parte malè affecta. Differunt etiam Pleuritides, vt causæ fuerint diuersæ efficientes: prodeunt enim pleuritides à phlegmone sanguinea, biliosa, pituitosa, vel melancholica. Quin etiam status & catarrhus nonnulli illud faciunt. Attamen veram pleuritidem efficiat materia sanguinea, biliosa, tenuis, hæc cum in membranam costis intextam incidit, parit veram pleuritidem materiâ & loco. Iudicio si standum, in eo quæ si quid ego iudico, puio maximas pleuritides nasci ex arteria aorta, quæ eximios ramos singulis intercostalibus spaciis affundit. Sed cur secta vena iuuat? Quis hoc ait semper iuuare? & cur non iuuat sæpe, cum vbique riuulos ac officia confocient venæ arteriis? Memini me iussisse copiosè sanguinem extrahere in corpore, quòd, vt ait Ennius,

*Et simul erubuit, cum lacte & purpura missa.*

Frustra. Puto si arteriotomiam admittere ausus fuissim, è re fortè futurum fuissim. Sed tamen, fateor, aqua mihi hic hæret, vascillare indicium. quare hæc non statim certâ assueuratione, sed virorum doctissimorum suffragia exambio. Nam quid suspicer in medium adfero: iudicate vos qui membranam costis intextam aliquando ausulstis, ac ramos ab aorta arteria excurretes vidistis inter-hanc membranam ac internos costales musculos. Vera itaque Pleuritis hæc est, vbi internam illam membranam, vel saltem musculos illi vicinos occupat phlegmone vera. Estque propterea hæc affectus vehemens, continuus, & indolentissimus affligens, mali moris. Finitur simpliciter, vel ætè. Simpliciter, quia ab-

solutè abit. hoc autem fit sensibiliter, vel occultò. Sensibiliter, vt expectorato, vel per abscessum, aut per lorium. Sed vnde nosce-mus membranam illam à phlegmone tantan? Aderit dolor pungens. respiratio erit parua & frequens, & difficilis, iussis, & assidua febris. Hæc, inquit Aræus, non sparsim adesse debent, sed conspitare debent. Doloris pûctorij causa est, dissentio membranæ acrimini sensus: difficultis verò eua-dit respiratio, quia thorax, ob grauem do-lore, necessitati non respondet. tussis causa est concussio thoracis frustra concitata. Febris causa est, cordis vicinia & societas cum thorace afflicto, per arteriarum riuos. Quare dolor pûctorius & impedia liber-tas spirandi, sunt verè pathognomonica signa inflammationis pleuritice. Deinde ex-pulso duto & serrito affectum diagnosti-mus. hic enim ita asperè digiti ferit, quasi quis ferram tangere: sit id ob duritiem & tensionem membranæ. Sed comitarune perennis pleuritidem febris? Cælius Aure-lianus ait febre acutam inordinatam adesse. Nunc, inquit, eodem tempore febriculæ concurrat, nunc superuenit, nunc antecedit, nec cessante febricula pæseuerat. Aratem Anaxioni febris soluta fuit vige-simo die, & pleuritidis vigesimo quarto. Vbi tamè vera adest pleuritis, verè adest febris. Quia verò variâ & loco & à materiâ Pleu-ritidem esse definiuimus: videamus iâ qui-busnam notis interstinguas quàmlibet ha-rum speciem. Si fiat hæc phlegmona in to-ta intexta membrana, totus thorax acer-bissimè dolet: rarò hoc euenit, estque euentu suo lethalis. Plerumque occupat latera. In-terdum mediastinum inuadit. tunc dolor mediù percellit pectus tractum in longitu-dine. Inter duas quasque costas sunt duo musculi, vnus internus, alter externus: Dū itaque inspiramus, deducunt se musculi externi: quare cum hi inflammantur, ægre spiri-tum trahimus. interni verò expirationi dicati sunt: hi inflammatis, ægre expira-mus. Tactus percipiuntur externi cum in vitio sunt, & pulsailis adest dolor, nec in-cubiturum ferunt. Hæ notæ partem affectam denotant. Causam verò efficientem ita dignosces. Adest phlegmone, hæc fit ab affluxu. Sed vt varius est in corporibus sanguis, ita phlegmone illa erit vel verè

*Nunc scilicet febrim sciam semper habere.*

*Gal. 1. Aph. 12. & 1. De loc. aff. 1. Signa Differentiarum.*

*Notandum.*

*φλυγμονή, quibuldam λευκίμητρώδη, cc 3 non-*







F. 13  
Pleuriti.In Pleuriti-  
miam quod  
alios.INDICA-  
TIONES  
curatiua.n id est  
consilij.

abire: etenim in huius inflammatione adeit delirium, nec dolor costas pungit, & quæ ventris pars surget vbi diaphragma; neque est ferrinus pulsus: costarum extrema dolent ad finem ossis sterni. Mentitur interdum pleuritidem, materia ad fibras (quibus costis inferioribus hepar iungitur) allabente, & cum in membranis pectoris viscida & crassa materia colligitur, unde dolor & iussis sine febre. At in musculis intercostalibus, vel etiam ipsis in membranis materia flatulenta dolore acerbum procreat: verum febris est expers hic dolor: quamvis etiam febris ob aliam aliquam causam adesse possit. Locum mutat qui à flatu dolor: attamen non semper. Quare nota numquid fecerit vel perpessus fuerit æger, unde nati status. considera iuuentia & lætæntia. Sursum repit status. Quod autem in Peripneumoniam abire, ira nosces: In augmento Pleuritidis subitò dolor minuitur, cæteris pelorantibus, ut cum Aureliano loquamur, signis: genæ rubicundæ, oculorum serior cum conductu superciliorem, tanquam in mœtitudine poliorum. His positus, eliciamus notas curatiuas. Hic acerbior dolor adest; qui respiciationem incipit; & *πεπρησμένη* concitat: quare in primis ille dolor mingari debet: Et quia in rheumate *εὐστασις*, tensio à sanguine, influxo continuum acerbè diuellit, & ratione huius ad euacuandum id quod tendit, de ratione illius, ad reuellendum & deriuandum id quod influit, nascetur indicatio venam secandi. Adest enim hic phlegmone à materia. Hæc autem materia est fluxa, fluens, & fluxura. Viden propterea vt edatur argumentum reuelendi, deriuandi, euacuandi: attamen, ob vicinum cor, à repressu materiæ est abstinendum. Ratio autem fluxuræ materiæ, siue ea genita sit, siue generari possit, reuellemus: & viscera corroborabimus, ne amplius hanc progignat. Id autè obseruabile, sæpè materiam influerè vsq. ad quartum diem. Cautione itaque habita totius corporis, ad ea quæ parui influxere eximenda studium conueniemus. Et quia in Indicationibus curatiuis aptè proponendis magnopere opera est opus, cum quæ frequenter in consilium vocetur hoc pleuriticum malum, alia etiam linea hoc sibi reahamus, quod pulchre hoc munere defungatur Medicus. *ἡ δὲ ὑγίει* &

*καλὰ*. Quoniam faciendorum Indicationes sumuntur ex Morbi essentia & natura, causis, symptomatibus, & parte affecta, distinguemus prius Pleuritidum discrimina, ab his à dictis sumpta. Primum quicquid est essentia) quæ est tumor piazæ naturæ) pleuritidis alia est magna, alia est parua. Magnæ (in qua symptomatum plena sunt omnia, & penè intolerabilia) debentur magna remedia: talia sunt duo, phlebotomia, & pharmacia. A materia, quæ est duplex, una frigida (ex qua non pleuritidis) alia calida. Frigida, inquam, ortu, scilicet, non corruptione: huiusmodi est pituita. Calida verò & ortu, & corruptione. vi est sanguis in causa antecedente integer affluens ab orgasmo, & ab ætiatione, non autem ab exclusione. Vel sanguis segregatus, in vtraque causa corruptus, ab exclusione pleuritidem facit; ut cum angina in pleuritidem degenerat; vel bilis segregata, vel naturalis non segregata. Neque enim audiendi sunt recentiores quidam, qui negant pleuritidem fieri à pituita, eò quod omnis pleuritidis sit inflammatio. Nam varie sunt inflammationis species. Sed obiciunt, Qui acidum eructant, raro pleuritidem infestantur: ergo pituitosarum infestantur pleuritide: & rursus acidum sit à frigidityate. Respondemus eo Aphorismo) Pleuritatem non negare materiam pleuritidis esse pituitam, cum Galenus ibi in Commentario doceat, ex Sputorum diuersitate, omnem humorem huius materiam esse posse. Non ergo acidum eructantes propterea raro infestantur Pleuritide, quod in huiusmodi corporibus desit materia pleuritidis, cum scribat ipse Hippocrates hyeme quoque fieri pleuritides, & in corporibus frigidis: Sed quod acidum eructantes diarrhœæ & hentericæ sint obnoxii. Nam in his profluuiis materia per aluum descendit, & in costas non influat. Sic hæmorrhagia causam peripneumoniz præcipit, sic quartana tollit epilepsiam. Fatemur tamen exquisitam illam pleuritidem hinc non fieri. Hyemales enim sunt pleuritides à materia frigida pituitosa, & à materia falsa in latius lapsa. Hæc autem pleuritidibus, dolore, febre, & spirandi difficultate multò sunt inferiores. In his itaque nascetur Indicatio reuellendi ac educendi illam materià pituitosam; dein incidendi, attenuandi, & abstergerendi.

Præterea.

Secunda.  
via Pleu-  
riti.

Præterea studiosè notandum num sit primigenia vel secundaria pleuritis. Primigenia non fit nisi ab orgasmo & ab attractione. quare orgasmus inhibeatur; & causa attractionis, vi dolor, sedetur. Secundaria non fit nisi ab exclusione materiz. Omnis autem Pleuritis secundaria, etiam cæteris paribus, tum curandi tum spirandi difficultate calamitosior est primigeniâ; quod materia non solum in causa coniuncta, sed etiam in causa antecedente, per priorem morbum fuerit corrupta, & nunc reddita sit multo contumacior: præterea quod hæc secundaria incidat in vires à priori morbo fractas. In indicationibus autem in primis ratio est habenda eius quod est; secundo, eius quod fit. Id quod est, est ipse tumor præter naturam à materiz copia. Id quod fit, est affluxus ille materiz. Primo itaque materia quæ influxit sui amotionem indicat, vel pars in suum pristinum statum restituitur. Affluxus verò inhibendus reuulsione, deriuatione, & purgatione. Materiz amotio fit euacuatione. hæc autem est vel vniuersalis, vel singularis. Si tantum pugnandum sit cum causa coniuncta particulari euacuatione, solu foci cutem rarefaciemus, & sanguinem phlegmones tenuatem, per halium digeremus. Sin non solum contra causam coniunctam, sed & antecedentem sit pugnandum, quemadmodum accidit in impuro & pleno corpore, non solum foci, sed vniuersali euacuatione est utendum; videlicet vel venæsectione, vel purgatione. A causis itaque procatasticis antecedentibus, & à peculiari eius qui laborat natura, hæc sunt distinguenda. Quæ enim pleuritis vltro incidit, si corpus fuerit impurum, non solo foci iuuari potest, quæ verò à foris accidit in corpore quadrato & sano, solo foci ea amoueri poterit. Hæc causa fuit quod Hippocrates præscriberit fomenta, vt cum causa coniuncta pugnet. Fieri enim potest vt, absoluta Pleuritide, nihil amplius affluat. Fotuum enim adhibitorum plurima sunt commoda. Primo iis Medicis explorat morbum: quia ex foci faciendorum Indicationes sumit. Si enim focus nihil profecerit (quod ipsius calore plus attrahatur quam digeratur; vel spiritus vaporosus ex calore generetur, quo dolor augeatur) ad remediij certum genus se conuertet.

Lib. 2.  
De acutis.

Fotuum  
semmodi.

Sin autem dolor iis cessauerit, auxilium id se inuenisse sciet, quo causam antecedentem auferat, videlicet attractionis auihorum dolorem. Etenim si fomenta calida dolorem non soluerint, corpus totum insigni aliqua euacuatione indigebit. Hæc autem est phlebotomia vel pharmacia. Hi sint positi scopii, iam collineandum, num hi attingi possint: non semper facili: quare facrarium Prædictionum adeamus, vt inde, tanquam ex cortice, pronunciemus quid curari, quidque minimè sanari possit. Tria ad Pleuritidis & asthmatis curationem requiruntur, naturæ robur, meatuum libertas, & materiz mutatio. Si hæc in promptu fuerint, sanari poterit. Finiur autem Pleuritis quinque modis: aut enim resoluitur, maturatur, putrescit, induratur, vel permutatur. Resoluitur dum materia in tenues discutitur autas, vel dum expectorato exhauritur, de hac postea aliquantulum prolixius dicemus. Maturatur, cum fit suppuratum. Putrescit, cum corrupta materia partem in gangrænam trahit: quod calamitosum est. Induratur cum exhausta tenui parte, crassior reliqua indurescit, quod raro vfi venit. Permutatur, aliò translatâ; vade paronisi, phreniisi, paralyisi, orihopnœæ, syncope, empyemæ. Plerumque tamen expectorato; & saussè ab eo terminatur. Illud enim promptè & citò prodire debet: quod Hippocrates *ἰσχυρίης ἢ ταχέως* appellabat procedere. Promptè, hoc est facili, leni breuiq. russi: id enim benigni humoris indicium est, non lenti nec crassi. Citò, hoc est, ineunte morbo. Procedant itaque expectorata commodè in qualitate (vt colore) consistentia (vt non viscosa) tempore (vt citò) & excernendi modo (vt promptè). Sed tripodem accedamus, non Phæbeados, sed medendi optimi præceptoris Hippocratis, qui etiam *ἰσχυρία ἔδει*, iametsi non *ἰσχυρίης ἢ ταχέως*, sed Sapienter ex facrariorum. Is ita ratiocinari videtur, Is pyralis mus ad saluam præclare facit & apparet, ex quo significatio sit integræ facultatis animalis, & libertatis meatuum qui sunt in thorace, vegetæque actionis naturæ, & bonitatis materiz. At ille qui fit inter quaternarium primum, hoc est, qui citò & expeditè procedit, est huiusmodi. Tum autem bonum est illud expectoratum quod admodum

PRO-  
GNOSIS.

Pleuritis  
terminatur quin-  
que modis.

1. Progn.

admodum est commixtum (robore naturæ coquentis & commiscens) cum flavedine. Si enim quarto die tale fuerit, tunc septimo erit album, læve, & æquale. Quasi dicat Hippocrates, citò & expeditè expectoretur; & si quid ad sit flauum, cum sputo admodum misceatur. Hoc volebat cum ita scribit, *Ευμεταγυγνεται τι φαιδρὸν ἐν ἑσπέρῃ ἡμέρῃ τῇ πρῶτῃ*: hoc est, Tum autem flauum exquisitè permixtum videri illi ipsi expectorato. Quare illud *ἡσπέρῃ* non ad flauum referendum, sed ad nullo ncm. Nam si multo post morbi ipsius principium (ut post septimum aut decimum quartum diem) expectoratur aut flauum quid [simplex aut malè permixtum] aut rufum [prout nimirum fuerit materię pleuritice cōditio] aut quod multam rufum adferat [cum difficili respiratione coniuncta: cum tanta bronchiis excrementa hærent, ut inde ægri reddantur anhelosi adeò, ut nec aëre possint conuenienter ducere, & fuliginem excludere] neque exquisitè permixtum sit [vnde significatur contumacia & cruditas materię pepasmi fugientis], deterius est: nam post septimum diem cum tale appareat crudum aut prauum, diuturnitas significatur morbi. Si autem nihil intra decimum quartum diem expectoretur, Pleuritis in suppuratum mutatur. Tum, inquit Hippocrates, id quod est flauum atque meracum [hoc est, mixtionis alieni humoris, aut feri naturalis, ab incendio expers] peritium plenum est, [quod materia toto genere sit praua.] Quod verò est album, & lentum, (hoc est *γλῆρρον*: & ut aliàs loquitur *παταγλιχρὸν μίανον ἀσπρίον*, hoc est, admodum glutinosum sit excrementū circa cōsionem. Quod enim loquitur, modicè glutinosum euadit, non tamen *παταγλιχρὸν*), hoc est, non summe glutinosum sit: & idè addit *ἀσπρίον*, hoc est, *ἀπρίον*, id est incoctibiliter] & rotundū [ab inæquali affatione] prorsus est inuitile: quia non excluditur materia pleuritidis: quare mali moris significat pleuritidem. Sed vide ne materia à capite decidua interdum decipiat, quæ nonnunquam cocta optimeq. mitigata expuitur. Prauū etiam est, inquit Hippocrates, quod est admodum pallidum (quod euenit à valido æstu) & spumans. Quod si expectoratum ita meracum sit, (expers nimirum feri pro-

prij, ut planè sit crassum & retortidum) ut nigrum videatur (mutationi humoris biliosi & sanguinei ad sumum progressa) de hoc omnium maximè vereri oportet. cum enim omnis pepasmi sit expers, necrofin naturæ & validum incendium arguit. Malū etiam est si nihil expectoratur (nam hoc naturæ infirmitatem, materię contumaciam, & meatuum obstructionem significat, aut doloris magnitudinem) neque quæquam pulmones excludant, sed à materia morbifica obstrit, in gutture ferreant: nam ut ebulliens aqua sonat, ita fit in conuiuentibus pulmonum vas, vnde murmur. Expectorata verò omnia sunt calamitosa quæcumq. doloris & morbi remissionem non adferunt: Quæ verò dolorem sedant, omnium maximè ad salutem expectorantur. Iam verò, ait mendendi præceptor, Quorum dolorum qui in thoracem incidunt, remissio nulla adfertur, neque materię expectorabilis purgatione, neque alui deiectione, neque venæ scissione & medicamento purgante, nec etiam dixit ipsa, suppuratū futurum scire oportet: nimirum intra decimum quartum diem. Quasi dicat, decet ab his remediis auxiliū expectare intra decimum quartum diem: si nihil attulerint commodi interim, in suppuratum abit. Sed languidiores intra decimum quartum diem moriuntur. Interdum tamen excurrit morbus ad vigesimum diem in suppuratum, ob materię contumaciam, & caloris natui inopiam. At suppuratum, 7. *Apr.* dicit Hippocrates, quæcumq. bilioso adhuc 18. expectorato suppurant (dum nimirum adhuc crudum & prauum est atque pepasmi expers. nam significatio inde adfertur partem suppuratam esse in abscessu, partem autè sub forma bilis permanere: quare calor robustior partium obfessarum non est par huic materię malæ, biliosæ), periculi plena sunt: (quod illa puris inæqualitas, materię contumacia & naturæ infirmitatem significet) siue illud biliosum perse, siue puri permixtum expectoretur. Ac scèn potissimum si illud suppuratum coepit procedere ab eiusmodi expectorato, morbo ad septimum diem progressu (tum spes in angustaq. cum nimirum pars suppurat, pars bilis remanet: pars tamè suppurata separata est à bile. Si talis, inquit, separatio incipiat apparere die septimo, id ma-

d d lum:

lumequod indomita materia, etiam viuida  
naturæ vi domari non potuit. Atque eum  
qualiter expectoratur, scribit id Hippocra-  
tes, metus est interitum decimo quarto  
morbi die, (quod longillimum est: cum  
nimium septimo die talia expectorare ce-  
perint) nisi aliquid bonum signum super-  
venient: qualia hæc sunt. Modicè & leuiter  
morbum perferre, spirare facili: dolorem  
sedatum esse: tum etiam expectoratum fa-  
cile tussiendo reticere: tum corpus videre  
æqualiter calidum & molle: & siis experiri  
esse: tunc etiam examinabis urinas, deiectiones,  
& somnos, & sudores. Si cui conuale-  
centium sit, eundem hæc symbola bona ad-  
sint necesse est. si moriendum, vel vnicum  
malum suffecerit: cætera citius aut ferius  
moriturum tantum arguunt. Sunt autem  
contraria his mala signa, grauiter & cum  
anxietudine morbum perferre ac parisi ni-  
mirum hæc iungantur cum illo spuito bi-  
lioso & purulento, quod septimo die ex-  
pectoratur: doctorem nullo modo sedari, ex-  
pectoratum vix tussiendo educi (quia cun-  
ctatur in pulmonum bronchiis) ardeat siis  
(vi febris) ipsumque corpus à calore inæ-  
qualiter affici, vi tamen thorax vel venter  
conflagrare incendio videantur: frons autem  
manus, & pedes frigore contra natu-  
ram obreant. urinae etiam, deiectiones, &  
sudores suo proprio quaque vitio laborare  
videantur. Nam si quid horum (sympto-  
matum) vna cum spuito illo (septimo die  
expectorato) inciderit, fieri non potest  
quin moriatur æger priusquam ad deci-  
mum quartum diem peruenerit, aut nono,  
aut undecimo. Cum itaque, inquit Hippo-  
crates, ex his quæ bona in alaque incidunt,  
subduda omni ratione collegeris (quoniam  
certò appareant ad salutem vel mortem)  
tum præfensiones effari oportet: sic enim  
maximè vera prædixeris. Nam si non sym-  
ptomata vi, sed naturæ potentia huius-  
modi spumum excludatur, & illa exclusio re-  
missionem adferat symptomatum pleuri-  
tidis propriorum, & accedat integritas natu-  
ralis æconomiz in urinis, sudoribus, &  
deiectionibus, salutem prædicet. At si sym-  
ptomata ratione eueniunt, & nulla seque-  
atur symptomatum remissio, sed simul ac-  
cedat summa æconomiz naturalis deprauatio,  
mortem prædicet. Iterum, si Dionis  
accidat eo die huiusmodi spumum, cum

remissione symptomatum propriorum, sed  
ad sit deprauatio naturalis æconomiz. So-  
crati verò id spumum accidit sine remissio-  
ne propriorum symptomatum, sed accedat  
integritas naturalis æconomiz: periculo-  
sius laborabit Socrates quam Dion. Quia  
plus facit ad mortem vnum signum proprium  
malum, quam ad salutem decem communia  
bona. Rumpitur ergo interdum suppuratum  
septimo vel decimo quarto die, sed ta-  
men raro ita citò: sed plerumque rumpun-  
tur die vigesimo, 30, 40, vel 60: com-  
putando non à primo die agitationis, sed  
quo cepit puris generatio. Vi enim mate-  
ria & loco frigidiora sunt, & quorum ma-  
teria crassior est, & membrana ergastuli era-  
ssior vel densior, eò rarius ad maturitatem  
veniunt. Pleuritidem etiam per secessum  
commode terminari auctor est Auicenna.  
Attamen Hippocrates scribit, *ἡ πλειθὴς*  
*πρὸς τὴν χύμην, διαρρηκτικὴν καὶ*  
*κακίαν*. Hoc est, à pleuritide (cuius vi languet vis  
naturæ) vehemèter afflicto (ob morbi ma-  
gnitudinem) malum. nam morbo fractas  
vires exhaurit, & significat in contagione  
abduci hepar nutritionique dicatas partes,  
solutamque retentem vim intestinorum.  
Quare magnæ & prauæ phlegmones inde  
confirmatae sit, properea dicebat Hippo-  
crates *ἡ πλειθὴς πρὸς τὴν χύμην*, hoc est,  
habito, detento: vi significare pleuritidem  
confirmatam & prauam, vi eius viscera  
in concordiam abripiuntur. Et à tali diar-  
rhœa vires prosteruntur, & siccitatem ori  
adfert, unde *τὸ πύλον* subsistens, in pus  
abit, hinc empyema. Sed Auicenna loquitur  
de diarrhœa quæ oboritur in eum mor-  
bo, cum natura à cacochymia pressa, eam  
excuit, vel tandem, cum pepasmi elucet  
signa, hæc superuenit. Quare in mediocri  
pleuritide, ubi non nasci solet diarrhœa à  
*κακοχυμία* viscerum, à pepasmo confert.  
Interdum, (sed raro) lotio excludi solèt hæc  
morbifica materia, quibulda enim in cor-  
poribus inserit se azygos vena ad venam  
emulgentem: æteris, naturæ vi, per arterias  
emulgentes effundi potest. Expectorato  
plerumque terminatur. & quo citius pro-  
deat, eò melius. Spumofum spumum malum  
est. Si primo die expectoratum procedat  
subrubrum, aut subcinereum, vel serosum,  
spes erit quòd quarto die ad maturitatem  
veniet, quodque terminabitur septimo die.

6. Aph.  
16.

Diarrhœa  
naturæ.

Lotio in-  
dicatur.

Expecto-  
ratio tem-  
poris.

Si

Si serius expectorare ceperit, & si ad maiorem veniat die quinto, terminabitur vndecimo vel decimoquarto die. Si ante septimum diem nihil processerit, aut si ea fuerint pauca & pepsini expertia, si fuerit vera ac acuta pleuritis, morietur ante decimum quartum diem, si vires languent: alioquin serius. Materia pleuritidis interdū ad cerebrum repit, vnde phrenitis, & inquit Aretæus, coma; tandem syncope consumuntur. Qui habent ventrem naturā humidum; non ita laterali morbo tentantur, inquit Hippocrates. Repentina mors incidit in pleuritidem, cum subito rapta materia pleuritica transferatur in cor, vnde syncope. A Sanguine quæ sit mitior est: à melancholico sanguine periculi plena est. Abile subito nouetur, nam septimo die, quod longissimum est, terminari solet: sæpe sudoribus, & nonnunquam hæmorrhagiā: hæc enim liberaliter ruente, liberantur. A pituita quæ nascitur, raro ante decimumquartum diem finiunt, sæpe excurrit in longius tempus; quod Anaxioni euenit: facileque in peripneumoniam vertitur. Quod hoc modo deprehenditur. dolor minuitur, febris spirandique anxietudo maior euadit, spumescit amplius sputum quàm prius, gæne rubent, & cuncti hi ferè moriuntur. Pleuritis post alium diuturnū morbum, est calamitosa. & illa etiam periculi plena est, quæ inuadit corpus à cachexia foedatum: nam ea pleuritis nascitur à succis ab occulta labe contaminatis. Vrina tenuis, vel rubens admodum, mala est. sed serius non multum hic tribuas, fallunt. Mala siquidem si fuerit, periculosa est: ac bona, non semper est salutaris. illa enim alio morbo venas occupari denotat. Pulsus paruus, frequens, serinus, lethalis est. Perennis si addit dolor, sine expectoratio procedente, calamitosum. Funesta omnibus modis est pestilens à diaphragmatis phlegmone pleuritis. Dextro in latere si concepta fuerit pleuritis, minus inde periclitantur, inquit Auicenna. Sin sinistram latens occupauerit ad ossa sterni, ubi membrana diaphragmatis, periculi plenum id erit; ob cordis viciniam. & breui in vigorem abit. Cum ægre prodit expectoratum, in empyema abit: hoc rigores indicant, inquit Aretæus. sedere cupiunt, spiritus decerius ducitur. tunc metus est ne pulmo

pus multum subito itahens, hominem suffocet. Nam pulmo, inquit Aretæus, rarus & calidus trahit in se ipsam proximam, vnde subito pereunt, propterea naturā calidus esse periculosior hic cunctus. Si hæc pericula euaserint, empyi euadunt. Nonnullis phlegmone & dolor erumpit, ita ut eorum locorum qui foris sunt affectus esse videatur, cum tamen interiorum locorum vix sit incrementum. sit enim hoc per metaprosin, manente, (non autem emigrante) primario foco. Si æger quarto die nihil vel pauca expectoret, striditque ab anheliu laborant, febribusque dolorque si vigeant, septimo die moriuntur. Sin quarto & septimo die minus egerit, collinea ad vndecimum: in quo si spura commodè prodeant, ac symptomata mitescant, decimusquartus meliora dabit, & decimusseptimus optima & vigesimus saluus arguenda afferet firma. Nam, ut scribit Hippocrates, Morbi acui omnes quatuordecim diebus terminantur. Decimusque ex Hippocratis sententiā, quamuis in vigesimum diem excurrerit citius, eam tamen in decimum quartum incidere morbi acui. Quod enim asserit Hippocrates terminum acutorū morborum, quod longissimū est, esse decimum quartum diem: hic terminus refectri debet ad historiam morbi, vel ad vigesimum symptomatum. Ad historiam morbi, cum illico primoque die explendet hoc morbi acumen, is terminatur decimo quarto, quod longissimum est: at si primum modestè sineq. acumine ingrediatur morbus, mox die quarto suum induat acumen, is decimosextimo iudicabitur; nam is est decimus quartus *ἡμέρας* symptomatum, at est decimus septimus ab historia morbi. Ita si lento pede ingrediatur morbus, verum cum ad septimum ventum fuerit, si tunc prodatur ac acutus, is vigesimo iudicabitur die: nam ille vigesimus dies, ab historia morbi computando, est decimus quartus à septimo die, quo die palam fiebat illū morbum acutū esse. Si ergo quartus dies, in percuto ab initio morbo, proulerit pepsimi signa, euadet æger die septimo: sin dubia illa signa fuerint, in vndecimum vsq. excurreret. Quod si nono die prauæ apparuerint notæ, morietur decimoquarto. Idē iudiciū esto decimosextimi de vigesimo. Prognoses huius morbi eleganter

dd 2

profe-

3. Pres-  
etel. 5.

De aëre.

Num à  
sanguine,  
& alijs  
num a  
succo.10. Me-  
tho. 5. &  
Aretæus.  
In peri-  
pneumonia  
ad aërem.  
In nota.

2. 4. 10.

Hippocra-  
tes expli-  
cat, de  
termino  
acutiorum.

Cap. 16.  
fol. 241.PHLEBOTO-  
MIA. &  
A. Vena  
sanguis.

prosequitur Galenus libro *Παθολογικῶν* in *ἑκτάῳ*, capite decimonono. & ipse Hippocrates in Coacis prætorionibus, quas diuino vir ingenio L. Duretus non vquam interituri enarrationibus in lucem reuocauit. Iam ad Curationem venio. Vulgo etiam notum est maximam curationis partem esse in prompta venæ sectione. & ratio hoc fuadet. est enim phlegmone maximo dolori consociata, non sine perenni febre. Cum itaque magnus morbus adsit, ei debetur maximum remedium: talia verò cum duo sint, phlebotomia & pharmacia, cumque sanguineis morbis (vt phlegmone est) dicata sit phlebotomia, hæc præclare hic in sum ducitur. Est enim Phlegmone tumor ab influxu sanguine: & non solum ille influxit, verum adhuc influit. Iam verò, Quicquid eiusmodi est vt vna avertat causam antecedentem, vnaque euacuet causam coniunctam, id præclare ad phlegmones curationem facit. Tale autem remedium est venæ sectio. Hæc enim elicit sanguinem qui tumorē ac dolorem facit in membrana costis intexta, vt demonstrauimus antea, vbi de Indicationibus curationis. Summo enim studio anniti debemus illico, vt quamprimum dolor sedetur. is enim dum perseuerat, crescit ab attracto sanguine tumor, indeque ipse etiam dolor incrementum ducit. Verum non alio remedio promptius mitescat, quam si is qui influxit sanguis euacuetur, nouitque affluxus auertatur. quod fit secta à vena.

Hoc est quod volebat Hippocrates, vbi ait, Cruentum si fuerit expectoratum, à sectione venæ esse temperandum. Hoc voluit, si plena manu expectoratum sanguine mixtum procedat, ita vt inde mitescat dolor, febrisque conquiescat, non opus erit phlebotomia, nam natura excludit ipsa suum onus, phlegmonesque materiam elidit. Si verò sanguineum expectoratum parce prodeat, si nec dolorem nec febrem excludat, cur non fecerit vena? an non vehemens affectus? Angina si in pleuritide permutat, nec vena erit secanda, nec alius mouenda, si ea laxa fuerit. Si ab extraordinaria quadam aëris constitutione prognata fuerit pleuritis, vt cum *ἀγρία* non sunt *ἀγρία*, aliquid maligni præferre solebat, (quod *τὸ θύον* appellat Hippocrates) diuino etiam remedio, hoc est

antidoto domandum: nam venæ sectio vehementer nocet. & sanè merito: Nam abalta excellentiq. quadam putredine, rationi incognita, nascitur; quæ valide cecinnadebat, bellumq. acerbissimum mouere vitali facultati. Ita refert doctissimus Gesnerus in Epistolis, pleuritidem quadam notham aput suos grassatam esse cū tussis molestissima, quæ sudando ferè in lecto, nulla venæ sectione curabatur. & alibi, Spuria quædam vagatur aput nos pleuritis sine inflammatione & sanguinis spuro, cum febris & dyspnœa quadam periculosa. Horum quibusdam, inquit, venam non fecui; oxymeli dedi cum saccharo crystallino, & recreabantur. Et alia quædam affligebat cum sputo sanguinis, planè maligna, quæ intra quatuordecim aliquot homines sustulit. Et postea, Pleuritis, inquit, grassatur hic maligna & contagiosa, qua multi pereunt: curandis ratio nondum constat nobis: vena in brachio secta nulli adhuc successit: nunc ad malleolos secamus scilicet, & à principio aliquos sudare iubemus antidoto aliqua. oleum lini potum aliquibus profuit, quod etiam copiosè aluum dedit. Et quadragesimā nonā Epistolā dicit. In hac pleuritide nihil melius repperi, fescuncia olei lini, vel amplius: quod anhelum mox faciliat, & aluum probè euacuat. Inde est quòd aput Cælium Aurelium Asclepiades testatur se vidisse apud Athenienses atque vrbem Romam, phlebotomiā vexatos vel peius acceptos fuisse pleuriticis: in Partio verò atque in Helleponto resumptos atque releuatos. Sed quæ copia est abducendus sanguis? Respondet Hippocrates, dum colorem mutat. Quapropter si primum albidior ille fluxerit, cum purpurascit sistatur: & cum primum purpureus exir, diu liuescens sinitur supprimatur. Hæc enim agi debent, vbi vena proxima est affecto loco: alioqui, si in aliis affectibus idem quis agere velit, nimia foret euacuatio, antiquam sanguis à phlegmone abduceretur. Propterea vbi in interno thorace est dolor, cō non perueniatur: nam ex partes, inquit Galenus; nutritium suum hauriunt à vena sub corde: & cordis partes multum in anis debereunt, priusquam sanguis phlegmones euacuaretur. Quare si in iugulo vel clauicula significatio fiat, vel in brachio aut ad mammæ,

1. lib. 9.

fol. 17.

verba

P. 15.

1. lib.

Epist. 15.

1. Epist.

15.

6. Epist.

Copia extrahendi sanguinis.

1. Acad.

10.

In phlegmonibus Pleuritide.

vel super diaphragma grauitas percipitur, cumulatè sanguinem, donec tubicundior multò effluat, aut certè loco rubentis & pariliuidus, nam vtrumque euenit, inquit Hippocrates. modò scilicet æger par sit. Ita eadem opera causam phlegmones antecedentem accites, & coniunctâ amoueas. Coniunctæ autem amotio declaratur mutatione sanguinis rubri in liuidum. Quia quo propius abest sanguis à phlegmone, eò deterior est: quo verò longius, eò melior. Sanguis enim is qui parti affectæ est proximus, est liuidus & ater: quia sanguis in eundem ibi conflagrans, colorem mutat & consistentiâ. Talis itaque euacuatio apissimum est remedium curandæ pleuritidi superiori, hoc est, quæ fit affluxu materiæ per venâ intercostalem & mammariam. Sed tamen cautio opus est: Si enim infederit loco firmiter sanguis, & densiore membranâ collis intextâ si impingatur, non poterit ad coloris vsque mutationem abduci. Quin vegeta naturæ vi opus est, vt vna vice ad coloris mutationem eum educas. Quare non solum ad mutationem coloris erit animus vertendus, sed etiam ad pulsus. Sed semperne erit secunda vena? Respondet Hippocrates, venæ sectionem non æquè valere ad amouendum & discutiendum dolorem, nisi ad iugulû dolor euenerit. Cum enim affluxus sit per venam intercostalem, quæ non procul abest à vena axillari interna, cuius sectio sanguinisque emissio ad mutationem coloris, remouet causam coniunctam & reuellit antecedentem. In pleuritide verò costarum inferiorum, à materiæ affluxu per venam azygon, venæ sectio tantum valet ad reuellendam materiâ quæ insidit: non autem ad amouendam eam quæ insupit. Non valet ergo venæ sectio ad omnem pleuritidem, pro causæ coniunctæ amotione. Sed quando erit pertundenda vena? Illico, primoque die, nullus enim hic moræ locus est, inquit Arætzus, quin protinus valenti remedio occurramus. febris enim acuta ad perniciem properat, & dolor in petus vrget, & tussis pectus caputque concutiens vires prostermit. Nisi, inquit, fuerit à crepala, tunc vnum diem interponere licet. Itaque eodem die euacuatio fiat: vt aueratur rheuma illud concitatum, ne nimis irruat in locum do-

leniè, fiatque phlegmone maxima. Ostrauus Horatianus intra tertium diem hoc agendum censet. Si cunctationi locus, vitabis diem impari in sectione: potiusque quarto quàm tertio die secabis venâ. Sed dices, Hippocrates primum occurrit fomentis. Hoc ille egit, vt, si non plurima esset illa morbosica causâ, discuteretur. Quare ille nunquam illud tentauit, vbi æstuat febris, irriguo sanguine habito, dolore atroci. Cum increuerit dolor à foru, documento erit vberriam materiæ, quam potius non est exaurire foru. Dices, scribit Auicenna, cum euacuare vis, primum sedes dolorem: quare non illico est pertundenda vena. Respondemus, duplicem esse euacuationem: vna sensibus comperta, alia, quæ fit per *ἀλλος ἀλγεῖν*: de vltima hac agit Auicenna. Dum enim abducitur causâ coniunctâ tendens partes sensu exacto præditas, sedatur dolor. Quamuis infamatorius qui adest affectus luadeat vnicæ vice plurimum, vt diximus, sanguinem emittendum esse, iterata tamen sectio mirum in modum iuuat. Quare tertio vel quarto die repetatur perseverante dolore, vt colorem venat sanguis. Auctoritatem petis? audi quid referat Aëtarius: Inflammatio, dicit, & ignis facit qui in pulmone & septo transiit, musculisque costis intextis oritur, celere auxilium postulat, obcor quod inde calet. primum itaque omnium vena secanda est, & bis terque, si cōsultum iudicabitur. Sed quænam vena erit pertundenda? an eiusdem vel aduersi lateris: an cubiti vel pedis? Hippocrates respondet, Si in iugulo vel clavicula doloris significatio fiat, (id enim significat materiam per venam intercostalem affluere) vel in brachio & distento nimirum ramo subclauio, venæque mammariæ, quæ primo ab eorum ducitur) aut ad mammas, vel super diaphragma grauitas percipitur, tum iuuat pertundere venam in cubito internam: hoc est, axillarem internam, quam vulgò basilicam vocant. ductâ à ramo subclauio: qui quidem ramus fibrarum rectitudinem in vicinâ est, & contigua venæ intercostali & mammariæ. Basilica statim oritur à venæ causæ sectione: hæc dico vena, id quæ repetito, venæ intercostali & mammariæ, filamentorum rectitudine, est continua, & vicinitate cōiugua-

*Dilectum  
2. Aet.  
in intro.*

*MODVS  
agendu  
in Phle-  
botomia*

*Quæ  
VENA  
secanda.  
1. Aet.  
10.*

dd 3 Qua.

*Genio.*

*phlebot.  
omnia vsum  
nouum sem-  
per neces-  
sarium.  
2. Aet.  
8.*

*THU-  
PVS  
phleboto-  
mia.*

Dubitum.

Nunc op-  
posita la-  
teris vena  
secunda.

Quare Arabes malè venterunt illud ~~argu-~~  
eris, ex opposito. Sed obuiat, Ea pleuritis quæ per venam mammariam in illo excutatur, potest aliquando esse infra diaphragma: conferre ergo illis potius phlegmacia? nam licet venæsectione causam antecedentem reuells, causam tamen coniunctam nequaquam eadem opera euacuas. Huic enim causæ præcipue studet Hippocrates: qui propterea in inferiori pleuritide potius purgatione, quam venæsectionem præscribit. Respondemus, primum ramum illius venæ mammariæ esse venam axillarem: ideoque ea secta vitæque causam, & antecedentem, & coniunctam tolli. Sed dicit aliquis, Aretæus, Auenzoar, Archigenes, referente Aëtio, & doctissimus Manardus, extrahunt sanguinem ex brachio oppositi lateris: & Rases hoc etiam agit, si plethora adfuerit: quidam etiam sapheiam eiusdem pertundunt lateris. Respondeo, omnes tamen hos in rheumate consistente morboque confirmato venam ferire affecti lateris. Et merito. Quare, vbi adest rheuma solum concitatum, hoc est vbi primum fluxio incipit valenter irruere, cumque nondum contingerit rheuma, verà & solà (secta aduersà venà) reuulsione erit vitandum. Hæc enim reuellit futurum rheuma consistens: non enim adhuc factus est morbus validus, sed qui facili postea excludatur. Quare vbi metus pleuritidis adest, opposita vena feriatur. vt si quis ex dextro latere affligi solet: ei cotinans sinistrum brachium aperitur: quò discat natura abire ab imbelli parte. Sed si præsens iam adsit pleuritis, ita vt partim influxerit materia, partim adhuc insuat, eiusdem lateris vena axillaris aperitur, causas diximus. Quare semper, vbi vehemens adest dolor, eiusdem lateris vena scindi debet, hæc enim sectio sola dolorem minuit: quia causam amouet coniunctam, & natura solet à dextris partibus in dexteras sua iecrementa explodere. Sed dices, An non ita in latus doleus abduces sanguinem? Dico cum euacuati. Si tamen circumfluat corpus à sanguine, isque adhuc insuat adeò, vt fomentis non mitescat dolor, etiam si eiusdem lateris secta fuerit vena, eodem die vel sequenti, feriemus aduersam venam: quo caput (quod graue à sanguine est, toto venarum genc-

re dissentio corpore) ad latus aduersum materiam effundat. Sed tamen, inquit Rases, si dies aliquot argum afflixerit, fluxusque confluere, sanguis emissus ex cubito affecti lateris remedium est. Quare in succipiens illis corporibus, si dolor non virget, licet oppositi lateris venam soluere. Et hoc est quod Auenenna dicebat, cum ait, Vbi ad longinquam trahis, primum secunda dolorem: ergo ex eodem latere, vbi dolor vehemens est, sanguis emitti debet. Quare cum ab interceptis mensibus nata est pleuritis, si sapheiam pedis venam aperueris, nec dolorē demulcebis, nec menses euocabis; nam grauiorem infarctum facies. Quare illico, atroci in dolore, brachium ferias, mox pedem. Sed si dolor nō sit magnus, verum si subitō & iam non admodum sit quòd tepressi sunt menses, adeò vt inde certò cognoscas magnæ pleuritidis metum adeste, vtilis erit sapheiarum reclusio. Sed cur Hippocrates, in illa pleuritide quæ descendit, nec iugulum petit, venæsectionem negligit, quam reuocare Galenus videtur? Respondeo, cum virget Pleuritis, adest phlegmone: hæc sit à sanguine quouis. Propterea notio hinc surgit æm euacuandi qui dolorem facit: nam si hic eximatur, non cedit dolor. Quare si ascendente dolore, vitamur pharmaco, ille non eximeur: etenim non abducemus à tensa parte id quod ei incubuit. Ita cum dolor descendit, nec iugulum ferit, pharmaciâ abducitur materia quæ insedit parti ægræ. Veruntamen vbi se confociat ardentissima febris (quod rarò tamen euenit dolore descendente, vt potius quòd à frigido crassoque sanguine euenit) tutior est venæsectio: quamuis alioqui minus auxiliij adferat quàm pharmacia. Tura est sectio, non enim febrem incendit vt pharmacū, & sisti potest: quod hausto à pharmaco non licet. Hæc est Galeni sententia. Propterea vbi clementior est febris, ad eleborum nigrū ire vtile fuerit. Documento est Hippocratem collineasse ad causas frigidas, peplij (id est portulacæ sylvestris, baccarum peplij) quum commendat vsos: nimirum ad pituitæ exclusionem: & elebori, ad melancholicum sanguinem, quin ipse Galenus vsum calocythidis commendat: nam metus in tam tepida febre nō est vt accendatur. Ictico nō sine maxima arte hæc

Si à ven-  
sum sup-  
presione.A. Aet.  
10.



hæc innuit Hippocrates, qui voluit dolorem sursum repentem à tenui sanguine esse, auctore phlegmone, à qua inflammat febribus vehemens, cui pharmacia interdici debet. Sed deorulum verso dolore, consentaneum est hunc orum fuisse à pituita vel melancholia, ponderibus suis depressis, unde frigida & lenta erit talis phlegmone. Iccico religiosè considera cum Galeo, num descendens dolor sit vehemens (quod raro euenit) si ita, erit phlebotomia vsui, non pharmacia: licet lentore medio veniat. Scribit doctissimus Rondeletius se non nullus à pharmacia enecatos vidisse. Obseruabile illud est, quod interdum nascatur difficilis respiratio à malè præscripta diata: hic Medici malè venam secant. Si haimorrhagia è naribus vel vietro commodè euenit, venam non secabis. In contumaci pleuritide sæpe iuuat repetita venæsectio. Cucurbitulæ veniant nonnunquam loco venæsectionis, vt in pueris: sed cum membrana costis intertexta, quæ hic malè afficitur, torum pectus cingat, non pectori, sed in infernis lumbis illæ infigantur. Quia ad materiam quæ lateri incubuit, loco dolenti cum scarificatione admoueri poterit. Semora à cucurbita compunctæ partes sale fricentur, quo ichor & sanies effluant, aut linteum sale & oleo madefactum impone: & postredie rursus affige cucurbitam, quò ichores elicias. Hoc agendum à secta vena ac post vacuationem totius corporis: quò nihil adducat alicunde in se cucurbita, solumque id quod admortæ parti est exugat. Aretæus non ante septimum diem hoc agendum præcipit: Ægineta post decimumquartum diem vitur his, alij à septimo vsque in decimumquartum diem vsum harum commendat, modò cum scarificatione, modò sine hac, cum spes aliqua elucet, foras materiam abduci posse. Si à cæteris remediis dolor non mitescat, commodissimè loco dolenti imponetur. Scribit Trallianus, plerosque hoc remedium iuuasse, maximeque eos quibus irriguæ non sunt à circumfluo sanguine venæ. Sed, inquit, oportet acutissimo scalpello locum probè scarificare, quò ex alio prolesterit sanguis. Hoc modo non sine admiratione acerbissimus dolor conquieuit, vt neque somento, neque alio præstidio indiguerit. Longus vsus docuit hoc

Medicos & idiotas: nam vbi exigua copia sanguinis est, commodissima est hæc curatio. Hæc cucurbita sit lata, quò totum locum dolentem ambiat: cum scilicet non altus est dolor, hoc est, cum non interius ascendit, sed cum in latitudinem diffusus est. Ignis sit multus, auctore Aretæo, quare cum oleo subiiciatur, nec carni imprimito vasculum, sed transitus aliquis aëri detur, ita flamma diutius micabit: & abunde trahatur sanguis. Secundo die apposita cucurbita iuuat efficacius: postquam à scarificatu primo sale & oleo (si fortis sit homo) locus scarificatus illius fuerit. Die tertio imponit Aretæus ceratum cum oleo cyprino & rutaceo: nam à loco afflicto exugit. Maximè verò probauerunt tales cucurbitas, si dolor ac tumor foras vergat: etiam confestim ineunte morbo, vbi plethora non adest valida. At in exquisita pleuritide, eò non venias, antequam purum sit à vacuatione corpus: iis enim partem aliquam materiæ morbificæ disciuit. Sed si addò inirò vergat malum, expectatumque ritè procedat, ab his cucurbitis abstinendū. Quapropter in notha pleuritide, vbi foras vergit, maximè locum habent cucurbitæ. iccirco Rases dicebat, Si rubor & tumor in cõspectu se dederint, doleatq. à tactu locus, incisa cute affige cucurbitas. Sed priusquàm ita prodit, licet secare venam brachij: cum verò apparet, noli. Rases loco cucurbitarum imponit nonnumquam emplastrum ex sinapi, donec modicè locus exulceretur: prius tamen sectâ venâ, & purgato corpore, vel admouere licebit hoc. Accipe florum chamæmeli, malux, cuiusque manipulum: radicem iros & alihæz, singularum vncias tres: ficus aliquot, pistentur à coctione: adde sinapi rubri vncias quinque, cum axungia veteri, fiat cataplasma. Hoc attrahit in cutem, & dolorem sedat, vel brassicam coque in butyro, adde simum columbinum, & pistentur simul. Verùm cum hæc punctioibus imponuntur, notandæ erunt vires ægerorum: nam tenellulæ carnis homines ab his in syncope præcipitari possunt. Iccirco scribit Aretæus, vbi sale confurgenda sunt vlcuscula hæc à scalpello: in tolerantibus etiam hominibus, non ipsis vulneribus eum iniicias, sed super linteolum oleo madidum inspergatur: id verò super locum scarifica-

Empla-  
strum le-  
uè chaer-  
bita.

tum

Obserua-  
tio.

Cucurbi-  
ta.

*Cautio in  
Sedulo.*

*Medica-  
menta ad  
causam  
antecedentem.*

*Leu-  
cemia.*

*Trapa-  
rancia.*

*Cadit  
materia.*

tum extendito. Humiditates enim ex salis colliuatione manantes, minus quàm sal mordaces sunt. Cautio adit ne longa à tabe curiosis ac emaciatis sanguinem abducamus, cum his lateris superuenient dolor. Etenim secari vidimus plurima talia corpora, ac deprehendimus eorum pulmones arctè, *περὶ φάρυγγος*, membranæ costis intextæ adnecti. Dum enim ventosus quis vapor se inserit huic nexioni, continuū auclit. His fiat foras sacculo cui inclusi sint flores chamæmeli, anethi semina, & cumini: hic ex vino albo lateri imponatur. Vel calidum à furno panem seca in binas partes, & theriacā delibutum imponat. Medicamenta quæ ad pleuritidem præferuntur, dicata sunt eius causæ, vel dolori. Causæ, quæ nimirū toto corpore fusa est, vel quæ pectore iam est concepta. Quæ toto corpore dispersa est, abducitur pharmaciā; & illicò, magnodque remedio, vt elleboro, de quo mox dicemus. Si tamen res moram patitur, vt quæ innotescat quo modo, si longius excurrat in tempus, haberi debeant ægri, serie, quam tamen in magno malo negligemus, rem ducam & absoluiam. Si alius restagnat, leui remedio abducatur. Cassia hic locum habet: nam alas pulmonum explicat, naturæque est consentanea: vnde pars eius aliqua in nutritum abit, vel delibet saltem chylum. Huic iunge interdum drachmas duas electarij de succo rosarum. Sirupus violatus solutiuus & rosatus præclare conferunt. A cruditate si nascatur, mel rosatum laxatiuum, vel species hieræ, & pilulæ alephanginæ vtiliter præscribes. Si fuerit pestilens hypochondriaca pleuritis, cottidie iniiciatur enemata. Accipe hordei mūdātī semenciam: violatum sesquimanipulū: maluæ manipulū: coque ad dimidias: libræ adde olei violati vncias tres: sacchari rubri vncias duas: salis drachmam: misce, fiat enemata. Aliud: Accipe sacchari rubri, calidæ recentis extrahæ, cuiusque vnciam: olei violati vncias tres: decocti quattuor herbarum emollientium cum hordeo & prunis, quod satis sit, fiat enemata. Parabimus materiam quò natura eius reddatur potens: id ad quartum vsque diem interdum agimus. Hæc remedia sint pectoralia. Si causa pleuritica valdè calet, Accipe syrupum violatum, & iuiubini, cum

aqua hordei saccharata. tandem adde syrupum capillorum veneris, & de liquiritia. Sumat cotidie vncias quattuor. Vtilis est etiam acetosus simplex sirupus. Propinatur etiam cum decocto seminum maluæ, capillorum veneris, violarum, seminis papaueris, vel florum papaueris rhæados, emulsionē seminum melonum. Accipe hordei exorticati seminanipulū: iuiubarum, quindecim: sebesten, liquiritiæ rasiæ semenciam: passularum vncias duas: coque ex aqua. Vel, accipe sirupi violati, iuiubini, singulorum vnciam: aquæ violarum, vel decocti pectoralis vncias quattuor: vel tantundem aquæ tussilaginis. Addimus interdum sirupum capillorum veneris, de farsara, de liquiritia: interdum propinamus hos cum duploaque hordei: vel in aqua hordei coquimus passulas & glycyrrhizam. & à ieiunio per triduum bibitur. A quarto die sensim crescat sirupi liquiritiæ copia. Sed ineunte morbo, Accipe florum papaueris erratici, & cyani, cuiusque seminanipulū: pimpinellæ manipulū: aquæ scabiosæ vel pimpinellæ, vncias duodecim: macera tepidè: adde saccharum: detur in principio ter die. Accipe priapi cerui drachmam: detur cum decocto pimpinellæ. Ita etiam propinamus scobem dentis apii. Vel, Accipe succi pimpinellæ vncias duas: aquæ rhæados vncias tres: bibat, & se sudori præbeat. eadem ratione exhibentur succi cardiacæ vnciæ quinque. Si regione quis laborat calida, æstateque feruida, perpetuò bibat serum caprillum. Si vigilæ vrgent, fustat sirupum violatum & papaueris, cum decocto hordei. Si tussis admodum siccā fuerit, manè singulis diebus porriges iulep violatum: deinceps decoctum hordei. Post septimum diem accipe sirupi violati & de liquiritia, singulorum semenciam: adde tussilaginis vncias quattuor. Ore teneat diapenidium, vel diatrageanthum, vel saccharum crystallinum. Admonuit senex ille medicus Razes, cauendum esse à calidis. nam, inquit, ex imperitorum Medicorum hallucinatione, multa huic malo accidunt augmenta: velut cum in membrana costis intexta, crassos status infarctos coniecturantes, confectionem diamofchū, aut huic in discutiendo & incidendo partem intempēstiuè porrigunt: nam ægros iuga-

*Hæc enim  
dentur  
cum em-  
plicitatē  
procedit,  
nam ar-  
dent vici-  
sa, per  
qua in-  
fluit sem-  
guisina  
& corat-  
lata.*

*Cautio.*

ingulant hac intempestiva curatione. Si materia fuerit frigida, nec aflu ferociat febris, fiat potio ex mulla in qua ruta decoxit. post etiam incoquimus hyssopum vel calamintum, aut origanum vel iridem, aut radices aristolochiae, vel phu, aut chamæpitym. Sirupis vitum de liquiritia; & de farfara: est comfarfara, auctore Galeno, modice acris, ita vit citra noxam rum-pat thoracis abscessum. Oxy-mel simplex, sirupus de hyssopo. Si febris inter, propina-mus etiam sirupum de prassio, & de cala-mintha; temperamus hos cum sirupo de chichoreo, (interdum addimus mel violat-um) & cum decocto violarum, scabiosæ vel tussilaginis exhibemus. Quidam ma-gno successu præbent fimi ab equo calen-tis, aucto paffi, globum: exprimunt cum vino albo. Sumat manè cochlear mel-lis cocti cum butyro, adde semen urticæ. In diuturna pleuritide da drachmam vnam balsami ex decocto violarum & li-quiritiæ. Si expectorata cruda fuerint, ac-cipiat myrrhæ drachmas duas: croci scilicet pul-ulum: piperis grana quindecim: mellis semilibram: coquat simul: sumat semico-chlear. Vel accipe gentianæ, myrrhæ, ari-stolochiæ, baccarum lauri, partes æquales: melle cocto excipe, da fabæ quantitatem cum aqua molla. Hoc dictum fuit myste-rium ab antiquis, inquit Aëtius. si fuerit puerpera, adde dictamnium & semen ru-tæ. Commendat Aëtius ari vel dracontuli radicem coctam. Si fluxus aluius super-uenierit, dabimus sirupum myrtillosum. Si crudum expectoratum fuerit ac lentum, Accipe sirupi byzantini semunciam, siru-pi de pomis, vaciam: oxy-mellis scillitici se-munciam: decocti sebesten vncias quat-tuor: detur manè. Diaireos electarium re-nectat ore. Laudat Razes, cum procedit expectoratum, vi cotidie manè propine-atur decoctum quod præscripsit capite 14. vbi De Distillatione. Verum, inquit, si fe-bri & vehementia morbi perseverauerint, atque ægrè sputa procedant, præbebis de-coctum à nobis præscriptum Capite De asthma: quod etiam dum saniem exclu-dunt, vtiliter administrabitur. Omnia quæ per os exhibentur, hyeme dentur calidè, æstate tepidè. Si pestilens fuerit pleuritis, Accipe theriacæ recentis drachmam: detur cum sirupo violaceo & aqua cardui bene-

dicti. Iam ad purgantia venio. Ut duplici maxime idèa variat pleuritidis duplex for-ma purgandi in vsum duci debet. Est enim quædam pleuritis in qua incendij plena sunt omnia: in hac, siue superna siue inferna feriat dolor, vena secanda est, nec validæ purgationi locus esse potest. Talis plerumque est quæ superna petit, quæque iugulum vellicat. In hac non pur-gabimus initio, sed cum pepasmi notæ elucescant, iamque cum emittit febris. Et hoc modestius, non ferocibus remediis agemus, qualia mox describemus. Cum verò inferna petit dolor, illico primisq; morbi diebus instituitur valida purgatio, si absuerit febris. Sed dices, Verum ab inflammata parte nihil abduxeris pur-gando. Respondemus, antecedentem causam hac arte saltem vacuabimus: plu-rima enim restant quæ affluerent ad locum dolentem. Dices, cruda materia non est purganda. Respondeo, auctore Hippo-crate, cum orgasmo concita fertur, exclu-denda est: ut etiam si ea venenata fuerit, erit, quamvis cruda, elidenda. Nam plus periculi incumbit ab orgasmo & à veneno, quam ab agitatione ea, quæ fit in purga-tione crudoris. Præterea præcept periculū adfert illa etiam materia, quæ iam effun-dit se rheumate concitato in partem nobilem. Propterea Galenus libri de Venæ sec-tione octauo, dicit, Ineunte phlegmone, vbi suspicio adest iam fere vehementem, curatio erit auspicanda ab euacuatione, hoc est, à phlebotomia, vel à pharmacia. Sed facta iam inflammatione, non am-plius tuta erit purgatio: materia enim in-ferta parti, reuocari nequit. Ita etiam pur-gandum cum pars incurritur quæ conta-gione affligit nobilem partem: hac ratio-ne Galenus in puncto neruo purgat illico, ne intrat succus, corpore circumfluens, in neruum, vnde phlegmone & delirium provenirent. Excipe inter hæc, phlegmonen hepatis: nam omne purgans trahit ad hepar. Ut breuiter transigam de Purgan-ria hac difficultate, ita rem habe: Morbifi-ca materia (si sanguis non fuerit) est miti-gata iam pepasmo, vel est pepasmi adhuc expers, si mitigata, purganda. Si pepasmi expers, hæc vel poterit coqui, vel est ita alienata ut omnino sit coctionis expers. Si coqui nequit, purganda, ut aqua iotercus, &

Dalsino.

4. Me-  
thod. 2.

& venenata si fuerit materia. Sin ciuda hæc materia sit pepalsmi capax, ea vel quiescit, vel motu feritur. Si quiescit, coquatur primo, dein purgetur. Si motu feritur, ea feratur in principem partem, vel ad loca conferentia: Si feritur in partem principem, illico cruda purgetur materia, nisi hepar peccat, nam ita impetus in hepar maior fiet. Si ad conferentia feratur loca, præparanda erit coctione, ac dein iuvanda exclusio. Sed audiamus ipsum medendi Dictatorem Hippocratem hac de re differentem; ex quo more nostro breuibus notis eum illustremus. Sin autem, inquit, sub diaphragmate dolor constitit (excitata nimirum pleuritide à materiæ affluxu per venam æzygon in costis inferioribus) nec ulla eius in iugulo significatio fuit (vi nullus affluxus per venam intercostalem suspicio sit) subducenda est aluus elleboro nigro (qui humores crassos per inferiora excludit; nam eò natura viam affectat, aut peplio (hoc est portulaca sylvestris, baccis pepali.) Sed ita tamen vi nigro elleboro daucum aut fefeli (Masiliense) aut cuminaum (Æthiopicum, quod Hippocrates vocat regium) aut anisum, aut aliud quicquam grati odoris miscetas. (vi subiecto non sit molestum medicamentum: & vi discutiatur status, utque os ventriculi recreetur: quia omnia cathartica sunt quodammodo venenata.) Peplio autem succum silphij: (hoc est laser, quod laserpius Cyrenaico exprimitur. Nam non omne laser subiecto est gratum: laser enim Æthiopicum ingratum est subiecto.) Sed viæque medicinz (nimirum peplium & elleborus niger) si inter se miscantur, sunt planè affines & vniuersi modi, cuiusmodi debeai esse medicamenta omnia quæ ad purgandum miscentur. *ipais* *ipais* dicuntur quæ æquali tempore, pari facultatum distinctione, parique vi suas exercent facultates: ut non præperet & anteueriat vomit, & alieum cunctetur. sic enim perturbationes & tumultus in ventre fient) Sed tamen hoc interest, quòd niger elleborus agit conuenientius, & crasseos potentiora educit quàm peplium: (hoc est, talia, quorum exclusione morbus miscetur: hoc est, etiam coniunctam pleuritidis materiam eunat: ) peplium verò maiorem vim habet discutiendi status quàm elleborus niger. veraque hæc (nimirum materiæ

iudicij potentiseductio, & status diffusio) dolorem sedant; restitutione habitus & temperamenti: quæ tumor præter naturam immuauerat. Itaque in superiori pleuritide curanda, rectè præsentit Hippocrates phlebotomiam, axillaremque fecit internam: quia per hanc utraq; materia, & antecedens & coniuncta euacuatur. In hac verò pleuritide inferiori, vtiliter adhibetur eisdem venæ sectio, ad causæ antecedentis euacuationem vel resuscitationem, ob filamentorum resitudinem. Cuius tamen totam venam causam exhauseris, quàm ad materiæ coniunctæ euacuationem, per venæ sectionem deuenieris. At purgatione, causam etiam ipsam coniunctam tollis. Elleboro itaque nigro educit Hippocrates causam coniunctam pleuritidis inferioris, quia verisimile est ipsam materiam crassam esse, faculentiam, lentam, viscidam, ac melancholicam: quæ, si tenuior fuisset, potius in altiores fuisset delata partes, quàm in inferiores. Præter autem elleborum & peplium, dicit Hippocrates alia quoque exhiberi posse. vi folliculi *scapi* *scapi* in decocto prunorum macerati, & Galenus hic hieram, & medicamentum ex colocynthide præferibit, vbi febris & hominis natura corporisque dispositio admiserit. Sed caute purgandum est in superiori pleuritide: nam febrem habet vehementem, præterea cum expectoratum procedit, illud compesit purgatio. nec solet purgantium vis quicquam elidere à parte phlegmone obfessa: estque venendus à pleuritide, alui fluxus: Properea scribit Rondeletius, se vidisse multos à pharmâcis perisse: usque solâ utebatur cassia cum manna. Si autem pituitosa fuerit materia, in eunte morbo, dum expectoratum nondum procedit, viemur agarico maceratio in decocto pectorali: experientiæ addemus sirupum rosarum laxatiuum, vel mel violaceum. Præstaret in hoc morbo perperuū purgatoria miscere leniitibus: & abstinere à stringentibus, ut sunt myrobalani. Accipe mannæ, cassiæ, cuiusque vnciam: sirupi violati vncias duas: misce: sumat tertio vel quarto die cochlearium magnū. Hoc suruiter soluit aluum, expectoratum promouet, nec febrem inflammât. Si phlegmâ malit æger, Accipe mannæ fesculentiæ, serapij violaci semuticiam: cum decocto.

Ratio  
Hippocratis  
de  
pleuritide

1. Anst.  
11.

Hippocratis  
de  
pleuritide  
explicata  
111.

Causa

Lenis  
pharmâcis

decocto capillorum veneris, boraginis, violarum, hordei, iulubarum, & glycyrrhizæ, cumque passulis, fiat haustus. Vel, Accipe mannæ vncias duas: cassiæ semunciam: dissolve cum decocto pectorali. Licet veniat ad mannæ vncias tres: easque diluere cum decocto pectorali. Poterit etiam propinari manna cum oleo amygdalino recenti. Si maturum Rhabarbarum haberetur, eo commodè in vera pleuritide uteremur. accipimus enim drachmas duas, quas infundimus aquæ violatæ & scabiosæ: maceramus totâ nocte: colaturæ addimus mannæ, vel cassiæ vnciam. Hactenus quæ dedimus sunt leuissima: iam mediocria propono. Accipe maturi Rhabarbari drachmas duas: agarici recenter trochiscati semidrachmam: infunde hydromelii benè cocto: colaturæ adde catholici drachmas sex: sirupi violati vnciam. Si verò materis pituitosæ scire videatur: viemur agarico recenter trochiscato, cum diasebesten. Accipe agarici recenter trochiscati drachmas duas: trochiscorum de violis, paratorum sine scammonio, drachmam: infunde horas duodecim in decocto violarum: colaturæ adde diasebesten drachmas sex: fiat potus. Aliud, Accipe agarici recenter trochiscati drachmas duas: macera in oxymeli & aqua adianti: colaturæ affunde sirupi violati vnciam: cum decocto pectorali fiat potio. Sed non ante septimum diem exactum locus erit pharvacizæ, ne fistatur expectoratum. & ne tunc quidem, si corpus valdè sit extenuatum, & febris magna. Si tamen à catarrho intestinis, ventriculove constituerit materia, leniter exigatur. Si ingens alui fluxus oboritur inecante morbo, talia præscribemus quæ non interceptiunt expectoratum: vt decoctum hordei, anisi, & quattuor seminum frigidorum maiorum, cum sirupo capillorum veneris, & myrtino, à foris ventri stritio addatur. Syncope si euenierit à rupta vomica, interdum lethale. si ex fractis viribus fiat, da vinum dulce cum restaurante iure. Si à vaporibus subito cor inuadentibus, renelle fridione, ac odoriferis cor robora. Si in caput repti materia, enemate reuelle. Aphthas elue lacte. Hactenus egimus de causâ morbifica quæ toto corpore sparsa est: iam ad eam venio, quæ pectore

est concepta. Hæc domatur remediis foris admotis, vel intus sumptis. Inter illa quæ foris admoventur primarium locum habet fons. Cum autem Hippocrates, in initio libri secundi De Acutis, sollicitè agat de his, totam ipsorum naturam breuiter aperiam. Fons Hippocrati est omnis calor qui vel ab igne, vel aliqua à re calida manat, affusione aquæ vel à spongia, vel ab aliarum rerum admotione; vt fursurum, milij, salis, orobi, aliarumque rerum siccitarum, & lanæ succidæ. Duobus autem vocibus expressit Hippocrates vim fontis; vocat enim *νεγλιν*, & *σιγηρην*: quæ dictio plura comprehendit quam *νεγλιν*. Nam *νεγλιν* potius accommodatur fontibus siccis & mordacibus: *σιγηρην*, & siccis, & humidis, mordacibus, & morsus expertibus. Tria enim sunt prima sortuum genera: humidi, siccis, humiditatis & siccitatis participes. Humidi quidem, vel simplices, vt aquæ calidæ: vel compositi, vt ex aqua particeque qualitatibus maluz, chamæmeli, scammonei, ex vino in quo coxit absinthium, mentha, origanum. Siccis, vt qui sunt ex milio torrefacto, sale terro, fursure torrido. Humoris & siccitatis participes, vt sunt quædam cataplasmata ad leniendum dolorem, vnde cum incidit, accommodatissima. quæ sunt ex fursure siccis, & sapa, ad consistentiam cocta pulvis. Rursus, sortuum alij sunt morsus expertes, alij morsus participes, alij neutri. Morsus expertes, vt aqua calida, quicquæ sunt ex aqua imbuta qualitate radiciis althææ, & foliorum maluz. Morsus participes, vt qui ad cædemata parantur, ex radice bryoniæ, cucumera asini, inulzæ, & ex herbis siccantibus, incidentibus, & detergentibus: vt ex calamintida, origano, bacis & foliis lauri, sic: hæde, cineribus sarmentorum & ficus: item fursur cum sale & milio: & quædam cataplasmata. Efficiunt autem generaliter cûcti sortus, vt dissenta læsentur, repleta euacuentur, refrigerata vt caliant. Dicit Galeus, In frigidatione nos rarius vti in dolenibus suffragis: quod hæc superficiem ipsarum externâ densent, & ob id, transpirationem coercerant, & dissenta magis intendant. Solas, dicit, calidas interperies; quæ sine copia consistunt, infusigatio sanabit. Propterea Hippocrates rectè præscribit in pleuritide sortus humi-

Tors.

ca.

Fons.

Vide G. d.

1. ad

2. Aph.

1. b. 1.

Acut.

6. Epid.

6. 1.

6. Aph.

1. b. 1.

Acut. 2.

nevis.

siqum

10.

Medic-  
ria phar-  
maci-  
calia.In viti-  
defa.

Cautio.

Cum su-  
nu.

Syncope.

Ad con-  
sam con-  
sistentiam.Vn Po-  
tione.6. Epid.  
6. 1.

1. amitt.

cc 2

dos

dos & morbus expertes: quia calidis, ut sanguineis, & biliosis affectibus, debentur satus humidi sine morbo. nam morbus participes valent ad materiam crassam, lentam, atque frigidam. Porro summum sanitatis est indicium, si adhibito foci aquæ, pars supparet: quod, teste Hippocrate, huiusmodi suppuratio, valentissimi caloris sit signum. Ne ergo morbus fiat specie calamitosus, & ad calamitosam vim morbi accedat naturæ infirmitas, sedandus est in primis dolor. Dolor enim cuncta morbi symptomata excutit, & naturam maximè debilitat. Doloze siquidem augetur attractio, atque adeo ipse tumor: tumore aucto, iocrescit spirandi difficultas, quia pulmones incalescunt, & humores in bronchiis contenti lentiores efficiuntur, & ita difficultatem spirandi augent: hinc duplex respirandi difficultas, una in thorace, altera in pulmone: febris etiam assidua humidum primigenium exhaurit, & spiritus dissipat. Iam paucis digrediamur ad ipsum Hippocratem, ipsumque de febribus in Pleuritidis curatione, differenter audiamus; nostroque more cum breuibz illustremus. Lateris, inquit, dolor (nam doloris meminit, quod ille maximè eluceat in pleuritide) siue is incidenti incunte morbo (hoc est in primigenia affectione; per idiopathiam; & dolor sanguine per venam intercostalem, vel azygon; orgasmo vel attractione.) siue superuenit, (hoc est, siue succedat neus fuerit alteri morbo per diadochen vel metastasin: materiz, siue per aliam quamvis exclusionem) non alienum fuerit (quia non est tam longè diffusa inflammatio ut non possit percipere vim medicamenti foris admoti: & materia facillè transiit a paritibus internis ad externas: & adest inflammatio quæ coqui debet) primum quidem (ante phlebotomiam & pharmaciam: si naturæ beneficio nullum procedat expectoratum) solum ruscari illum dolorem dissolvere (cutem rasciando, sanguinemque tenuatum per halitus digerendo; ut ita minus tendatur pars dolens. Tribus enim modis, pro specierum diuersitate, pleuritidem excludimus, phlebotomiâ, pharmaciâ, & fomentis. Verum fomenta non sunt adhibenda, nisi prius inhibita vel veluti suppressa causa antecedente, quæ est orgasmus. Eâ inhibita, cau-

sa coniuncta naturæ bonitate facillè vincetur soto, & expectorato. Cum verò sanguis in phlegmone non diminuitur, vel etiam vaporosus spiritus cum ex calore generatur, augetur tunc dolor. Sanguis verò non minuitur ob totius plethoram. Nam æstus tacta pars, plus trahit aliunde, quam soto exhauritur ex ipsa parte. Si itaque fomenta calida dolorem non soluant, debet corpus vacuari. Sed, inquit Hippocrates, fomentorum præstantissimum est (ad curandum, & ad explorandum) aqua calida (simplex, vel additâ malû, althæâ, violis, chamæmelis, & semine lini) in vire aut in vesica, aut in æneo testaceo vase admotâ. Quasi dicat, si non iuuat, detrimendum non adferet: & præterea ex ea admotione, faciendarum rerum significatio fiet. Nam in Pleuritide à bile, nihil hoc soto præstantius: nam distenta relaxat vacuando, & acrimoniam humoris stimulantis obundat. Sunt enim tria anodynorum genera: Primum, sanguinis bilisque acrimoniam frangens: secundum, distenta relaxans: tertium, sensus tollens. Eorum itaque historiam orditur Hippocrates ab eo soto, qui omnis noxæ est expers. Nam in aqua calida non est tanta vis resoluendi vi maiors fiat attractio. Hoc igitur soto restituitur naturæ integritas, tolliturque vna causa tumoris, & dolor remittitur. Et dum studes lenire dolorem, inquis causam doloris, & Indicationes capras faciendorum. Nam si dolor soto cessat, dices causam fuisse bilem: & iam fluxum cessare. Sed, inquit Hippocrates, moue quippiam (ut lanam succidam carptam, vel gossypium carptum, ne inæqualitate sua phlegmonem augeat) lateri est subiciendum, (ut huius lanæ vas aqua plenum infideat, ne vasorum inæqualitate & grauitate pars ipsa laboret, ex eoque labore dolor excietur. Poterit etiam testaceum vas gossypio vel lanâ succidâ obducî, ne parti asperitate vel duritie molesta sit.) solatij causâ (nam soto est solatio) & peristaltico, ideoque admouendus. Quod si nihil adferre adiumenti, non nocet: quia recreatur inde natura, cor, cerebrum, stomachus. Quare venæsectio statim malè præscribitur: ut cum catarhus in muscularis pectoris decumbit. neque enim hic phlebotomia facit ad declinationem causæ anteceden-

Lib. 2.  
Acute.  
Pum in  
solum.

Acute.  
Pum in  
solum.

dentis, neque ad amotionem causæ continens. Rogandum tamen num suppressa sit solennis aliqua vacuatio: vel num situla aliqua inconsideratè supprimatur: tunc enim ex palindrome sanguinis ad latus, fit pleuritis. Conuenienter autem, inquit Hippocrates, spongia mollis & magna ex calidâ expressa aquâ lateri admouetur: ita nimirum explorabimus morbum, & captabimus faciendum rationem. In huiusmodi enim affectibus semper incipit Hippocrates à doloris alleuatione, quod nihil ad eò corporis infringat vires ac dolor. His igitur vitur, quibus nihil deirimenti adfertur: imò potius plus humoris morbum facientis egerit, quam attrahitur. Sit spongia delis foraminibus obsita, & magna pro ratione partis. Spongia leuis & æqualis calorem conceptum diu continet, laterique impartit suauitatem. Sed illud spongia fomentum, inquit Hippocrates, superintegere oportet: sic enim diutius medici votolatis faciet, & calorem conceptum diutius continebit (vt iteratâ sæpiusque imbutâ spongiâ, deinde expressâ non sit opus: quod calore aperti meatus, frigido occurrente facile corpiantur) eademque opera efficietur, ne spongiæ vapor ad respirationem ægri feratur (nam huiusmodi vapor suo calore spirandi difficultatem adfert: & sua crassitudine, quia aër est crassior, faciliè pulmonum angustiam committit: quod in thoracis affectibus est pessimum) nisi fortè id ad aliquid utile videatur: est enim locus, cum illud sit alicuius rei: cum scilicet pleuritidis est sicca, nec vllū procedit ex pectoratum, in summa contumacia expectorati, vt in asthma febris experte. Ergo in pleuritide biliosa, præstantissima est aqua calida: vt quæ distenta relaxet vacuando: & acrimoniam stimulantis obtundat temperando. Hoc modo agere solebat Hippocrates in pleuritide biliosa: deinde tradit quis focus conueniat in pleuritide ab humore crasso & lento. Non enim aquam calidam hic conuenienter admoueris, sed ea quæ vim exsiccandi, attenuandi & digerendi habent. Nam aquæ calidæ imbecillitate, materia huius pleuritidis in status tantum crassos resoluetur, à quibus maior fiet doloris acerbitas. Quia à nulla materia maiores excitantur dolores, quam à crassis huiusmodi statusbus. Hinc

vulgus fixam aueniam & vino albo aspersam, ita vt tantum intumeat, in sacculis foelicissimè admouet. Similiter semen lini, semen anethi albo quoque vino aspersum. Propterea ita scripsit Hippocrates: Quintetiam hordeum, & orobus seu eruum (comminuta & incisa) macerata & cocta in oxycrato (vel in oxymelite, si crassior viscosiorq. fuerit pleuritidis materia, & si calidæ aquæ soti in crassissimos status resoluatur, vnde maior doloris acerbitas.) Huic soti mixto est locus: digerendi, incidendi, & tenuandi gratia. Sed dices, Qui sciam viscidos crassosq. humores in parte phlegmone obfessa esse? Ex antecedente diæta, ægri temperie, anni tempore, ætate, & locis. & si commemorati soti nihil iuuerint blandiendo. nam si illi non iuuerint, nec corpus plethorâ sit graue, erit succus crassus in vitio, & hic in status soluitur: tunc orobis vtendum, nam soluit crassos status. Sit autem, inquit Hippocrates, oxycratum, in quo coquitur orobus, paulo acidius quam quis bibere ipsum possit (ne acrius sit, mordet & phlegmonem exacerbet: vel si aquosius, ignauescat: medium sit ergo.) in sacculis, inquit, cogatur & lateri admoueat, (nam inest huic soti vis quædam expellendi humores, & incidendi crassos.) eodemque modo fursurem admouemus, (madefactum & coctum ex oxycrato.) Quemadmodum autem Hippocrates in pleuritide biliosa commendauit aquam calidam: & in pleuritide ex crassa & lenta materia soti ex incidentibus, detergentibus, attenuantibus, & digerentibus; ita etiam Pleuritidis ex sanguinis copiosissimi vel tenuis catarrhi affluxu præscribit soti siccos. nam humidis hic non est locus. Inter sicca verò sine morfu, commendat milium: cum morfu, falem. Hinc pragmatici excogitauerunt sacculos ex libra milij, salis, furfurum, feminis anisi, foeniculi, singulis viciis quattuor. exhausta humiditatem nimiam capitis. Audiamus ipsum Hippocratem: Sed inter sicca fomentum (cum nimirum ius est opus, vt in sanguinis affluxu, & tenuis catarrhi vel humoris ferosi.) sales (præsertim communes & crassi: non spuma maris.) miliaque frisa & in sacculis laneis admoda, accommodatissima sunt: Etenim & leue non pondere lædit aut opprimit) & lateri gratum est

Tertium.  
Hippocrates  
in semina  
in goma.

In Pitui  
do pleu-  
ritide so-  
tum ad  
Hippocra-  
tem monit.

miliū. Ita commendat æqualitatem & leuitatem mili, nihil enim Hippocrati magis est exosum, quàm remediū gratū. In milio autem est vis discutiendi, ac pugnat cum humore tenui : & morsu caret. Itaque, inquit Hippocrates, fomentum huiusmodi, dolores etiam qui ad iugulum pertingunt discutit. Quasi dicat, ad omnem Pleuritidem, quamcumque partem obfederit, dolorem discutiendo valet; quare etiam soluit hypochondriorum dolorem. Vt viriū rectè intelligamus, notare debemus, tria esse maxima pleuritidis remedia, scilicet, venæsectionem, & purgationem. Quorum primum pugnat contra causam coniunctam, & antecedentem vñā interdum sistit. Venæ autem sectio & purgatio, tollunt vel causam antecedentem, vel coniunctam. Vt hoc nomine, scilicet, conuenienter adhibitus vincat aliquando venæsectionem: quod non ad omnem pleuritidem conueniat venæsectio: sed ad omnem conueniat scilicet. Sed non omnis foras ad omnem, sed nunc hic, nunc ille, pro materiæ conditione, ægri naturā, & morbi historiam. Vbi enim biliosa est materia, adhibetur aqua calida; vbi crassa & contumax, mixtus scilicet, qui incidit, attenuat, & digerit: vbi tenuis catarrhus, scilicet, siccus, morbus particeps vel expers. Hæc causa erat quod mox subdiderit Hippocrates hæc sententiam : Sed certe venæsectio non æquè valet ad amouendum & discutiendum dolorem: (non negatiuare, sed, dicit, *ὅτι καὶ οὐκ ἔστιν ἰσχυρὸν*, id est, non æquè dolorem mitigat) nisi ad iugulum dolor peruenierit. Dum enim in tali pleuritide materiæ affluxus fiat per venam intercostalem, quæ non procul abest à vena axillari interna, eius sectio, dum profundit sanguinem ad mutationem coloris, non solum declinandi aut deriuandi vim habet causam antecedentem, sed & coniunctam amouendi. In pleuritide verò costarum inferiorum, à materiæ affluxu per venam azygion, venæsectio tantum valet ad reuellendam materiam quæ influit, non autem ad amouendam quæ influxit. Nō valet ergo venæsectio ad omnem pleuritidem, pro causæ coniunctæ amoue. Sin autem, inquit Hippocrates, ad fomenta dolor non conquelescat (ob materiæ non affluxum, ab orgasmo, attractione, vel

exclusionē: cum nimirum pars vna se in alteram exonerat) diu tempus, fouendo, exigere non oportet (sed calfaciendi finem facere oportet) nam hoc pulmones siccat (calfaciendi & exhaurendo : quia dum quod subtile est resolutur, reliquum magis cogitur, & crassius redditur) & suppuratum facit. (cum non exhauriunt inflammationis materia facti : tunc, confectus putre, rupta vomicā, pus in thoracem erumpit.) Si itaque fluxus humorum cessent, poterit dolor intra duos aut tres dies sedari. Sed quia rarò eueniunt pleuritides nisi impuro corpore, rarò etiam fit, vt non aliquid morbi iam factum sit, & aliquid fiat, ideoq. vtriusque, & eris quod iam factum sit, & eius quod adhuc fit, est habenda ratio. Quod si itaq. inquit Hippocrates, intra duos vel tres dies, per fomenta, dolor non cessauerit, ab incepto desistendum est; metu nimirum maioris mali. Maioris, vt pote affluxus, siccitatis, vel siccat tabis, ab exhaustu pulmonum : & suppurati. Nam quicumque ex morbo laterali laborantes, in quattuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur. Quam verò formidabile sit malum ipsum suppuratum, docet Hippocrates, vbi ait, Nam nisi intra quadraginta dies, à suppurato quis purgetur, in tabem ferè incurabilem is incidit. Sed obiciēs Hippocratis sententiam, Omnia secundum rationem facienti, si non successerit res, non mutandum: dum id manet quod ab initio visum est. Hic autem manet quod à principio visum est: quia incumbit in amotionem causæ doloris, & in partis restitutionem: quare in ad mouendis fortibus cessi dolor non cessauit, à proposito tamen non desistes. Respondeo, Dictum Aphorismum intelligendum esse, modò maioris mali periculum nō imminet. Hinc patet error recentiorum, qui non solum caldaria præscribunt, sed etiam ad mouent emplastra insigniter calfacientia. Hæc tamen Hippocraticam rationem per se foras medendi aperimus. Promissione itaque habita totius, totum tempus fortibus transigat : Si non mitescit malum, redi ad phlebotomiam: ea enim repetita, sæpè iuuat. Duplices autem sunt fortis venientes, & mitigantes dolo-em : mitigantibus locus non est, in vera pleuritide, nisi primum totum corpus fuerit euacuatum : nam *ἰσχυρὸν* alioqui

Estum  
en pri  
stati.

1. Aph. 8.

1. Aph. 15.

2. Aph. 12.

Causa in  
Fortum  
vbi

Forti de  
plex.



alioqui succorum augmenta ducet. Quare tum maximè inuenit lateris dolore, videntur fori, cum existimamus ab eo exhauriri posse materiam influxam, quæ non ita circumsuit copiam: quare num parèe homo passum inire soleat nota, & num vacuatio grauis præcelleret. Vbi autem apyrexia adest, nihil periculi à fori erit, non occupato corpore à nimia succorum copia, pressuræ eorum prauitate si id non fuerit. Cum verò tentamus malum fori, id autem euacuationem agimus, quò cluceat num copia materiam in vitro sit. Si his augeat dolor, illico seca venam. Mitigantibus verò, ut dixi, locus est à vena secta. Hi tales sunt qui partem molliunt, rarefaciunt; sanguinemque, si paucus ille fuerit, in habitum resoluunt. Variæ autem fori sunt idæ, vanaque scriptura: nam sunt vesicæ, spōgiæ, cataplasmate, illitu. Illinimus latus primo die oleo violato: secundo, amygdalino: tertio, chamæmelino: quarto vimur cataplasmate ex semine lini, sænugræci, malux, radicum althææ, florum chamæmeli: quinto, si ad suppuratum abit, addimus adipem. Vel accipimus vesicam horum decocto semiplenam: vel eam semiplenam oleo amygdalino & decocto malux admoveamus: his, aliis inuictus, cessit sæpè dolor. Vel fouebimus latus spōgiæ madetæ ex decocto florum chamæmeli, meliloti, anethi, radicum althææ, seminis lini, sænugræci: coquantur hæc in duabus partibus aquæ & vna olei. Nonnunquam indimus vesicæ okum anethinum: & latus vngimus pinguedine visi & anatis; imponimusque lanam succidam. Sed si humidus fuerit affectus, multaque ab initio profunderat sputa, sacculi ex milio, fursure, sale, cumino, potiores erunt. Sed si agie expectorare, nunquā ab humidis foribus erit abeūdum. Et cautio semper adsit, ne, dum dubia adhuc res est num flatus vel vera pleuritidis bellum moueat, illico venias ad illium ex oleo chamæmelino, & rutaceo, cum semine cumini & anethi, quibus tamen in progressu morbo dextrè vimur. Quod si foribus dolor placatur, exactè perpende num id eueniat ratione foris: siquidem ad primum foris blandimentum sæpè mitescit in phlegmone dolor, quòd pars tensa laxetur: sed reuiscit mox ardentius, cum noua immittitur materia. Euenit interdum

vi, altius immisissā materiā, dolor à plebrotomia non mitigetur, vel quòd densior membrana costis interia nullum exitum concedat insinuatæ materiæ: hic foris maximè iunc locum habent. Et in omnibus foribus caue, ne hi pondere dolorem dolori adiciant. Si fuerit pituitosus sanguis, Accipe milium, fursurem, & sale, singatur sacculus; immergatur vino & aceto in quo origanū coxit. Fous enim insinuitur ex cineribus tepidis. Si nihil profeceris, plus biduum non erit fouendum, ne tenue exhaustiatur ex inflammatione parte. Illius fiat ex vnguento resumptiuo cum croco. Placet mihi vehementer foris qui instituitur ex decocto malux, cum oleo amygdalino & violarum, inuentem morbo, ita vt secundo vel tertio die addamus flores chamæmeli & meliloti: si forius quid velis, adde parietariam, vel absinthium, sænugræcam, semen lini. Cum id feceris aliquoties, vnge primum oleo violato & amygdalino: dein chamæmelino & anethino, bulyro: adice adipem; tandem veni ad oleum lilinum. Vi, in pituitosa materia, Accipe radicem & foliorum malux, parietariæ, florum chamæmeli, singulorum manipulum: seminis lini & sænugræci, cuiusque vncias duas: coque ex aqua: fove cum spongia. Dein vnge latus: Accipe olei amygdalini dulcis, lini, chamæmelini, cuiusque semunciam: mucaginis althææ, & seminis lini, singulas vncias, vel earum loco adipem adde, (croci semiscripulum, ceræ quod satis sit: fiat vnguentum molle. Sed, vitærum caueam, Si æstu conflagrarit æger à bilioso sanguine, inuenit morbo vimur oleo violato, vel vnguento resumptiuo. Nam, in pectoris inflammatione, parca manu admodenda sunt adstringentia & refrigerantia: quod prudenter scripti sumus medendi præceptor, τὰ ψυχρὰ, εὐχρηστὰ, ἐπιτάλασθαι, τὴν ἐστὶν ἐνδονίαν. Satis enim est, ut his, elementis prædictis quadam astringitione, pectus robustus euadat: ne pars inflammata, quæ calet & dolet, tam facile, attrahendo, suscipiat materiam: suscipit autem dū laxantibus vimur. Si tamen via cuncta fluēt materiæ intercipiatur, orgasmus quodā percellitur, ac peripneumoniam phthisinque prouocat. Quare aliquando vimur oleo violato ad quartum vsque diem: postea misceamus oleū amygdalinū, & cha-

1. Ap. 9.

Fetus in  
figura.Varia fori  
sunt speciei.

Cauda.

3. Ap. 31.



græci: pistentur, & trāiciantur setaceo: addunt farinæ fabarum & hordei, cuiusque pugillum: iunge quid chamæmeli. Coque ad crassitudinem: mox remisce cribro traictam materiam. dein affunde oleum oliuarum, chamæmeli, & amygdalorum amarorum, & vitellos ouorum: admove ad forū. Fiunt interdum fori, ubi frigida est materia, exiua, chamæmelo, cumino, aniso, sceniculo, scæbio, ruta, anetho, malua, panetaria. Si foras erumpit malum, in augmento admove caricas coctas cum farina hordei, & adipibus. Si fuerit cedema, ne intrò rapiatur materia, admove vesicatoria. ita enim in pestifera agendum: & emplastrum de meliloro admove. Diximus Medicamenta quæ ad Pleuritidem præscribuntur, dicata esse eius causæ, vel dolori. Causæ, quæ nimirum toto corpore fusa est, vel quæ pectore est concepta. Quæ toto corpore fusa est ut sit abigenda diximus: quæ pectore concepta, euincitur topicis & remediis intus sumptis, de Topicis transeamus: iam ut peculiaribus medelis, ea materia quæ pectori insedit, eximi debeat, agemus. Hæc materia ad expectorationem præparatur linctu maxime. Sed summa cautione in horū usu est transigendum. In omni parte inflammata adest vrens calor & tensio, quæ in membranas est violenta, quæq; contiguas partes vnâ in tensionem abripit. Propterea frigidis redintegrari debet: ea tamen religione, ne repellas aut stringas, etiam ineunte morbo; maxime si phlegmone occupauerit sinistrum latus. Quare in usum vocentur ea quæ modeste frigent & humectant, ne ex arida tussē venæ sit aliqua in partibus spirabilibus laxet. Sint itaque frigida & humida in secundo ambitu. Mirandâ vi illud est, Accipe seminis papaueris nigri, misce cum diapenidio & sapa; lingat ineunte morbo eo, qui à bilioso sanguine. Ut, Accipe pulueris seminis papaueris nigri semidrachmam: diapenidij ex sapa vncias duas, lingat. Vel Accipe seminis papaueris rubri semidrachmam: seminis botrydis drachmam: sirupi de calamintha scisciam: lingat. Ineunte pleuritide biliosa, propina aquam citrulli & melonum, vel cucurbitæ cum saccharo. Et utatur initio sirupo violato & iuiubarum, cum duplo aquæ sacchari: ad quantum id agat diem.

Ordinis ratio.

Linctum.

Causa.

In biliosa materia.

Cauē à sirupo portulacæ & lactucæ. Deinde propinetur siropus violatus cum sirupo glycyrrhizæ, & desarsara. Vel accipe violarum manipulum: gummi Arabici drachmas duas: seminis cydoniorum, seminis malux, singulorum scriptulos duos: gummi tragacanti scsquidrachmam: aquæ libras quatuor: infunde horis viginti-quattuor, bulliant ad dimidias partes: & cum libra vna penidiorum, fiat siropus: deitur cum decocto hordei & seminis psyllij. Vtitur etiam Areæus diacodio cum sertula campana. Siropus nymphææ; mucrago seminis psyllij (nam refrigerat, inspissat, mollit) cum saccharo penidiorum: ita etiam mucrago alibææ, & pulpa iuiubarum: vel cū saccharo crystallino. Radicem alibææ coque sub cineribus: dein conscinde in taleolas, & coque ex aqua hordei, dū mellcam ducit ideam. Accipe sirupi violarum, sirupi de iuiubis, conferuæ violatæ, sacchari crystallini, sirupi capillorum veneris, farinæ amyli, singulorum semunciam: lingat. Saepe vtor sirupo violato & capillorum veneris: iungo interdum quid conferuæ violatæ, & diatrageanthi, vel sacchari penidiarum. Cū biliosa pleuritis consociatur crassæ destillationi, adicio antea descriptis sirupum de liquiritia. Vel remisce suauē insulsūque butyrum conferuæ violarum: & speciebus diaireos simplicis. Conferunt enim humectantia & modeste abstergentia. Madescat semper os ab aliqua re. Quod si pleuritis initium fecerit à pituitoso sanguine, initio dū expectorata spumosa, tenuia, paucaq; produnt, propina decoctum hordei, passularum & liquiritiæ, cum sirupo violato; moxque adice sirupum capillorum veneris. Si viscida materia fuerit, commode inibit usum oxymelitis simplicis: absterget enim & attenuat, neque accendit febrem, inquit Galenus. Quin etiam opportunè hic in usum vocatur sirupus liquiritiæ: nam lenit & attenuat modestissimè. Ni enim in glycyrrhiza leptomeria quid valeret, non vniuersalis esset. Sirupus glycyrrhizæ fiat ex aqua farfaræ: remisce diapenidion, & diaireos species. Quæ verò attenuant magis, quæque plenè concoquunt, in declinatione inflammationum offeremus; ut vitiæ semen, hyssopum, prassium. Oxymelitis itaque talia quædam tunc incoquimus, etiam decoquimus

In pituitoso pleuritide.

*Proflant  
remedia.*

*Ser. hui.  
cap. 11.*

*Cap. 16.*

*In Pleuri-  
tide adde  
lauroleuco  
fang.*

*S. p. p.  
nat. val.*

coimus radices ireos, liquiritiæ, marrubium ex hydromelite, quod commendauit Alexander Trallianus. Noqus mellis addit vriticæ semen & amygdala. Arcæus, si liquida crudaque expectorata fuerint, accipit in yrtæ drachmas duas : croci drachmā unā : piperis grana quindecim : melis libram unā : suinā ante cibum dimidiatam myrtillam : confect in longo malo, inquit Arcæus. Hoc medicamentum, inquit Scribonius Largus, fuit Apulei Celsi, præceptoris Valēis & nostri : & nunquam vli se viuo compositionem eius dedit, quod magnā opinionem ex eo traxerat, per cochlearium hoc deoratur cū præfocari videntur à gluinoso expectorato : pleuriticæ liberat ab omni periculo. dantur cochlearia quina vel sena : nam tussim lenit, & ægri excreant facili, eius vsu, quæ obstant transiui spiritus. Pau'ò aliter illud commemorat Marcellus Empiricus. Quidam hic in secretis habent radices helenij : hæc coquunt sub cineribus : dein spoliatas à cortice coquunt hæc cum melle, vel cum decocto hyssopi, botryos, vel sarfaræ. Accipe semen vriticæ, & lini torrefacti æquales partes, dilue cum melle. Aliud : Accipe siropi capillorum veneris : adde confectum capillorum veneris : iunge quid dāiros & sacchari crystallini. Ab eclegmatis illis crassioribus lubenter abstineamus : quod minime permittunt vt pulmōnes alas suas liberè expandant, quare maxime opus est hic, vbi expectoratum promoueri debet. Accipe oxymelitis simplicis vnciam : siropi de sarfara semunciam : looch penidiorum seiquadrachmam : lingat. Si à melancholico sanguine inuasent pleuritidis, eadem vsui erunt quæ pituitam diximus domare. quod si ab adustione melancholeseat sanguis, vt is mollescat, dabimus siropum capillorum veneris, & de pomis, vel boraginis : & fiat decoctum ex matoris minimeque astringentibus passulis, & ex ficibus. Vt iussim serar, prætus illinatur oleo amygdalino dulci, cum buiyrō loto in decocto malux & alihææ. Si ad suppuratum se conuerterit malum hoc, erit maturandū, rumpendū, abstergendū, consolidandū. Sed longè præ-

stiusset expectorando malum exclusum fuisse : etenim à suppurato merus tabis adferret. Cū tamen nobis etiam nolentibus eò repit malum, suppuratum premouebimus decocto ficuum ex mulla, ad crassitudinem mellis deducto, cui iungemus crocum. Hoc etiam prohibet ad maturitatem, Accipe mucaginis feminis caulium & feminis alihææ, cuiusque semunciam : mucaginis ficuum drachmas duas : buiyrī recentis, & olei amygdalini dulcis semunciam : croci semiscriptulum : leni igne misce, & cum cera fiat vnguentum molle : extendatur super lanam fuscā : quater die illinc, ac applica. Accipe iuuuauum, sebesten, viriulque numero quindecim : glycyrrhizæ, passilulorum, cuiusque semunciam : radicū malux, alihææ, inulæ, cuiusque semunciam : dactylorum, ficuum, viriulque, duo : coque ex aqua libris duabus, ad medietatis euaporationem : colaturæ affunde olei amygdalini dulcis recentis extracti vnciam : sacchari quod satis sit. semper aliquid huius iolabii ore continetur. Rumpi abscessum tussis, vociferatio, vomitus, stertutatio, concussio corporis vehemens, si symptomata mitigantur, superflue grauitate laeteris, stude vt ex suppurato fiat expuratum. Accipe radicū alihææ vncias quatuor : contusis hæc ad buiyrī vnciam vnam : mellis semunciam : stercoris columbini drachmas duas : misce & calidū loco qui prius dolebat admoue. Facto expurato, purga vlcus aquā hordei saccharatā : & si febris remissior, hydromelite, vel aquā ex melle distillatā, aut decocto cicero rubriorum. Accipe aquā hordei libram : mellis rosati vncias tres : radicū alihææ semunciam : bulliant ad tertiam partem consumptionem : lambat colaturam sæpe, adici potest inulæ radix. Vel coque inulam, quam dein misce cum melle & saccharo, fiatque linctus. Vel vtiur siropi niconianæ. Secretum quibudam est remedium, si quis quater in die bibat vncias quatuor aquæ hederæ terrestis calidæ : nam munda à sanie, & arceit empyema & phthisin. Dein gluina bolo, symphyto, & talibus. Obseruatione dignum quod do-

*Obserua-  
tio.*

uenda.

tienda, maturandum est. Aut enim quæ relinquantur recidivas faciunt: aut ad sup-  
purationem conuertuntur. Curationis cap-  
ta breuius repeto. Si pituitosa fuerit  
Pleuritis, à vena secta iunice clysterem ex  
oleo rutæ cum butyro. Dein foue locum  
oleo in quo coxere ruta, anethum, & flores  
cyperi: adiace interdum aliquid sulphuris.  
hoc agit tertium vsq. diem. Quarto die  
fiat cataplasma ex fatina seminis iuni, mel-  
le, & oleo rutæ. Si expectorató fuerit liqui-  
dus, misce fatinam seminis sœnugræci. Et  
si, expectorató liquido prodeunte, dolor  
perseuerat, studendum ut foras supparet:  
quare sinapi misce in cataplasmate & sem-  
men nasturij, & pyrethrû. Et ut cataplas-  
ma non augeat, impone illi vesicam sem-  
piplenam oleo tepido. Post septimum  
diem si perseuerat dolor, scarificatæ cuti  
admoceatur cucurbita, & lintecolium impo-  
natur scarificatis partibus. Oleo & sale ma-  
dens. Sequenti die iterum admoce cucurbita-  
tam, quò sanguis saniosus ac vlcusculis im-  
pactus extrahatur. Tertio die à scarifica-  
tione, ceratum rutaceum lateri ac vlcuscu-  
lis imponatur: nec vnquam nudum latus  
relinquatur. Hac arte vel discutietur, vel in-  
pus mutabitur materia morifica, S. Deo  
iuuante. Si in pus, id promoue cataplasma-  
te ex radicibus althææ, & caricis. Postea,  
eum melius expectorat, radicem siccam  
brassicæ vnâ cum caulibus vres, & excipies  
cineres veteri axungia suillâ, ut fiat cata-  
plasma, quod impones cum folio brassi-  
cæ: id discutiat ac mirigat dolores. Si diu per-  
seuerat dolor, adde baecas lauri, aliquid  
nitri & euphorbij ac seminis rutæ: rubedo  
inde efflorescet. Sed, antequam prouiso  
habita sit totius corporis, hæc agi non de-  
bent. Tunc etiam præclare conferunt hæc,  
Accipe florum chamæmeli, meliloi, mal-  
uæ, cuiusque manipulum: seminis sœnug-  
ræci semunciam: fiat decoctio ad libram  
vnâ ex aqua: foueat latus expressis in hoc  
decocto spongiis. Dein accipe olei amy-  
gdalini dulcis, chamæmelini olei, pingue-  
dinis gallinæ, buyri recentis, singulo-  
rum semunciam: fiat linimentum. Si te-  
nuis à materia ac acris natus morbus sit, acci-  
piat decoctum violarum, capillorum ve-  
neris, passularum, & glycyrrhizæ, cum siru-  
po iaiubino, violato & tussilaginis: lingat  
sirupum violatum vel iaiubiq. cum dia-

tragacantho: postea utatur sirupo capillo-  
rum veneris. Purga diacatholici vnciam: vel  
accipe calliæ drachmas sexseleteriij de suc-  
co rosarum drachmas duas: siupi violati,  
& rosari, cuiusque temunciam: & cum vnci-  
is tribus decocti pectoralis fiat haustus.  
propincietur opportuno morbi tempore. Si  
stultulenta fuerit materia, fumat diacatho-  
lici drachmas quinque vel sex: specierum  
hieræ semidrachmam: nam hic febris  
abest, estq. dolor vagus. Coque flores cha-  
mæmeli ex ceruisia: potet, inodò non sit  
mulier ingrauidata: & illinat latus oleo  
anethino & rutaceo. A grauiori pharmacia  
abstineat & à phlebotomia. Vel fiat saccu-  
lus ex semine cumini, & floribus chamæ-  
meli: immerge eum vino albo. Vel fabrica  
sacculos ex fursure, floribus chamæmeli,  
rutæ, anethi semine, & lini, & nigellæ. Vel  
coque illa ex aqua pluuiali, & cum spongia  
foue. Dein illine oleo amygdalino ama-  
ro, & chamæmelino: & panno albo lanco  
contegatur latus. Exenuatis ita flatibus,  
cucurbitam admoce quattuor vel sex di-  
gitis sub loco dolente: si ita magis, sine  
scarificatione, largamque flammam ha-  
beat: bis vel ter eam admoce. Si hoc modo  
non discutitur status, argumento erit pitui-  
tam viscidam in vitio esse, quæ magis at-  
nuanda erit apozemate ex radice inulæ,  
petroselinij, hyssopi folijs, seminibus ex  
quattuor calidis: iunge liquiritiam & pas-  
sulas: librà colaturæ adde sirupi byzan-  
tini & oxymelitis, singulorum sescunciam:  
sacchari vnciam: duobus diebus hoc ut-  
atur dein purga. Accipe aganici scrupulos  
quattuor: turpetij semidrachmam: zinzibe-  
ris scrupulum: infunde aquæ capillorum  
veneris & vino. Colaturæ adde diacatho-  
lici, & benedictæ laxatiuæ, cuiusque drach-  
mas duas. His actis, repete fomenta & cu-  
cubiras. Vtatur radice inulæ condita cum  
aniso: & fica locum dolentem diu manu  
madenie ab oleo amygdalino amaro &  
aqua vitæ: deinde tege panno lanco molli,  
albo, & bibat interdum decoctum florum  
chamæmeli. Cautione summa in phthisi-  
cis à latere laborantibus transgendum: nam  
his nonnunquam immituntur pulmoni-  
bus venti contumaces: cum horum pul-  
mones, perpetuis circumfusi madoribus,  
adhærent lateribus pectoris, quasi his agglu-  
tinati præter naturæ legem, solum foras &  
ff 2 sacculi

Acci-  
piat: si  
tu Ar-  
tes.

Ad fla-  
tibus.

Ostia  
quedam  
remedia.

Cautione in  
phthisicis.

VICTVS  
ratio.

Ex libro  
de vitio  
ratione in  
morbo  
a. 18.

1. Acad.  
18.

sacculi admoveantur, cucurbitæ, & dein-  
de emplastrum de meliloto. Iam ad Diæ-  
rationem venio. Hæc summa hic cautione  
præscribenda, nam vt opportunè illa aut  
sinistrè in vsum ducitur, ita vel in salutem  
vel in mortem trahuntur ægri. Oportet  
medendi ac nutriendi momentanea ac fu-  
gax est in pleuriti de. nam vel ipse cibus op-  
timus, qualis est pitana, enecat, si non loco  
acutæ exhibeatur in decursu huius mali.  
Quare ex sententia Hippocratis hanc rem  
transgredere volo. vt Hippocrates ostendat  
mortis causam sæpè esse cibum nec loco  
nec iure exhibitum, in primis dotes quam-  
plurimas optimi eduli enumerat, nimi-  
rum pitana, quæ tamen enecat, non  
opportunè propinata. Hæc enim ratio-  
catione vi videtur, Quicquid calorem fe-  
brilem (quia omnis morbus acutus est cum  
febre symptomatica, vel est ipsa febris es-  
sentialis) extinguendo, pugnat cum febre,  
humoris puris portionem pepasmi parti-  
cipem mittendo, alteramq. portionem,  
quæ est pepasmi expers, excludendo: ob-  
structiones, quæ sunt causæ anteceden-  
tes febris, tollendo; præterea quod stoma-  
cho qualitatibus primis, secundis, & totâ  
substantiâ est gratum, & omnis molestiæ  
expers: id conuenienter ad morbos acutos  
præscribi potest. Huiusmodi autem est  
pitana. Calorem enim febrilem extinguit.  
Nam perpetuò frigidum manet hordeum,  
ex quo conficitur pitana, vt scribit Gale-  
nus De alimentorum facultatibus, vbi De  
hordeo, neque vlla arte vim calfaciendi ac-  
quirere potest. Sed, omni præparatione ad-  
hibita, infiram refrigerandi vim retinet.  
humectandi verò vel siccandi vim, variè,  
pro varia præparandi ratione augetur. Hor-  
deum enim glutinâ suâ castratum, in aqua  
coctum donec quàm maximè intumuerit,  
humectandi vim acquirit. Humorum etiam  
putrium vim in fringit: nam pitanae succus  
est mitis, lævis, & moderatè humidus. Por-  
tionè pepasmi participem ipsius materiæ  
morbificæ, læuitate adiuuat ad coctionem:  
& alteram, pepasmi expertem, excludit per  
lubricitatem & per contemperacionem.  
obstructiones fluiditate tollit. Stomacho  
grata est, omnibus à qualitatibus tota quæ  
substantia. Molestiæ quæ omnis est expers;  
nam sitim inducere nequit, cum nec calfa-  
ciat nec obstruat, nec in bilem vertatur.

Stomacho etiam tumultum non infert,  
quia succo est æquabili, omnis status ex-  
pers. Pitana igitur, ex sua natura consi-  
derata, cibatorum omnium cerealium  
præstantissima rectè est habita in morbis  
acutis. Autamen, inquit Hippocrates, si  
cui conclusis adhuc in aluo facibus torbi-  
tionem ex pitana dederit, nondum alio  
subducta clystere, conceptum iam dolorem  
exacueris: aut si dolore careat, statim no-  
uum inducet: tum etiam frequentior & su-  
spiriosus fiet anhelitus: nam à cibo ingesto  
distenditur venter & intenduntur intesti-  
stina, unde cõprimeitur diaphragma. Quod  
his de causis malum est, nam crebro mo-  
tu pulmones incalecunt ac desiccantur.  
Quare illa nobis cautio adhibenda est in  
lateralis doloris assidue, qui ad foras  
nihil omnino concesserit (semper affluen-  
te materia noua) nec expectoratum rectè  
procedat (sed si siccus manet morbus) sed  
cum summo lentore concoctionis expers  
sit, (ita vt cum summa difficultate exclu-  
datur) nisi dolor quies sedauerit aut alui  
ciendo (in pleuriti de costarum inferiorum  
cathartico ex elleboro) aut venam se-  
cundo (ad mutationem coloris, in pleuriti  
de costarum superiorum, ad amotionem  
causæ coniunctæ) aut alteritrum adhiben-  
do quod duxerit esse vtile, pitana quæ cum  
ita adhuc affecti sunt (hoc est dum doloris  
summa adhuc sunt omnia, nec vlla pepa-  
smi signa edantur in propria morbi mate-  
ria) dederit, celerius opinione hi moriun-  
tur: nam pereunt intercepta respiratione,  
& suffocato calore natui: Quia labefacta-  
bitur vtraque æconomia, nutritus, & re-  
spirationis. Hæc itaq. de causa, inquit Hip-  
pocrates, illi qui integra pitana inconsi-  
deratè vtuntur cum siccus adhuc est mor-  
bus, & doloris cum adest assiduitas, & re-  
spirationis difficultas, septimo die aut ce-  
lerius moriuntur, stragulo calore ab inter-  
cepta respiratione. Alij quidem mente per-  
cussis (per materiam morbificam metastasin  
ad caput) alij verò ob orthopnoæ, & ster-  
tore strangulati: à materiæ contumacia,  
bronchiorum obstructione, & lateris infir-  
mitate. Ab inopportuna enim huius pita-  
nae propinatione, anxia redditur respira-  
tio. Itaque frequentè & multa respira-  
tio ne quamuis nitatur thorax, tamen ex-  
pectoratum cum summo lentore coniunctum  
pepasmi.

1. Acad.  
18.

1. Acad.  
34.

1. Acad.  
37.

pepasmique experts, transmissionem spiritus prohibet. Atque ita, inquit Hippocrates, in ægri perniciem mutuas tradunt operas; expectoratum enim dum cunctatur suppressum, densior efficit respirationem: hæc autem densior redditæ expectoratum glutinosius reddit, effluereque prohibet. Quare si adhuc siccor sit morbus, copiosius tunc præsana exhibenda non est: sed ante sorbitionis accessionem præstat propinare melicratum, aut vinum dulce, prout alterutrum videbitur consentaneum. Vitandum itaque potione si quis dolor vger, in sicco morbo, oxymelite. Quod si inexpectabilis sitis adsuerit, & melicrato dilutissimo, & aqua vitendum. Non enim oxymelitis tantum præbendum quantum postulat æger, quia ab eo labefactatur alvus. sumat vna dosi vncias tres. Nam oxymelite in magna copia non est vitendū. propterea Hippocrates ad melicratum & aquam abit. Morbus petit oxymel: (ad incidendum, attenuandum, & ad explicandas pulmonum alas, quò expectoratum procedat) sed si eo sitis non extinguitur, melicrato utemur: si nec illud sitim placarit, ad aquam eundum. Deinde verò, post melicratum aut oxymelitis vsum, si & dolor concesserit (forti, cathartico, sponte naturæ, venæ sectione,) nec aliud vllum signum calamitosum appareat, (non stercore, nec difficultas spirandi) sorbitionem dare oportet ilico non plena manu (cū os humescere inceperit, & expectoratum procedere) neque multam (quæ diuturna officij vacuitate facta est alvus ignauior) sed exacto morbi septimo vel nono die (nimirum abstinentiæ à multa & crassa præsana) sit ad illud tempus vsque ægri vires valeant, id faciendum. Cū autem iure præsana vsum inicit (sopito iam dolore, ac procedente expectorato) si pridianæ fæces non aluo cesserint, si quidem valeat æger, & sit florenti ætate, clystere cieda est alvus emolliente: si autem infirmior sit, balann qui ex melle cocto conficitur: nisi vltro conuenienter feratur. Et cū æger iure vitetur præsana, hoc est, iam sedato dolore, ac procedente expectorato, vitendum erit ut loco etiam ea vitetur. Nam, inquit Hippocrates, cū frigidi sunt pedes (quod euenit inuito paroxysmi per affectionem caloris matui, à contrariæ materiæ occursu ipso

periore ventre) præsana vsum inhibere oportet (ne corrumpatur in ventriculo à materia morbifica, statque morbi causa; & ne in thorace difficultatem spirandi adferat) maximeque potu abstinentum. Sed cū febrilis calor ad pedes descenderit (restitutus temperatisque hypochôdriis, quæ incendio conflagrabant, & thoracæ) tunc exhibenda præsana sorbitio est. Cæterum in eunte præsana vsum potissimum cremore præsana erit vitendum (ut assuescat natura ignauior facta, & ut facilius concoquat) deinde verò præsana integrâ. Verum quæ arte accessio adiungenda sit sorbitioni, præclare docet Hippocrates libro secundo De morbis acutis: longius excurrerem si hoc cuncta conferre velim. Hæc summa est. Cū iure vitetur præsana æger, inspicere motum & magnitudinem morbi, & ægri peculiatem naturam. Nam quò propius abest à statu, eo parcius nutritur: ut status commodè inediâ transigatur, & quò longius abest à statu, eò liberalius nutriatur, ut liceat *plu' assu'lu' in inedia transigere*. Sensim enim copia attenuanda erit cū veniat ad statum, ita ut biduum vel triduum per inediam tunc transigat. Sed tamen peculiaris naturæ ratio est habenda: nam picrocholi non ferunt inediam; at phlegmatici, facili. Quare nota in primis ex symptomatum magnitudine motum & magnitudinem morbi, ut scias quando vigor in prociectu sit futurus: Si enim septimo vel nono die videatur is adfuturus, ineunte morbo non fraudabis ægri genium, sed cū ferè ad vigorem ventum est. Quare longè minus peccant illi qui ineunte morbo cyciona, hoc est mixta prauaque alimenta, offerunt ægro, quàm qui præsana illis præbent imminente vigore. Nam vigor transigi inediâ debet. Si igitur tardè veniet ille, primum (placato aut dolore) liberalius habeantur vsque ad morbi statum: sin tertio vel quarto die expectetur vigor summus morbi, ilico abstineat à cibo, modò vires id ferant, hoc est si non sit antè exhaustus ab aliqua euacuatione, vel si sit picrocholos homo, hic enim inediam non feret. Doctum enim medicum virum imbecillias in cibum nunquam cogere debent, sed causa infirmitatis. Causa infirmitatis est exhaustus, vel oppressio à materie morbosæ copia: hæc vacuationem

nullaque ratione cibum petit: illa, cibum flagitat. Tecmarūn autem benè medendi in potu eleganter docuit Hippocrates libro tertio De victus ratione in morbis acutis. Docet enim ibi quomodo potionum quattuor genera simplicissima, vinum, aqua, melicratum, & oxymel commodè in vsum duci debeant, & vique in his considerandum Quid, Quantum, Quando, Quibus, cum virium distinctione. Apert enim harum quattuor rerum naturam, quò conuenienter quæ cuique adhibendi sit ratio doceat. Nihil enim temerè est pronuntiandum de alimentis aut medicamentis: sed Indicatione sumpta à morbo, viribus ægri, peculiari quæ cuiusque natura & consuetudine: quo modo adhiberi conuenienter possint in qualitate, copiam, vtendi modo, & occasione. Possent, si velim, vtilissima ac præclara inde adferre, sed video me in huius morbi descriptione iam satis prolixè breuitatem violasse: quare supersedeo. Ita flexit prudenter Hippocrates prisa, vini, aquæ, melicrati, oxymelitis quæ vsum ad curationem pleuritidis; & rectè pronuntiari Aretæus. In alimentis medicamenta esse. Si biliosa fuerit pleuritis, non absque insigni febre, cauebis ab aëre calidiore. Nec eam horrido frigore præditus sit: sit temperie moderatus. In pleuritide pituitosa & melancholica sit etiam calidus aër. Magna, vt antè diximus, cautione opus est in cibi exhibitione. Dum dolet, abstineat. Ardens febris vix in septimum diem excurrere solebat; quid igitur consensibus de pleuritide, quæ consociatur ardenti febre? Propterea Hippocrates non solum pituitam in vsum ducit, sed etiam melicratum. Cum ergo iure & loco pastum inire poterit æger, quibus utemur? pituitam. Auenzoar triticeo fursuri tantum aquæ affundit, quantum opus est vt supermadear & inundet. Post duodecimam horam exprimit densò linteo. accipit id quod in colaturæ fundo sidit: sit inde pulicula. Quidam addunt amygdala, & semina maiora frigida, cum saccharo. Idem ille Auenzoar spinachiam præbet. Primò fiat pulicula liquidior: secundo, crassior: tertio, misce amygdala. Deinde eadem ex pullorum iusculis, & tritis eorum carnis: dulcorentur saccharo violato. Ius pulli in quo coxit pimpinella: vel semina

melonum, amygdala, pinci nuclei, papauer, vel tusilago, aut passulæ. Et geiatunæ mala dulcia cocta. Panaia cum saccharo. Vbi expectorare cœpit æger, inquit Razes, cotidie manè propinabis ex eo decocto quod descripti ad Destillationes: idque perpetuò ante hordei decoctum: dum restituitur æger. Passulæ leuiter coctæ cum saccharo. Octavianus Horatius manè semel cibum dat: nam, inquit, vespertinæ horæ vitia quasi renasci cogunt, commotionem interea addentes: Ita inquit, facilius ægritudinem resciensabis. Trallianus tencros & humidos pisces præbet, vt turdum marinum. In pituitosa Pleuritide non sit victus tenuissimus: nam euagari longius eius mora potest. In oculis sit ægri natura. In biliosa, victus ratio sit refrigerans: pedes animalium, pisces, si æger inter spirandum strepitum non reddat. In pituitosa sit abstergens, attenuans; iusculis incoque semen botrysos. Si, dicit Aretæus, humida & copiosa materia peros feratur, sulphur ignem non expertum & nitrum in oua inspergito, vel resinam, vel terebinthinam, si glutinosa fuerit pituita, & piper in ouis, & in pituita. Iusculis etiam inde petroselinum, adiantum, origanum, & talia. Aqua testudinis præclare refrigerat: sumatur cum saccharo violato. In genere, inquit Aretæus, cibis calidus & humidus esto, lenis, æquabilis; ouum. Auenatum commendat Trallianus. Sine cuncta dulcia, pingua, ex sententia Aduarrij, & tactu rapida. Potus sit aqua saccharata: hæc deterget, coquit, lenit, nutrit. Accipe aquæ, vel decocti hordei libram: sacchari vnciam, ad vncias tres: adice parum cinnamomi. Iulep pituitam cum aqua cocta: vel sirupus de iuinbis in biliosa materia. Sirupus capillorum veneris, nam incidit pituitam sine calore: & sirupus de liquiritia. Decoctum iuibarum, passularum, hordei, & bonyos. Nihil aequè, inquit Trallianus, pleuritici accommodatum est ac aquosa mulsæ. Si, dicit Trallianus, phlegmones feruor iam cessat, nec admodum febricitet, viticæ semen cum hyssopo pituitæ incoque: abstergit viscida. Vespere amygdalorum succum bibat. Vinum negari his debet, nam adest inflammatio. Et aqua actû frigida pota est his calamitosa: nam ne aër quidem frigidiore his con-

Alimenta  
tum &  
Medica-  
menta  
ut in  
vsum sit  
ducenda.

Aër.

Cibus.

Exsur-  
sura.

Cautio.

Potus.



concedi debet. Quicumque Medici, inquit Aetius, aquam frigidam pleuritis concesserunt, neque qua ratione id fecerint assequi valeo, neque experimento confirmare: siquidem si qui a frigida periculum curarunt, hi profecto mihi nō laborare pleuride vili sunt. Sitis tempore bibatur hordei aqua tepide, cū sirupo violato, adianthi, vel de glycyrrhiza; in pituitosa materia, cum oxymelite simplici. Vel misce hos sirupos cum hydromelite in quo cocta est glycyrrhiza. Accipe aquæ libram: acetum, mellis, cuiusque semonciam: sacchari vncias duas: coque. *Ægyptii* nunc vniunt Mastahaleb poutone, omnibus febribus dilata. Sitis extinguitur ardorem, & vrinæ est, ac in laterum dolore *Ægyptii* expectiturum. sit hoc modo, Accipe seminis melonum vncias quatuor: seminis anguræ, cucurbitæ, cucumerum, singulorum vnciam: liquiritiæ, sacchari crystallini, cuiusque semonciam: seminis anisi vel fœniculi drachmas tres: fiat confusio minutim in mortario: pecia excipe, & aquâ rosatâ lac emulgeatur exprimendo: sumat id. In ardentissimis febribus addunt his semen endiuicæ, laquæ, psyllii, portulacæ, papaueris albi; & daucum si status adsit: Si dolor, iungunt semen althææ, maluæ, meliori, cœnugæci, lini, scelsami. Si vigilie fatigant, accipiat sirupi violati vnciam: si rupi papaueris semonciam: decocti hordei vncias tres; detur sub noctem. Iam *Empirica* quædam subnecto. Primò potest aquâ cardui benedicti: post septimum diem damel, cui intra sint amygdala & semen vriticæ, adde buyron. Quidam accipiunt manapulm magnam cardiacæ herbæ; ex qua extendunt succum cum vino: potest calidè. Coque flores papaueris erratici ex aqua scabiosæ: expressum bibat aquam. Alii in principio, dum adhuc affluit materia biliosa, coquant flores rubri papaueris in aquâ pimpinellæ, & singulis tribus horis propinquant vncias tres vel quatuor: post tertium diem præscribunt sudorifica, ut succum cardui benedicti: nā si is primum daretur, irritaret fluxum: & si papaver postea propinaretur, expeditorum sisteret. Quidam præscribunt aquam herbæ & radicem pimpinellæ, acetosæ; prunellarum cum radicibus distillatarum: ad vncias quatuor, manè. Rases præbet scobis den-

us aprugni scriptulum: cum cochlear olei lini. sumitur etiam cinis priapi tanti cum vino. Quidam accipiunt vnum auratellum ovum equi comedentis aeniam: & si a calore nata sit pleuritis, in aqua endiuicæ; si cum frigore inuaserit, in vino macerant: deinde per pepsim transcolant: & tepidè propinquant: ac lecto ut fudet copiosè tubent. aut ut valdè refrigerare. Nour ego principes qui eo remedio in se utebantur ipsi. Vel sumat haustum succi scabiosæ cum pulvere radicis scabiosæ & corallo, adde saccharum: hoc illic rumpit apostema. Accipe olei seminis lini vncias duas: succi althææ tantundem: potet manè & vespert. Dioscorides drachmam balsami dat cum melicrato, ubi antiquum malum est. Idem leucacanthæ radice succi cyathi mensuram dat cum hydromelite. Dant alij pulueris querni visci ex vino drachmam. Alij recentis olei seminis lini vnciam. Accipe membranam diuidentem nucleū nucis iuglandis, & nucleorum iuglandum cuiusque drachmas duas: radices ineu scriptulos quatuor: croci grana duodecim: fiat pulvis: da eius drachmam ex vino vel aqua. Nonnulli exhibent cortices ouellanarum cum iusculo. Probant alij decoctum radicum phu cum saccharo si bibatur: & ilico iuuare affirmant. Pemo dulci incoque thus, comedat cum saccharo penidiario, manè & vespert duas horas ante pastum. Pellis ouina, inquit Dioscorides, *Feris*, piceliquida circumlita, & sulphure viuo illita, quod ipsum etiam picem inspergendum; imponatur, oportet autem mediam partem pellis illinere, ne pix diffiluat. Accipe radicem althææ, sub cineribus in folio caulis coctam, & crebellatarum vncias tres: seminis lini, cœnugæci, florum chamæmelt, cuiusque semonciam: coque in decocto caricarum: adde, in fine, adipis porcini recentis vnciam: fiat cataplasma. Caulis brassicæ cum radicibus cremati cum suillo adipe admoventur, ubi non adest magna febris. Admonendum putat Aëtius, ex crassis crudisq; cibis, veluti sunt bulbi ac fungi, crudos humores gigni, qui se repenti in vacuum thoracis locum ingerunt, aut in ipsum etiam pulmonem, ac copîa sui distendunt membranam costis intexam; ac ideam verè pleuritidis fingunt adeo, ut etiam

*Nelanda.*  
*Tart. 2.*  
*Serm. 3.*  
*cap. 68.*

viam

## CAPVT III.

## DE EMPYEMATE.

viam spiritus intercipient, vehementemque spirandi difficultatem adferant. Vade quidam Medici errore seducti, venâ cubiti incisâ, multoque sanguine euacuato, mortis causam ægris præbuerunt. Quare diligenter interroga de victus ratione: ac pulsus & calorem tentâ tactu. Sapini decumbunt: intercepia laqueo videtur illis respiratio, vt vix loquantur: non sentiunt. Clysterio leniente eluatur aluus, dein ex calamintha & centaurea, illinantur oleo rutæ & anethi. Bibant hydromel pulegiatum, in quo caricæ coxere. Orribasius author est, quum diuturnis doloribus thorax citra febrem detineatur, vt palmulæ pingues cum foenugræco decoquantur, succus exprimatur: cui mel copiosum admiscebimus: coquantur iterum ad mellis crassitiem: eo multum ante cibos vtatur. Vires erigantur instaurantibus, quibus immaduit pimpinella, calendula, borago, violæ, cum pauco hyssopo. Fit sacculus ex fursuribus, leui ebullitione ex aqua admouetur fortiter expressus. Vel ex spongiâ fiat forus imbuitâ decocto radicum alihæz, seminis lini, florum chamæmeli & meliloti. Coque parietariam ex oleo, in patella, leuiter: admove. Si materia fuerit humida, fiant sacculi ex milio, fursure, sale. Vinum rhodites commendat author Geoponicus. Si INFLAMMATA fuerit membrana Mediastina, quæ nectitur ossi sterni: seca bis venam vel ter, nam repetita sectio effundit prauum sanguinem; & illine oleo violato. bibat libram aquæ cichorei frigidam à vena secta. Illine frigido actu oleo, & inde cum aqua endiuiz fiat epithema: vel ex farina hordei & his fiat cataplasma. Hyeme tepidè admoue hæc: & tandem adde olei chamæmeli, sine aqua. & addo farinam foenugræci: cum erocotandem. Sed, ni venæ sectio iuuerit, ferè moriuntur. Fiat decoctio ex violis, hordeo, endiuia, capillaribus herbis, passulis, cum sirupo violato & endiuiz, de liquiritia, de sarfara. tepidè dentur. Cocta purgentur Rhabbarbo & manna. Sola vtatur puîsana tepida. Bibat aquam saccharatam. Post septimum diem vtetur iure pulli & ouo. Aluus clystere mollescat antequam detur cibis semper: ne alioqui fiat spirandi difficultas.

4. loc.  
aff. 81.

Fol. 156.  
Medi-  
stina in-  
flamma-  
ta.

QVORVM Pleuritis neque dictâ, neque fomentis, aut sanguinis detractione, nec alio prorupta quæuit, caruitque libera & liberali anacatharsi, in vomicam abire solet: hoc est, eius phlegmone pus suscipit. quæ vomica cum rumpitur, pus effundit inter thoracem ac pulmones; diciturque tunoca affectio Empyema. Hippocrates Empyema nominare consuevit omne partium omnium phyma quod in pus aliteratum est. nos vero *purus* seu purulentos vocamus eos, quibus collectum pus stabulatur inter pulmones & thoracem. Aput Hippocratem etiam in vtraque significatione legitur. Quare empyema hoc differt ab empyo vel purulento, quod empyematis nomen, omni cuiusque partis suppurato apponatur; empyi verò non dicuntur nisi hi, quibus pus natat capacitate thoracis. Tales empyicos vocat Vomicos Aurelianus. Est autem empyema, de quo nos agimus, oppressio spacijs pectoris & pulmonis à purulenta materia. Diximus esse oppressionem, nam morbus hic est mala conformatio, qua spaciû illi quod est inter pectus & pulmones, oppletur à purulenta materia: nam inde actio thoracis intercipitur & pulmonis; nec enim alas suas pulmo expandere potest, nec thorax suum in conuiuendo officium facere; vnde ægrè respirant ægri. Si verò ita materia congeratur in viscere, non autem in spacio thoracis, vt inde in molem turgescat thorax, ceusebimus illum morbum ad magnitudinem referri debere. Sed in cuncto empyemate oppressio patentius spacijs adest, sed non vbique se conficiat tumor. nec enim semper tantâ copiâ circumfluit materiæ thorax, vt in illum tumorem surgat thorax, quo actio eius lædatur. Sed à quibus rebus fit hæc spacijs pectoris oppressio? Non sanè hic aqua hoc facit, quæ in pectoris hydrope hoc vitium inferre solebat; sed est materia purulenta. Dico non pus, cum interdum ab emula puri materia hoc vitium sobolescat: talis est puiuita & sanguis putrescens. Omnia enim perspiratu carentia ac alieno in loco vehementius incallescuntia putrescunt: sed non idem semper modus.

7. Aph.  
14.

Defini-  
tio, & cum  
explicatio.

12. Aff.  
lib. 2.

CAV-  
SAR.

Puritas &  
purulenta  
materia  
descrip-  
tionem.

modus. Discriminatur itaque materia purulenta à vero pure. In optimo pure fit media putredo, à calore extraneo resistente coitioni. Puris enim confectio ab utroque fit calore, narium & eo qui est præter naturam, vel potius, fit coctio secundum naturam, sed rei quæ præter naturam est. Purum merumque pur fit à materia nutritia, hoc est, sanguinea, siue ea biliosa, pituitosa vel melancholica fuerit. Hæc verò nutritia materia nec vndequeque bona est, nec plane corrupta, sed semimala, attamen pepasmi capax: quia bonitas superat in ea materia, & calor narius vincit eum qui est præter naturam. Si enim pepasmi expertus illa esset, sanè natura hanc non euinceret, illaque membro, ubi citius focus est, pernitem infestet, & gigneretur pus scendum, nigricans, scdum. Pus verò quod non merum est, venit à materia excrementitia. Vt qui ex diuturno morbo partium spirabilium fatigati, tandem pus spuit. cuiusmodi sunt qui ex perenni prælapsu catarrhi, aut ex succorū in thorace synarthrismo, vel ex succorum crudorum lateribus hærentium copia, ac iam putrescentium, illū iam incipiunt expectorare, quorum maxima pars in Phthisin abit. Tale quid euenit vxori Hippie, quæ periticionium tussierat, deinde in empyema venit, mox hydropica euasit: videtur tamen conualuisse mensibus euocatis. Quare pus interdum ex pulmonibus expectoratur, nec tamen propterea pulmones in corruptelæ suspicionem venire debent. Nam scribit Galenus, pituitam ex capite pectori illatam puri similem reddi. est enim hæc purulenta materia, non autem merum pus, nam est ex materia excrementitia: cum merum pus, ex nutritia materia sobolescat. Ita sanguine in thorace labente ex capite, & ex catarrhis inde manantibus, quin, authoribus Paulo & Aetio, seroso flosq. ex humore à toto corpore in cauitatem thoracis exussio, materia hæc purulenta ibi gigni potest: vel ex abdomine, vt in hydrope ex suppressis mensibus, vel ex corde in thoracem eructatur. Verum empyema quod merum pus habet, ortum ducit à pleuritide, cuius materia non bene expectorata fuit. Nam phlegmone non facit abscessum, nisi in pus versa: nā incuntes phlegmone spargitur materia, quæ postea in sinum se colligit, ac vomit.

cam facit: quæ rupta, effunditur materia in cauitatem thoracis. Quin verum etiam pus effundi potest ex inflammato pulmone, quod Polycrates vxori euenit, quin ab angina: hoc est, post affectus inflammaiores: nam horum materia est nutritia. Obseruatum fuit longa die materiam in pulmone interdū coaceruari cystique obduci, ita vt omni magnitudine interdū extullatur. Hoc innuit videtur Areæus, ubi ait, Humor aliàs iners imbecillusque inhæret, aliàs acis & mordax, & ad mortem vsque putrefaciens. Nam dixerat empyema oriri à plaga, cruditate, frigore, diuturna tussi, pleuritide, vomitū pulmonis, catarrho diuturno, & acuti morbi in id decubitu. Sanè ex remotissimis etiam partibus, fit occulta in pectus puris translatio. Sed, inquit Areæus, Magnum profectò miraculum est quo modo id fiat, vt ab exili tenuique membrana nihil crassitudinis habente, tanta copia puris effundatur. Causa est inflammatio ex sanguinis multitudo, ob quam membrana crassescit. Annotauit Galenus, quosdam ossi heminis puris sensum exclusisse. hemina, decem uncias æquat, existimare quis possit, totum nutrarium co abripi. In empyemate, vel totius thorax repletur purulentia: vel dextra aut sinistra solum pars thoracis repletur: non enim datur excursio materię à dextris ad sinistras partes: quod membranæ diaphragmatis ossi pectoris annexæ, id non admittant: partes enim interiectæ vice funguntur, ac thoracis spacium mediast. non intercepto diuidunt. Præterea hæc materia vel purum pus est, vel purulenta. Est sanè vehemens affectus hic, mali moris, cū morā putrescat scdē materia, est non intercalaris, sed perennar: contagione scdū, quod miasmata fœtida effundunt ægri cū animam reddunt: non ex sympathia, sed idio-pathia in vitio est. Sed est ne hoc vitium acutum? author enim est Galenus ab Emphyemate homines subito rapi: & causam adnectit, asseritque id fieri tum ob vim affectus, tum ob vitium labefactionem. Si ob vim affectus, igitur ratione sui, imò peracutum malum hoc est, cū celeritè hominem enecat. Galenus alibi tamen asserit hunc affectū esse diuturnum, cū in diem vsque quadragessimū excurrit. Respōsio est, aliud esse pectus, vt loquitur Hippocra-

gg tes,

## CAPVT III.

## DE EMPYEMATE.

4. loc.  
aff. 81.Fol. 106.  
Medi-  
fina in-  
flamma-  
m.

viam spiritus intercipient, vehementem-  
que spirandi difficultatem adferant. Vnde  
quidam Medici errore seducti, venâ cubiti  
incisâ, multoque sanguine euacuato, mor-  
tis causam ægris præbuerunt. Quare dili-  
genter interroga de virtus ratione: ac pul-  
sus & calorem tenâ tactu. Supini decum-  
bunt: intercepta laqueo videtur illis respi-  
ratio, vt vix loquantur: non sicut. Cly-  
mo leniente eluatur alius, dein ex cala-  
mintha & centaurea. illinantur oleo rutæ  
& anethi. Bibant hydromel pulgatiur,  
in quo caricæ coxere. Orbasius author est,  
quum diuturnis doloribus thorax citra fe-  
brem detinetur, vt palmolæ pingues cum  
sœnugræco decoquantur, succus exprima-  
tur: cui mel copiosum admiscibimus: co-  
quantur iterum ad mellis crassitiem: eo  
multum ante cibos viatur. Vires erigantur  
instituantibus, quibus immaduit pimpin-  
ella, calendula, borago, violæ, cum pau-  
co hyssopo. Fit sacculus ex fursuribus, le-  
ui ebullitione ex aqua admouetur foriter  
expressus. Vel ex spongiâ fiat forus imbu-  
tâ decoctio radicum alihæ, seminis lini,  
florum chamæmeli & meliloti. Coque pa-  
rietariam ex oleo, in patella, leuiter: admo-  
ue. Si materia fuerit humida, fiant sac-  
culi ex milio, fursure, sale. Vinum rhodi-  
tes commendat author Geoponicus. Si  
INFLAMMATA fuerit membrana Media-  
stina, quæ nectitur ossi sterni: seca bis ve-  
nam vel ter, nam repetita sectio effundit  
prauum sanguinem; & illine oleo violato.  
bibat libram aquæ cichorei frigidam à  
vena secta. Illine frigido actu oleo, & inde  
cum aqua endiuiz fiat epithema: vel ex fa-  
rina hordei & his fiat cataplasma. Hyeme  
tepidè admoue hæc: tandem adde oleû  
chamæmeli, sine aqua. & addo farinam  
sœnugræci; cum croco tandem. Sed, si  
venæ sectio iuuerit, serè moriuntur. Fiat  
decoctio ex violis, hordeo, endiuia, capil-  
laribus herbis, passulis, cum sirupo violato  
& endiuiz, de liquiritia, de farfara. tepi-  
dè dentur. Cocta purgentur Rhabarbaro  
& manna. Sola viatur prisana tepida. Bi-  
bat aquam saccharatam. Post septimum  
diem vietur iure pulli & ovo. Alius clyste-  
re mollescat antequam detur cibus sem-  
per: ne alioqui fiat spirandi difficultas.

QVORVM Pleuritis neque dictâ, ne-  
que fomentis, aut sanguinis detra-  
ctione, nec alio prorupta quicquit, caruit-  
que libera & liberali anacatharsi, in vo-  
micam abire solet: hoc est, eius phlegmo-  
ne pus suscipit. quæ vomica cum rumpi-  
tur, pus effundit inter thoracem ac pulmo-  
nes; diciturque tunoea affectio Empyema.  
Hippocrates Empyema nominare conser-  
uit omne partium omnium phlyma quod  
in pus aliteratur est. nos vero *ipurus* seu  
purulentos vocamus eos, quibus collectum  
pus stabulatur inter pulmones & thora-  
cem. Aput Hippocratem etiam in vtraque  
significatione legitur. Quare empyema  
hoc differt ab empyo vel purulento, quod  
empyematis nomen, omni cuiusque partis  
suppurato apponatur; empyi verò non di-  
cuntur nisi hi, quibus pus natat capacitare  
thoracis. Tales empyicos vocat Vomico-  
sos Aurelianus. Est autem empyema, de  
quo nos agimus, oppressio spacijs pectoris  
& pulmonis à purulenta materia. Dixi-  
mus esse oppressionem, nam morbus hic  
est mala conformatio, qua spaciû id quod  
est inter pectus & pulmones, oppletur à  
purulenta materia: nam inde actio thora-  
cis intercipitur & pulmonis; nec enim alas  
suas pulmo expandere potest, nec thorax  
suum in conuiuendo officium facere; vnde  
ægrè respirant ægri. Si verò ita materia  
congeratur in viscere, non autem in spacio  
thoracis, vt inde in molem turgescat thora-  
x, ceasebimus illum morbum ad magni-  
tudinem referri debere. Sed in cuncto em-  
pyemate oppressio patetis spacijs spacijs ad-  
est; sed non vbique se confociat tumor,  
nec enim semper tantâ copiâ circumfluit  
materiæ thorax, vt in illum tumorem sur-  
gat thorax, quo actio eius lædatur. Sed à  
quibus rebus fit hæc spacijs pectoris oppres-  
sio? Non sanè hic aqua hoc facit, quæ in  
pectoris hydropse hoc vitii inferre solebat;  
sed est materia purulenta. Dico non pus,  
cû interdum ab emula puri materia hoc  
vitiû sobolescat: talis est pituita & sangui-  
putrescens. Omnia enim perspiratu caren-  
tia ac alieno in loco vehementius incal-  
lescentia putrescunt: sed non idem semper  
modus.

7. Aph.  
44.Defini-  
tio, & em-  
plicatio.11. Aeg.  
lib. 1.CAV-  
SÆ.Purum &  
purulen-  
ta mate-  
ria dyscri-  
men.

modus. Discriminatur itaque materia purulenta à vero pure. In optimo pure fit media putredo, à calore extraneo resistente coctioni. Puris enim confectio ab utroque fit calore, natiuo & eo qui est præter naturam, vel potius, fit coctio secundum naturam, sed rei quæ præter naturam est. Purum merumque pus fit à materia nutritia, hoc est, sanguinea, siue ea biliosa, pituitosa vel melancholica fuerit. Hæc verò nutritia materia nec vndequeque bona est, nec plane corrupta, sed semimala, at tamen pepasmi capax: quia bonitas superat in ea materia, & calor natiuus vincit eum qui est præter naturam. Si enim pepasmi expertis illa esset, sanè natura hanc non euinceret, illaque membro, ubi eius focus est, perniciosè inferret, & gigneretur pus scetidum, nigricans, scædum. Pus verò quod non merum est, venit à materia excrementitia. Ut qui ex diuturno morbo partium spirabilem fatigati, tandem pus spūit. cuiusmodi sunt qui ex perenni prelapsu catarrhi, aut ex succorū in thorace synathrisimo, vel ex succorum crudorum lateribus hærentium copia, ac iam putrescentium, illū iam incipiunt expectorare, quorum maxima pars in Phthisin abit. Tale quid euenit vxori Hippie, quæ per tricenarium iussierat, deinde in empyema venit, mox hydropica euasit: videtur tamen conualuisse mensibus euocatis. Quare pus interdum ex pulmōibus expectoratur, nec tamen propterea pulmōnes in corruptelæ suspicionem venire debent. Nam scribit Galenus, pituitiam ex capite pectori illatam puri similem reddi. est enim hæc purulenta materia, non autem merum pus, nam est ex materia excrementitia: cum merum pus, ex nutritia materia sobolescat. Ita sanguine in thoracem labente ex capite, & ex catarrhis inde manantibus, quin, authoribus Paulo & Acetio, seroso salsoque humore à toto corpore in cavitatem thoracis excusso, materia hæc purulenta ibi gigni potest: vel ex abdomine, vt in hydropce ex suppressis mensibus, vel ex corde in thoracem eructatur. Verum empyema quod merum pus habet, ortum ducit à pleuritide, cuius materia non bene expectorata fuit. Nam phlegmone non facit abscessum, nisi in pus versa: nā inuente phlegmone spargitur materia, quæ postea in sinum se colligit, ac vom-

cam facit: quæ rupta, effunditur materia in cavitatem thoracis. Quin verum etiam pus effundi potest ex inflammato pulmōne, quod Polyeratis vxori euenit. quin ab angina: hoc est, post affectus inflammatorios: nam horum materia est nutritia. Obseruatum fuit longa die materiam in pulmōne interdū coaceruari cystique obducui, ita vt omni magnitudine interdū extulsiatur. Hoc innuisse videtur Areæzus, ubi ait, Humor aliū iners imbecillusque inhæret, aliū actis & mordax, & ad mortem vsque putrefaciens. Nam dixerat empyema oriri à plaga, cruditate, frigore, diuturna tussi, pleuritide, vomitū pulmonis, catarrho diuturno, & acuti morbi in id decubitu. Sanè ex remotissimis etiam partibus, fit occulta in pectus puris translatio. Sed, inquit Areæzus, Magnum profectū miraculum est quo modo id fiat, vt ab exili tenuique membrana nihil crassitudinis habente, tanta copia puris effundatur. Causa est inflammatio ex sanguinis multitudine, ob quam membrana crassescit. Annotauit Galenus, quosdam eorum heminas sensim exclusisse, hemina, decem vncias æquar, existimare quis possit, totum nutrimentum eo abripi. In empyemate, vel totus thorax repletur purulentia: vel dextra aut sinistra solum pars thoracis repletur: non enim datur excursio materię à dextris ad sinistras partes: quod membranz diaphragmatis ossi pectoris annexæ, id non admittant: paries enim interiecti vice funguntur, ac thoracis spacium mediast. non interepto diuidunt. Præterea hæc materia vel purum pus est, vel purulentia. Est sanè vehemens affectus hic, mali moris, cū morā putrefcat foedè materia, est non intercalaris, sed perennit: contagione foedū, quod miasmata foetida effundant ægri cū animam reddunt: non ex sympathia, sed idio-pathia in vitio est. Sed estne hoc vitium acutum? author enim est Galenus ab Empyemate homines subito rapi: & causam adnectit, asseritque id fieri tum ob vim affectus, tum ob vitium labiæ rationem. Si ob vim affectus, igitur ratione sui, imò peracutum malum hoc est, cū celerimè hominem enecer. Galenus alibi tamen asserit hunc affectū esse diuturnum, cū in diem vsque quadragesimum excurrit. Respōsio est, aliud esse pectus, vt loquitur Hippocrates,

7 Epid.

Differen-  
tia.Dulcium.  
4. Lec.  
aff. 7.

7. Aph.

viam spiritus intercipient, vehementerque spirandi difficultatem adferant. Vnde quidam Medici errore seducti, venâ cubiti incisâ, multoque sanguine euacuato, mortis causam ægris præbuerant. Quare diligenter interroga de victus ratione: ac pulsus & calorem sentâ tactu. Supini decumbunt: interceptra laqueo videtur illis respiratio, vt vix loquantur: non sitiunt. Clyster lenienter eluatur aluus, dein ex calamintha & centaurea, illinantur oleo ruæ & anethi. Bibant hydromel pulegiatum, in quo caricæ coxere. Orbisfalus author est, quum diuturnis doloribus thorax citra febrem detineatur, vt palmulæ pingues cum sœnugræco decoquantur, succus exprimitur: cui mel copiosum admiscemus: eo quantur iterum ad mellis crassitiem: quomultum ante cibos vtatur. Vires erigantur instaurantibus, quibus immaduit pimpinella, calendula, borago, violæ, cum pauco hyssopo. Fit sacculus ex fursuribus, leui ebullitione ex aqua admouetur fortiter expressus. Vel ex spongiâ fiat forus imbutâ decoctio radicum alibæ, seminis lini, florum chamæmeli & meliloti. Coque parietariam ex oleo, in patella, leuiter: admoue. Si materia fuerit humida, fiant sacculi ex milio, fursure, sale. Vinum rhodites commendat author Geoponicus. Si INFLAMMATA fuerit membrana Mediastina, quæ nectitur ossi sterni: seca bis venam vel ter, nam repetita sectio effundit prauum sanguinem: & illine oleo violato. bibat libram aquæ cichorei frigidam à vena secta. Illine frigido astu oleo, & inde cum aqua endiuivæ fiat epithema: vel ex farina hordei & his fiat cataplasma. Hyeme tepidè admoue hæc: & tandem adde oleû chamæmeli, sine aqua. & addo farinam sœnugræci: cum crocotandem. Sed, ni venæ sectio iuuerit, ferè moriuntur. Fiat decoctio ex violis, hordeo, endiuia, capillaribus herbis, passulis, cum sirupo violato & endiuivæ, deliquiritia, de farara. tepidè dentur. Costa purgentur Rhabarbaro & manna. Sola vtatur præsana tepida. Bibat aquam saccharatam. Post septimum diem vtetur iure pulli & ovo. Aluus clystere mollescat antequam detur cibus semper: ne alioqui fiat spirandi difficultas.

A. loc.  
aff. 81.

Fol. 106.  
Medu-  
stini in-  
flamma-  
tio.

## CAPVT III.

## DE EMPYEMATE.

QVORVM Pleuritis neque dictâ, neque sumentis, aut sanguinis detractione, nec alio prorupta quieuit, caruitque libera & liberali anacatharsi, in vomicam abire solet: hoc est, eius phlegmonè pus suscipit. quæ vomica cum rumpitur, pus effundit inter thoracem ac pulmones: diciturque tunoæ affectio Empyema. Hippocrates Empyema nominare confuevit omne partium omnium phyma quod in pus aliteratum est. nos verò *imrûs* seu purulentos vocamus eo, quibus collectum pus stabulatur inter pulmones & thoracem. Aput Hippocratem etiam in viraque significatione legitur. Quare empyema hoc differt ab empyo vel purulento, quod empyematis nomen, omni cuiusque partis suppurato apponatur: empyi verò non dicuntur nisi hi, quibus pus natat capacitate thoracis. Tales empyicos vocat Vomicos Aurelianus. Est autem empyema, de quo nos agimus, oppressio spacijs pectoris & pulmonis à purulenta materia. Diximus esse oppressionem, nam morbus hic est mala conformatio, quæ spaciû id quod est inter pectus & pulmones, oppletur à purulenta materia: nam inde actio thoracis intercipitur & pulmonis: nec enim alas suas pulmo expandere potest, nec thorax suum in conuiuendo officium facere: vnde ægrè respirant ægri. Si verò ita materia congeratur in viscere, non autem in spacio thoracis, vt inde in molem turgescat thorax, censemus illum morbum ad magnitudinem referri debere. Sed in cuncto empyemate oppressio parentis prius spacijs adest, sed non vbique se consociat tumor, nec enim semper tantâ copiâ circumfluit materiæ thorax, vt in illum tumorem surgat thorax, quo actio eius lædatur. Sed à quibus rebus fit hæc spacijs pectoris oppressio? Non sanè hic aqua hoc facit, quæ in pectoris hydropè hoc vitii inferre solebat; sed est materia purulenta. Dico non pus, cum interdum ab emula puri materia hoc vitii sobolescat: talis est pituita & sanguis putrescens. Omnia enim perspirata carentia ac alieno in loco vehementius incalcescuntia putrescunt: sed non idem semper modus.

7. Aph.  
44.

Defini-  
tio, & etiam  
explicatio.

12. Aff.  
lib. 1. 2.

CAV-  
SÆ.

Partis &  
purulen-  
ta mate-  
ria dyscri-  
men.

modus. Discriminatur itaque materia purulenta à vero pure. In optimo pure fit media putredo, à calore extraneo resistere coctioni. Puris enim confectio ab vitroque fit calore, nativo & eo qui est præter naturam, vel potius, fit coctio secundum naturam, sed re quæ præter naturam est. Purum merumque puri fit à materia nutritia, hoc est, sanguinea, siue ea biliosa, pituitosa vel melancholica fuerit. Hæc verò nutritia materia nec vndequeque bona est, nec plane corrupta, sed semimala, attamen pepasmi capax: quia bonitas superat in ea materia, & calor nativus vincit cum qui est præter naturam. Si enim pepasmi expertus illa esset, sanè natura hæc non evinceret, illaque membro, ubi cius focus est, perniciem inferret, & gigneretur pus scetidum, nigricans, scædum. Pus verò quod non merum est, venit à materia excrementitia. Vt qui ex diuturno morbo partium spirabilem fatigati, tandem per spūit. cuiusmodi sunt qui ex perenni prelapsu cataracti, aut ex succorū in thorace synathrisimo, vel ex succorum crudorum lateribus hærentium copia, ac iam putrescentium, illū iam incipiunt expectorare, quorum maxima pars in Phthisin abit. Tale quid euenit vxori Hippia, quæ per triennium tussierat, deinde in empyema venit, mox hydropica euasit: videtur tamen conualuisse mensibus euocatis. Quare pus interdum ex pulmōibus expectoratur, nec tamen propterea pulmōes in corruptelæ suspicionem venire debent. Nam scribit Galenus, pituitam ex capite pectori illatam puri similem reddi. Est enim hæc purulenta materia, non autem merum pus, nam est ex materia excrementitia: cum merum pus, ex nutritia materia sobolescat. Ita sanguine in thorace mlabente ex capite, & ex cataractis inde manantibus, quin, authoribus Paulo & Actio, seroso falsoq. ex humore à toto corpore in cavitatem thoracis excussio, materia hæc purulenta ibi gigni potest: vel ex abdomine, vt in hydropse ex suppressis mensibus, vel ex corde in thoracem eructatur. Verum empyema quod merum pus habet, ortum ducit à pleuritide, cuius materia non bene expectorata fuit. Nam phlegmone non facit abscessum, nisi in pus versa: nā ineunte phlegmone spargitur materia, quæ postea in sinum se colligit, ac romi-

cam facit: quæ rupta, effunditur materia in cavitatem thoracis. Quin verum etiam pus effundi potest ex inflammato pulmone, quod Polycratus vxori euenit. quin ab angina: hoc est, post affectus inflammatorios: nam horum materia est nutritia. Obseruatum fuit longa die materiam in pulmone interdū coaceruari cystique obduci, ita vt ouimagnitudine interdū extullatur. Hoc innuiss videtur Aræteus, ubi ait, Humor aliàs iners imbecillusque inhæret, aliàs acis & mordax, & ad mortem vsque putrefaciens. Nam dixerat empyema oriri à plaga, cruditate, frigore, diuturna tussi, pleuritide, vomitū pulmonis, cataracti diuturno, & acuti morbi in id decubitu. Sanè ex remotissimis etiam partibus, fit occulta in pectus puris translatio. Sed, inquit Aræteus, Magnum profectò miraculum est quo modo id fiat, vt ab exili tenuisque membrana nihil crassitudinis habente, tanta copia puris effundatur. Causa est inflammatio ex sanguinis multitudine, ob quam membrana crassescit. Annotauit Galenus, quosdam esse heminas lateris sensim exclusisse. hemina, decem vncias æquat, existimare quis possit, totum nutritarum eò abripi. In empyemate, vel totus thorax repletur purulentia: vel dextra aut sinistra solum pars thoracis repletur: non enim datur excursio materæ à dextris ad sinistras partes: quod membranz diaphragmatōdes ossi pectoris annexæ, id non admittant: paries enim interiecti vice funguntur, ac thoracis spacium mediast. no intercepto diuidunt. Præterea hæc materia vel purum pus est, vel purulentia. Est sanè vehemens affectus hic, mali moris, cū morā putrefacti scædæ materia, est non intercalaris, sed perennat: contagione scædū, quod miasmata scædæ effundant ægri cū animam reddunt: non ex sympathia, sed idio-pathia in vitio est. Sed est ne hoc vitium acutum? author enim est Galenus ab Empyemate homines subitò rapi: & causam adnectit, asseritque id fieri tum ob vim affectus, tum ob virium labefactionem. Si ob vim affectus, igitur ratione sui, imò peracutum malum hoc est, cū celerrimè hominem enecat. Galenus alibi tamen asserit hunc affectū esse diuturnum, cū in diem vsque quadragesimum excurrat. Respōsio est, aliud esse pæter, vt loquitur Hippocra-

7 Epid.

Differen-  
tia.Dulium.  
4. Lec.  
off. 7.

7. Aph.

## CAPVT III.

## DE EMPYEMATE.

viam spiritus intercipient, vehementemque spirandi difficultatem adferant. Vnde quidam Medici errore seducti, venâ cubiti incisâ, multoque sanguine euacuato, mortis causam ægris præbuerunt. Quare diligenter interroga de victus ratione: ac pulsus & calorem sentâ tactu. Supini decumbunt: intercepia laqueo videtur illis respiratio, vt vix loquantur: non sicut. Clysmo leniente eluatur aluus, dein ex calamintha & centaurea, illinantur oleo rutæ & anethi. Bibant hydromel pulegiarum, in quo caricæ coxere. Orbasius author est, quom diuturnis doloribus thorax citra febrem detinetur, vt palmolæ pingues cum sœnugræco decoquantur, succus exprimatur: cui mel copiosum admiscebimus: coquantur iterum ad mellis crassitiem: eo multum ante cibos vtatur. Vires erigantur instaurantibus, quibus immaduit pimpinella, calendula, borago, violæ, cum pauco hyssopo. Fit sacculus ex fursuribus, seu ebullitione ex aqua admouetur fortiter expressus. Vel ex spongiâ fiat forus imbutâ decoctio radicum alihæz, seminis lini, florum chamæmeli & meliori. Coque parietariam ex oleo, in patella, leuiter admoue. Si materia fuerit humida, fiant sacculi ex milio, fursure, sale. Vinum rhodites commendat author Geoponicus. Si INFLAMMATA fuerit membrana Mediastina, quæ nectitur ossi sterni: seca bis venam vel ter, nam repetita sectio effundit prauum sanguinem, & illine oleo violato. bibat libram aquæ cichorei frigidam à vena secta. Illine frigido actu oleo, & inde cum aqua endiuiz fiat epithema: vel ex farina hordei & his fiat cataplasma. Hyeme tepidè admoue hæc: & tandem adde oleû chamæmeli, sine aqua. & addo farinam sœnugræci: cum croco tandem. Sed, si venæ sectio iuuerit, ferè moriuntur. Fiat decoctio ex violis, hordeo, endiuia, capillaribus herbis, passulis, cum sirupo violato & endiuiz, deliquiritia, de farsara. tepidè dentur. Cocta purgant Rhabarbaro & manna. Sola vtatur prisana tepida. Bibat aquam saccharatam. Post septimum diem vtetur iure pulli & ouo. Aluus clystere mollescat antequam detur cibus semper: ne aliqui fiat spirandi difficultas.

4. loc.  
aff. 31.

Fol. 106.  
Mediastina inflammata.

QVORVM Pleuritis neque dixit, neque fomentis, aut sanguinis detractione, nec alio prorupta quæcui, caruitque libera & liberali anacatharsi, in vomica abire solet: hoc est, eius phlegmonæ pus suscipit. quæ vomica cum rum pitur, pus effundit inter thoracem ac pulmones: diciturque tunoæ affectio Empyema. Hippocrates Empyema nominare consuevit omne partium omnium phyma quod in pus alteratum est. nos verò *purius* seu purulentum vocamus eos, quibus collectum pus stabulatur inter pulmones & thoracem. Aput Hippocratem etiam in viraque significatione legitur. Quare empyema hoc differt ab empyo vel purulento, quod empyematis nomen, omni cuiusque partis suppurato apponatur: empyi verò non dicitur nisi hi, quibus pus natat capacitate thoracis. Tales empyicos vocat Vomicos Aurelianus. Est autem empyema, de quo nos agimus, oppressio spacijs pectoris & pulmonis à purulenta materia. Diximus esse oppressionem, nam morbus hic est mala conformatio, quæ spaciû id quod est inter pectus & pulmones, oppletur à purulenta materia: nam inde actio thoracis intercipitur & pulmonis: nec enim alas suas pulmo expandere potest, nec thorax suum in conuiuendo officium facere: vnde ægrè respirant ægri. Si verò ita materia congeratur in viscere, non autem in spacio thoracis, vt inde in molem turgescat thorax, censebimus illum turgeat & magnitudinem referri debere. Sed in cuncto empyemate oppressio patentis spacijs adest: sed non vbique se consociat tumor, nec enim semper tantâ copiâ circumfluit materiæ thorax, vt in illum tumorem surgat thorax, quo alio eius lædatur. Sed à quibus rebus fit hæc spacijs pectoris oppressio? Non sanè hic aqua hoc facit, quæ in pectoris hydrope hoc vitii inferre solebat: sed est materia purulenta. Dico non pus, cum interdum ab æmula puri materia hoc vitii sobolescat: talis est pituita & sanguis putrescens. Omnia enim perspiratu carentia ac alieno in loco vehementius incallescunt putrescunt: sed non idem semper

7. Aph.  
14.

Definitio, & eius explicatio.

1. 2. Aff.  
lib. 1. 2.

CAV-  
SÆ.

Partis & purulentæ materiæ descriptio.



modus. Discriminatur itaque materia purulenta à vero pure. In optimo pure fit media putredo, à calore extraneo resistente coctioni. Puris enim confectio ab vitroque fit calore, nativo & eo qui est præter naturam, vel positus, fit coctio secundum naturam, sed rei quæ præter naturam est. Purum merumque puri fit à materia nutritia, hoc est, sanguinea, siue ea biliosa, pituitosa vel melancholica fuerit. Hæc verò nutritia materia nec vndequeque bona est, nec plane corrupta, sed semimala, attamen pepasmi capax: quia bonitas superat in ea materia, & calor nativus vincit eum qui est præter naturam. Si enim pepasmi expertus illa esset, sanè natura hæc non evinceret, illaque membro, ubi cius focus est, perniciem inferret, & gigneretur pus scetidum, nigricans, scedum. Pus verò quod non merum est, venit à materia excrementitia. Ut qui ex diuturno morbo parium spiritabilium fatigati, tandem pus spūit. cuiusmodi sunt qui ex perenni prelapso catarrhi, aut ex succorū in thorace synathrisimo, vel ex succorum crudorum lateribus hærentium copia, ac iam putrescentium, illū iam incipiunt expectorare, quorum maxima pars in Phthisin abit. Tale quid evēnit vxori Hippie, quæ pertitionem iussierat, deinde in empyema venit, mox hydropica effusio: cui tamen conualuisse mensibus evocatis. Quare pus interdum ex pulmōibus expectoratur, nec tamen propterea pulmones in corruptelæ suspensionem venire debent. Nam scribit Galenus, pituitam ex capite pectori illatam puri similem reddi. Est enim hæc purulenta materia, non autem merum pus, nam est ex materia excrementitia: cum merum pus, ex nutritia materia sobolescat. Ita sanguine in thorace manebente ex capite, & ex catarrhis inde manantibus, quin, authoribus Paulo & Aetio, seroso falsoque ex humore à toto corpore in cavitate thoracis excusso, materia hæc purulenta ibi gigni potest: vel ex abdomine, ut in hydropce ex suppressis mensibus, vel ex corde in thorace eructatur. Verum empyema quod merum pus habet, ortum ducit à pleuritide, cuius materia non bene expectorata fuit. Nam phlegmone non facit abcessum, nisi in pus versa: nā ineunte phlegmone spargitur materia, quæ postea in sinum se colligit, ac romi

cam facit: quæ rupta, effunditur materia in cavitate thoracis. Quin verum etiam pus effundi potest ex inflammato pulmone, quod Polycratus vxori euenit. quin ab angina: hoc est, post affectus inflammatorios: nam horum materia est nutritia. Observatum fuit longa die materiam in pulmone interdū coaceruari cystique educi, ita ut omni magnitudine interdū extulsiatur. Hoc innuisse videtur Areæus, ubi ait, Humor aliàs iners imbecillusque inhæret, aliàs acis & mordax, & ad mortem vsque putrefaciens. Nam dixerat empyema oriri à plaga, cruditate, frigore, diuturna tussi, pleuritide, vomica pulmonis, catarrho diuturno, & acuti morbi in id decubitu. Sanè ex remotissimis etiam partibus, sic occulta in pectus puris translatio. Sed, inquit Areæus, Magnum profectò miraculum est quo modo id fiat, ut ab exili tenuisque membrana nihil crassitudinis habente, tanta copia puris effundatur. Causa est inflammatio ex sanguinis multitudine, ob quam membrana crassescit. Annouit Galenus, quosdam osse heminas puris sensim exclusisse. hemina, decem uncias æquat, existimare quis possit, totum nutraceutum eò abripi. In empyemate, vel totus thorax repletur purulentia: vel dextra aut sinistra solum pars thoracis repletur: non enim datur excursus materiæ à dextris ad sinistras partes: quod membranæ diaphragmōdis ossi pectoris annexæ, id non admittant: parietis enim interiecti vice funguntur, ac thoracis spacium mediast. non intercepto diuidunt. Præterea hæc materia vel purum pus est, vel purulentia. Est sanè vehemens affectus hic, mali moris, cū morā putrefcat foedæ materiæ, est non intercalaris, sed perennat: contagione scedū, quod miasmata foetida effundant ægri cū animam reddunt: non ex sympathia, sed idio-pathia in vitio est. Sed est ne hoc vitium acutum? author enim est Galenus ab Empyemate homines subito rapi: & causam adnectit, asseritque id fieri tum ob vim affectus, tum ob vitium labefactionem. Si ob vim affectus, igitur ratione sui, imò peracutum malum hoc est, cum celeritate hominem enecat. Galenus alibi tamen asserit hunc affectū esse diuturnum, cum in diem vsque quadragesimum excurrat. Responso est, aliud esse pñter, ut loquitur Hippocra-

Pu-  
m-  
rã vnde.

Pu-  
m-  
rã vnde.  
1. Prog.  
vltima.  
2. Aph.  
47. & 48.  
Simplic.

g. Epid.

7. Aph.  
30. & 31.

7. Aph. 8

4. Me-  
thod.

Dulcine.  
4. Let.  
aff. 7.

7. Aph.

## CAPVT III.

## DE EMPYEMATE.

QVORVM Pleuritis neque dicta, ne-  
que fomentis, aut sanguinis detra-  
ctione, nec alio prorupta quicui, caruit-  
que libera & liberali anacatharsi, in vo-  
micam abire solet: hoc est, eius phlegmo-  
ne pus suscipit. quæ vomica cum rum-  
pitur, pus effundit inter thoracem ac pulmo-  
nes; diciturque tuncea affectio Empyema.  
Hippocrates Empyema nominare confue-  
uit omne partium omnium phyma quod  
in pus alteratum est. nos vero *impuus* seu  
purulentos vocamus eos, quibus collectum  
pus stabulatur inter pulmones & thora-  
cem. Apud Hippocratem etiam in viraque  
significatione legitur. Quare empyema  
hoc differt ab empyo vel purulento, quod  
empyematis nomen, omni cuiusque partis  
suppurato apponatur; empyi vero non di-  
cuntur nisi hi, quibus pus naia: capacitate  
thoracis. Tales empyicos vocat Vomico-  
sos Aurelianus. Est autem empyema, de  
quo nos agimus, oppressio spaij pectoris  
& pulmonis à purulenta materia. Dixi-  
mus esse oppressionem, nam morbus hic  
est mala conformatio, quæ spaciū id quod  
est inter pectus & pulmones, oppletur à  
purulenta materia: nam inde actio thora-  
cis interceptitur & pulmonis; nec enim alas  
suas pulmo expandere potest, nec thorax  
suum in conuiuendo officium facere; unde  
ægrè respirant ægri. Si verò ita materia  
congeratur in viscere, non autem in spacio  
thoracis, vt inde in molem turgescat thora-  
x, censebimus illum morbum ad magni-  
tudinem referri debere. Sed in cuncto em-  
pyemate oppressio patentis prius spaij ad-  
est; sed non vbiq; se consociat tumor,  
nec enim semper tantæ copiæ circumfuit  
materiæ thorax, vt in illum tumorem sur-  
gat thorax, quo actio eius lædatur. Sed à  
quibus rebus fit hæc spaij pectoris oppres-  
sio? Non sanè hic aqua hoc facit, quæ in  
pectoris hydropse hoc vitiū inferre solebat;  
sed est materia purulenta. Dico non pus,  
cū interdum ab emula puri materia hoc  
vitiū sobolescat: talis est pituita & sangui-  
putrescens. Omnia enim perspirata caren-  
tia ac alieno in loco vehementius incala-  
scentia putrescunt; sed non idem semper

7. Aph.  
44.Defini-  
tio, & eius  
explica-  
tio.12. Affe-  
ctio. 12.CAV-  
SAR.Puris &  
purulen-  
ta mate-  
ria discri-  
men.

modus.

A. loc.  
aff. 31.Fol. 106.  
Medu-  
stini in-  
flamma-  
tio.

viam spiritus interceptant, vehementer-  
que spirandi difficultatem adferant. Vnde  
quidam Medici errore seducti, venâ cubiti  
incisâ, multoque sanguine euacuato, mor-  
tis causam ægris præbuerunt. Quare dili-  
genter interroga de victus ratione: ac pul-  
sus & calorem tentâ tactu. Supini decum-  
bunt: intercepia laqueo videtur illis respi-  
ratio, vt rix loquantur: non sitiunt. Cly-  
stimo leniente eluatur aluus, dein ex cala-  
mintha & centaurea, illinantur oleo ruscæ  
& anethi. Bibant hydromel pulegiatum,  
in quo caricæ coxere. Ornbasius auctor est,  
quum diuturnis doloribus thorax citra fe-  
brem detinetur, vt palmaræ piogues cum  
sœnugræco decoquantur, succus exprima-  
tur: cui mel copiosum admiscébimus: co-  
quantur iterum ad mellis crassitiem: eo  
multum ante cibos vtatur. Vires erigantur  
instituantibus, quibus immaduit pimpin-  
ella, calendula, borago, violæ, cum pau-  
co hyssopo. Fit sacculus ex fursuribus, le-  
ui ebullitione ex aqua admouetur fortiter  
expressus. Vel ex spongiâ fiat sorus imbu-  
tâ decoctio radicum alihæ, seminis lini,  
florum chamæmeli & meliloti. Coque pa-  
riariam ex oleo, in patella, leuiter: admo-  
ue. Si materia fuerit humida, fiant sac-  
culi ex milio, fursure, sale. Vinum rhodi-  
tes commendat author Geoponicus. Si  
INFLAMMATA fuerit membrana Media-  
stina, quæ nectitur ossi sterni: seca bis ve-  
nam vel ter, nam repetita sectio effundit  
prauum sanguinem; & illine oleo violato.  
bibat libram aquæ cichorei frigidam à  
vena secta. Illine frigido actu oleo, & inde  
cum aqua endiuia fiat epithema: vel ex fa-  
rina hordei & his fiat cataplasma. Hyeme  
tepidè admoue hæc: & tandem adde oleū  
chamæmeli, sine aqua. & addo farinam  
sœnugræci, cum croco tandem. Sed, ni  
venæ sectio iuuerit, ferè moriuntur. Fiat  
decoctio ex violis, hordeo, endiuia, capil-  
laribus herbis, passulis, cum sirupo violato  
& endiuiz, deliquiritia, de farsata. tepidè  
deniur. Costæ purgentur Rhabbarbo  
& manna. Sola vtatur prisana tepida. Bi-  
bat aquam saccharatam. Post septimum  
diem vtetur iure pulli & ovo. Aluus clyste-  
re mollescat antequam detur cibus sem-  
per: ne aliqui fiat spirandi difficultas.

Putum  
vnde.

modus. Discriminatur itaque materia purulenta à vero pure. In optimo pure fit media putredo, à calore extraneo resistente coctioni. Puris enim confectio ab utroque fit calore, nativo & eo qui est præter naturam, vel potius, fit coctio secundum naturam, sed rei quæ præter naturam est. Putum merumque puri fit à materia nutritia, hoc est, sanguinea, siue ea biliosa, pituitosa vel melancholica fuerit. Hæc verò nutritia materia nec vadequaque bona est, nec plane corrupta, sed semimala, attamen pepasmi capax: quia bonitas superat in ea materia, & calor nativus vincit eum qui est præter naturam. Si enim pepasmi expertus illa esset, sanè natura hanc non evinceret, illaque membro, ubi citius focus est, perniciem inferret, & gigneretur pus scetidum, nigricans, scetidum. Pus verò quod non merum est, venit à materia excrementitia. Ut qui ex diuturno morbo partium spirabilem fatigati, tandem pus spūit. cuiusmodi sunt qui ex perenni prælapso catarrhi, aut ex succorū in thorace synathrisimo, vel ex succorū crudiorum latebibus hærentium copia, ac iam putrescentium, illū iam incipiunt expectorare, quorum maxima pars in Phiphisin abit. Tale quid evenit uxori Hippia, quæ per tertionium tussiterat, deinde in empyema venit, mox hydropica euasit: videitur tamen conualuisse mensibus euocatis. Quare pus interdum ex pulmōibus expectoratur, nec tamen propterea pulmōes in corruptelæ suspicionem venire debent. Nam scribit Galenus, pituitam ex capite pectori illatam puri similem reddi. Est enim hæc purulenta materia, non autem merum pus, nam est ex materia excrementitia: cum merum pus, ex nutritia materia fobolescat. Ita sanguine in thorace labente ex capite, & ex catarrhis inde manantibus, quin, authoribus Paulo & Actio, seroso falsoque ex humore à toto corpore in cavitate thoracis exussio, materia hæc purulenta ibi gigni potest: vel ex abdomine, vel in hydropse ex suppressis mensibus, vel ex corde in thoracem eructatur. Verum empyema quod merum pus habet, ortum ducit à pleuritide, cuius materia non benè expectorata fuit. Nam phlegmone non facit abscessum, nisi in pus versa: nā incunite phlegmone spargitur materia, quæ postea in sinum se colligit, ac vom-

Purum  
merum.  
1. Pro-  
vltimo.  
2. Aph.  
47. & 5.  
Samplic.

5. Epid.

7. Aph.  
30. & 31.

7. Aph. 3

8. 4. Me-  
thod.

cam facit: quā rupta, effunditur materia in cavitatem thoracis. Quin verum etiam pus effundi potest ex inflammato pulmōe, quod Polycratæ uxori evenit. quin ab angina: hoc est, post affectus inflammationis: nam horum materia est nutritia. Observatum fuit longa die materiam in pulmōe interdū coaceruari cystique obduci, ita ut ovi magnitudine interdū extullatur. Hoc innuisse videtur Aretæus, ubi ait, Humor aliās iners imbecillusque inhæret, aliās acis & mordax, & ad mortem usque putrefaciens. Nam dixerat empyema oriri à plaga, cruditate, frigore, diuturna tussi, pleuritide, vomitū pulmōis, catarrho diuturno, & acuti morbi in id decubitu. Sanè ex remotissimis etiam partibus, fit occulta in pectus puris translatio. Sed, inquit Aretæus, Magnum profectū miraculum est quomodo id fiat, ut ab exili tenuisque membrana nihil crassitudinis habente, tanta copia puris effundatur. Causa est inflammatio ex sanguinis multitudine, ob quam membrana crassescit. Annotavit Galenus, quosdam octo heminas puris sensim exclusisse. hemina, decem uncias æquat, existimare quis possit, totum nutrimentum eo abripi. In empyemate, vel totus thorax repletur purulentia: vel dextra aut sinistra solum pars thoracis repletur: non enim datur excursio materię à dextris ad sinistras partes: quod membranz diaphragmōdes ossi pectoris annexæ, id non admittant: patiens enim interiecti vice funguntur, ac thoracis spacium mediastini intercepto diuidunt. Præterea hæc materia vel putum pus est, vel purulenta. Est sanè vehemens affectus hic, mali moris, cum morā putrescat scædē materia: est non intercalaris, sed perennat: contagione scædū, quod miasmata fecunda effundant ægri cum animam reddunt: non ex sympathia, sed idio- pathia in vitio est. Sed est ne hoc vitium acutum? author enim est Galenus ab Empyemate homines subito rapi: & causam adnectit, asseritque id fieri tum ob vim affectus, tum ob virium labefactionem. Si ob vim affectus, igitur ratione sui, imò peracutum malum hoc est, cum celeritè hominem enecet. Galenus alibi tamen asserit hunc affectū esse diuturnum, cum in diem usque quadragessimū excurrat. Respōsio est, aliud esse pectus, ut loquitur Hippocra-

7. Epid.

Differtia.

Definitio.  
4. Let.  
aff. 7.

7. Aph.

*Suppuratio  
in  
caput.*

tes, hoc est, expurationem vel suppurationis ruptionem, aliud esse suppuratum, hoc est puris in membrana collectionem *ῥῆγες*, hoc est ruptio, periculi plena est, si fuerit magna, nam illico inieritum enecat, reclusis vasibus arteriosis, quæ à pure clauderantur.

*6. Aph.  
27.*

*4. sec. 7.*

De hoc malo loquitur Galenus, diu proferat illam sententiam, in libro De locis affectis: nam collineat non ad suppurati magnitudinem: sed ad *ῥῆγες*. Sed si sermo fuerit de collectione materiae morbificæ purulenta, hæc materia colligitur ac deinceps poterit in quadragessimâ vsque diem, qui ad diuturnitatem perinet. Jam ad notas venio.

*signa.*

Empyematis notitia comparatur cum *ῥῆγες* peripneumoniæ: videlicet ex modica aut nulla expurgatione puri, tum ex insecta Medici curatione intra decimū quartum diem: deinde cum *ῥῆγες* ex *ῥῆγες* ex rigore qui ante non fuerat, & ex gravitate loco doloris. Sic copia & abundantia puris innotescit ex vacuitate strepitus, à confluence: & fortis dyspnœa. Præterea empyemata rigare & novâ febre oborta denunciantur, quoniam puris acrimonia vellicantur & eroduntur partes, quæ sunt vicinæ atque communes obfœcæ. & pondus adest puris quæ ante dolebat. Empyematis mox affuturū, hoc est, *ῥῆγες* futuram esse, tria hæc sunt signa, febris horrida, hoc est, crebra horribus, quorum causa est in parte primū omnium horrescere, pus scilicet vomica erodens: cibi fastidium quem ne quidem in conspectū admittunt, à venenata suppurati aura stomachum inficente & resolute: ephidrosis denique, hoc est, exudans sudatiuncula indidem commota, per exolutiones frequentes, quas ab illo pati tetra vapore necesse est. Empyematis itaque inchoati signa sunt, febris exacerbata, horror, & dolor prægrandis. Perfecti autem, nondum tamen rupti, febris remissio atque doloris, sed horror increscens, & gravitas pro cruciatu sicut doloris. Hic rigor cietur non *ῥῆγες* *ῥῆγες*, hoc est, à cachymia è vasis expressa: sed à pure in vomica concepto. Sed nascentis puris acrimonia mordens vicina corpora, eodem modo ciet horrorem, quo acria medicamina. Gravitas autem dolori acuto succedanea, signum est syllogisticū mutatæ phlegmones in suppuratum: quoniam suppurati non tanta est sensus, quàm phlegmo-

*Puris co  
prothra  
se concepti  
vi nasci  
tur.*

*Empyematis  
vel sunt  
tum cele  
riter &  
velimen  
ter per  
horrescunt.  
Empyematis  
inchoati &  
perfecti  
signa.*

*Horror  
vnde.*

*Gravitas  
vnde.*

nes ciuæ. Sed gravitas ibi manet: quoniam morbificus humor, velut in ergastulo quodam conclusus, foras non exit. Cita autem puris confectio, citam quoque habere rupturam, nisi aliò cursum insecutur, & per anacatharsin vacuetur. Ac iò gravitatis & febris levatio est: quod signum in primis narrat Hippocrates puris in thoracē effusi. *Μὴ τὸν ῥῆγες δεξιὴν ὕψις εἶται. ὅτι ἐκ τῆς πνεύματος οὐκ ἐστὶν ἐν τῇ στήθι. καὶ τὸ πνεύμα ἐκ τῆς πνεύματος. ὅτι ἡ ἰσχυρὸς τῆς πνεύματος.* Hoc est, rupta vomica tanus sibi videtur esse ægrotus, quod ex loci angustia, pus abiit in amplitudinem: ac spiritus quem spiramus, in pulmone sedem inuenit. Est igitur signum syllogisticum puris in thoracē effusi, & ruptæ pulmonum vomicæ, fugax levatio gravitatis: Nam ea non multo post, longè percipitur gravior & molestior. Animadueritum est etiam pulmonum inflammationem in purulentiam mutari, scilicet in peripneumonia quæ habet suum dolorum cruciatu scapulae atque iuguli, pectorisquæ oppressionem, & meteorismum spiritus, calidam expirationem, febrem continuam cum anxietudine, quæ diebus criticis anacatharsin nullam habuit: sed eos cum delirio exegit ad decimum quartum vsque diem: eademque nec phlebotomiâ quieuit, nec pharmacîâ, nec dietâ, nec parotide, nec abfcessu crurali. Hæc, dico, signa sunt, quæ opinione faciunt phlegmones affectantem viam ad empyema, si ante fatalis ad mortem non fuerit, nec ægrum ante decimum quartū diem in exitum puriparât. Difficilis respiratio huic affectui ascenbitur: sed hoc signum est *ἄνυξις* antecedentis & consequentis. Est enim antecedens vomicæ iamiam rumpendæ: ita enim prodidit Hippocrates, qui ait, Accedere necesse est dolore, dyspnœam, & ptyelismum, ante puris eruptionem. Vbi Galenus super dyspnœa hæc scribit, Difficiliter toto morbi decursu spirant, maxime verò ubi dolor accesserit. Sed non est firmiter fixa difficilis hæc respiratio, sicut ea quæ rupturam consequitur. Sic autem fit. Rupta vomica, ægro sibi melius esse videtur: sed, inquit Hippocrates, labenibus inde diebus pectora pure implentur, indeque tussis & febris, atque adeo cæteri omnes dolores cruciatu ipsum magis fatigant. ac morbus ipse tum

*Ruptura  
signum.  
Lib. 1.  
cap. 1.*

*A pulmone purulentia signa. Vnde quæ ad phlegmonem videri Posuerat 7. libro Epid.*

*1. Lib. 1. cap. 6.*

maximè

maximè innotescit. Est igitur difficultas  
aucta spirandi signum *suppūctū* prægres-  
sæ ruperis, aut iam futuræ. Ac prægressæ  
quidem, si miter fixa & stabilis, quæ vires  
acquit cuncto futuro autem fugax & le-  
uiter pressa ad exiguum tempus. In hoc  
sanè malo est cita multum & præceps oc-  
cassio in medendo. Ergo ne occasio me-  
dendi præcipit ut in suppurato & expura-  
to, eius arripiendi opportunitatem adfert  
dierum circitorum obseruatio. Plurimæ,  
inquit Hippocrates, suppurationes rum-  
puntur (non autem omnes, quædam enim  
multò antè rumpuntur, vt quæ cum spūto  
bilioso expectorant purulentum die septi-  
mo, ferè moriuntur die decimoquarto)  
quarum scilicet primigenia phlegmone  
inoffenso cursu mutationem habuit hu-  
moris phlegmonici in empyema, non in  
gangrænâ: hæ, inquit, rumpuntur, &  
pus in thoracem, vomica rupta, effundunt:  
quod inde citò euacuari debet. aliæ qui-  
dem vicinũ diem spacio, inquit; hoc  
est, vigesimo die à facta consistenteque in-  
flammatione laterum aut pulmonum: hæc  
enim inflammatio in pus mutatur, nisi  
intra decimumquartum diem cœperit ex-  
purari. Non enim verisimile est vigesimo  
die rûpi, ex quo pleuriticus vel peripneu-  
monicus, in expectorati vacuitate grauius  
febricitauit inchoato pure, indeque cum  
perhorruit: moxque loco doloris grauitatē  
percepit pure cōfecto: quæ cuncta ferè eue-  
niant sub decimumquartum diem inflam-  
mationis pleuriticæ vel peripneumonice,  
si, cum eò ventũ est, expectoratum non ritè  
processerit. Sic enim viginti dièrũ numerus  
procedit ad trigisimum quartum totius  
historiæ. Atque ita pus in vomica hærendo  
lethale euaderet, ac conclamatum esset in  
omni empyemate. Quod falsum est. Quare  
vigisimum diem numerandũ putamus à  
primo die totius historiæ morbi, quo pri-  
mũ æger decubuit: eundemq. ipsum diē  
vigisimum, septimum esse vel nonum à  
quo febris exacerbata est cū horrore, inde-  
que percepta grauitas pro suo dolore:  
prout illa celerius, hoc est, vndecimo, aut  
serius, id est, decimoquarto exoritur. Ac si  
quis ab horrore nouos labores experiatur  
partium afflictarũ, in meteorismo spiratio-  
nis, in tussi & pyelismo, idque continenter  
& fortiter, vomice rruptionem habebit,

quæ ad longissimam esse potest, intra septimũ  
hororis diem: quibuldam enim: sic coe-  
lerius. Quò igitur celerius sit empyema, cò  
celerius quoque rumpitur. Nā celeritas in pu-  
re conficiendo posita est in calore humoris  
& partis obfessæ tarditas contriti: quò spe-  
ctat ægri vires, ætas, natura, regio, anni: æ-  
pur, itq. tempestas. Atqui celeritas aut tar-  
dus empyematis, celeritatem quoque ac tar-  
ditatem adfert rruptioni. Celestes quidem  
motus, celeres mutationes edunt. Aliæ verò  
suppurationes, inquit Hippocrates, rûpun-  
tur quadraginta dierum numero. hoc est,  
spacio dierum viginti septem ab horrisero  
empyemate, si exortũ fuerit decimoquar-  
to: vt exortũ solet cū intra illud tēpus li-  
bera nō sit expectoratio, aut nulla omnino  
cū sit. Sed quatuordecim dies, quibus in  
expectorati vacuitate sit empyema, nume-  
rādi sunt nō ab historia pleuritidis aut pe-  
ripneumonice adhuc mitis, sed ab incre-  
mento exacerbate: vt decimusquartus ab  
incremento, sit vigesimus ab historia totius  
morbi. nā ad eam legem examinandi sunt  
quatuordecim dies, quibus iudicatur om-  
nes morbi acuti. Nam vbi prima inuasiōe  
mitis per dies aliquot est morbus, cuius  
acumē dein explēdescit, ab eo acuminis die  
in eunda est cōputatio. ita decimusquartus  
dies, ab acumine cōputādo, fiet sæpe vige-  
simus, si *κατὰ ἀποσθον* addas priores dies,  
numeratūsq. ab ineunte morbo. Sic igitur  
empyema fiet vigesimo die, post quē exo-  
lescit vis acutorũ morborum. Itaq. factum  
empyema vigesimo, nō amplius naturā te-  
tinet morbi acuti, sed *ἐκ μὲν τῶν*, hoc  
est, ex degeneratione acutus. si enim me-  
taptosis peripneumonice in empyema. Cæ-  
terum vt morbi acuti duabus septimanis  
iudicatur infra vicesimum: sic tres vt mini-  
mũ exigunt septenarios supra vigesimũ,  
qui acuti sunt *ἐκ μὲν τῶν*. Atqui illi  
tres septenarii, quadragesimo absoluitur,  
quo empyema in thoracē effunditur, si to-  
tũ expectorato purgatũ non fuerit. Totum  
dico: nā, asserit Hippocrate, si quā celer-  
rimè phyma pulmonum coquatur, totum-  
que expectoretur, ipsaq. vomica exhauria-  
tur, inde salus. Siquid superflui reliquiarũ,  
aut si noua subinde fluxio cooritur in  
partem, afflicta, periculosum erit. Itaq. ex  
sententia Hippocratis, nō antè pus è vomica  
erupturum est, quā exorta fuerit noua

*Dies vñ  
numerum  
dies auctu-  
m.*

*Tempus  
rutionis  
aliud  
quā  
vulgi  
Medicorũ  
putat.*

quædam species doloris, tussis, dyspnœæ, cum pyelismo. ut si hæc omnia simul non fiant, neque appareant, empyematis rupturæ longius, & medici opinione ferius protrahitur. Non nulli etiam sexaginta dierum spacio suppurationes rumpuntur. nam à quadragesimo non est alia sperabilis crisis ante sexagesimum. Ergo suppurati omnis ratio in eadem tum ex humore morbifico, tum ex parte obfessa. quare motum morbi examina ex ægri etiam temperamento, ætate, anni tempore & tempestate, humoris contumacia. Ut ergo prævideas quando empyema sit erupturum, & eo eruptio præcipue remedia adhibeas quæ pus exire faciunt, ne cunctando fiat tabificum, hæc signa Hippocratica observa: Quibus empyicis (pure adhuc in vomica hæretæ, quod nequit expectorari, initio (suppurati confecti) dolor est fortis & contumax (distentia puris à copia membranæ, ac dum illa vellicatur) vnaque difficilis respiratio (parva & frequens, à distenta membrana) ac tussis, (ab ichore qui exudat ab empyemate) cum pyelismo (ab ichore exudante à membrana in pleuritide vel in peripneumonia) ad vigesimum diem (ex quo laboravit prægrandi pleuritide, aut peripneumonia) eoque celerius (ac decimum septimum: si empyema celerius factum sit) ruptionem expecta (non anacatharsin.) Quibus autem levior, serius pro ratione. (ubi ad vicenarios ac septenarios dies criticos attendendum.) Vbi itaque comparanda est empyematis notitia, tū in vomica tum in eruptione, acri iudicio expendenda est occasio temporis, qua motus & mutationis signa eduntur, ne ipsa medendi occasio præcipiatur, sed singulari iudicio arripiatur, quamvis illa sit præceptus & fugax. Notandum itaque illud tempus quo nova species doloris oboritur in puris pepasmo: cum enim illud oboritur, dolores ac febres grauius vrunt, quàm confectio: tenditur enim tunc maxime membrana ab interperie calida occupata, ac pars phlegmone obfessa, est sensus acerrimi. Vel, inquit Hippocrates, illud tempus obseruabile à quo primum grauitas molestissima obuenit (facta nimirum puris coctione, ac pure collecto in vno loco) aut quādo febris exacerbata primum fuit (à seruore sanguinis dum sit pus, nam dolores tunc sunt rebe-

mentes.) & situnc rigor inuasit, (etenim est hoc signum exordii empyematis inchoati atque confecti) accedere autem necesse est dolorem, dyspnœam, & pyelismum ante ruptionem. Quasi dicat, Vt occasionem arripias in puncto empyematis è vomica erupturi, nouissima conferre oportet cum primis. Ut si comperit tibi fuisse cum phlegmone in pus abiit, idque quàm cito aut serò & præuideis quādo euentura sit ruptio empyematis, eam prognosin confirmabunt dicta iam signa, quæ sunt præiugia empyematis iam iam è vomica erupturi. Hæc abundè prosequitur Hippocrates in fine libri secundi Prognosticon: quos libros nuper commentarij planos ac explicatos reddidimus: hos addeat, qui plura de his velit. Paucis hoc addo, Apostema iam venisse ad pepasum dignoscemus ex doloris mitigatione, & ex pondere in parte affecta, febrisque remissione. Itaque in primis distingue certis notis empyema quod sit, factum, & quod erumpere properat. Cum tumor in pus vertitur, nascitur febricula vehementior, inordinata, & sæpe cum rigore & torpore frigido, & iactatione corporis, tum loci fluor incendiosus, grauedo, tensio, & sæpe stimulans dolor & pulsus. Tum celer pulsus aique humilis, & sæpe sudor capitis & colli. Talia hæc eueniunt cum intra dies quatuordecim ab inuente pleuritide nō sedatur dolor. Dehinc perfecta purulentatione rigor ac tremor corporis, & febrium recedit inquietudo ac dolorum: verum loci occupati grauitas increfcit, sicca tussis. Cum iam abscessus erumpit horrescunt, ac febris exsplendescit maior, vires labascunt. Fidendum tamen si expectorata sint bona: nam mox febris mitescit ac recreabitur. Effusum, illic, pus fluctuatione se prodit, & expectorato. De tempore quo expectari ruptio debet, antequam quo febris, dolor, ac respiratio anxietas maiores, hoc citius ruptio eueniet. In expurato anima fiet ob pus. prouolutus subito in aduersum latus æger, fluctuationem sentiet in thorace puris. expectoratum si ore elidat in aquam puram, fundum petit: nam pus est: modo quassatione facile in partes abeat. alioqui pituita etiam sidit, at non quassu ita diuellitur. Breuiter repeto magni res momenti. Quod adhuc colligitur apostema, signum sui præbet grauitate

*Plurima  
talio signa  
referri Ca-  
lino Au-  
relianus,  
libri 5.  
Tardavi  
postremum  
cap. 2.*

gravitate thoracis (dolor remittitur pure facto,) tulli dolorifica ac inani, tenui febre ac ordinis experte: hæc maxime noctu affligit. Cum in procinctu iam ruptio est, gravius febricitant non sine horrore, anxie respirant. Ruptio autem abscessu, pus expectoratur, ac febricula hæcicæ tenentur dum pus expectoratum fuerit. squalent manus ac pedes ex fuliginum copia eò delasarum: ab iisdem rubent maxillæ: respiratio anxia redditur, ac tandem, acriore reddito pure, vellicantur illæ partes quæ purulentiam habent sensiles. coctio tandem frangitur, inquit Aretæus, & consumitur caro, mens delirat, ac rectus distenditur. Vbi empyema oboritur ab angina vel à peripneumonia, vtrumque tunc latus ab effluo pure ferè occupatur. In latus quod pus habet facilius est decubitus: nam alioqui in pulmones funditur. calet occupatum maxime latus. sudat thorax, sitis vrit. Si à catarrho initium duxerit empyema, vel ab hydropo vnde materia funditur in thoracis capacitatem, non verum pus expectorabunt: adenique febris vagæ: quæ tamen tandem ingruesset: & suprema thoracis pars hoc pus concipiet. Si ad inferiora viam pus affectat, inquit Aretæus, acutus dolor partes superiores (vbi erat abscessus) occupat. alius humida est, primum aquosa cum pituitosis deiciens, deinde cruenta quadam circumfluentia, rursusque carnosa, quum iam effractus abscessus est. Hæc pus sequitur aut per aluum, aut per urinæ vias elabens. Sed meliores excretiones sunt quæ per urinæ funduntur vias. Postquam natura ægri & mali nobis comperta fuerit, cogitabimus quid fudeat hoc malum agendum esse quò fugeatur. Quare tres ponimus curationis scopos; primus sit, ut sputum ad exclusionem paretur, ut, si crassius fuerit, attenuetur: si tenuius, incrassetur: nam expectoratum ut commodè excludatur, debet esse mediocre. Secundus sit, ut erumpat ex tumore. Terrius, ut ex corpore excludatur expectorando, vel urinam fundendo, vel per aluum ut secedat. Quare primo rudèbimus ut ex suppurato fiat expuratum, quod sit coquendo & rumpendo, deinde ut absterione mundum reddatur viciis, ac ut pars reintegretur. Suppurationem foelicitant ea quæ modeste calfaciunt ac humectant

cum quadam viscositate, ne gnauiter discurrant madores. Quare in hac curatione ordine ac certa serie opus est: primum, dico, (cùm natura ad suppurationem malum transferri eam promoueat suppurationem eà cautione, ne id quod crassum est relinquatur, exhaustis partibus tenuioribus in abscessu. Dein, ne ante pepasimum aperiat apostema. Id cùm erupit, erit abstergendum: & ne pus in tabernum vertat pulmones, erit excludendum, quod fit expectorato, urinâ, aluo. Id dum fit, cauendum ne viæ per quas fertur pus exedantur. Sin foras in latus viam affectat hæc materia, eò ducatur. Sed antequam curationem instituamus, ne id frustra fiat, diligenter perpendemus num eas Indicationes absolute liceat: interdum enim mali vis non admittit ut eas peragas. quare ad Prognosin iam venio, ut noscamus quid curabile, quid non redintegrabile sit huius mali. Plurimi sanè quibus ex interna phlegmone incidit empyema, lento tabescunt morbo ac moriuntur, cùm iam in tuto res eorum versari putabantur. Etenim à pepasmo dolores, febres, & phlegmones sedantur, verum vomica hæret, in qua sæpe malignè putrescit pus, vnde partium internarum corruptela, vel febricula tabida ex fuligine in cor delata, inde mors. Aut vomica rupta, sed tardius, iam prostratis viribus ac expectorationi imparibus, calamitatem adfert. Quare si suppuratum in expuratum non abeat circiter diem vigesimum, in angusto spes erit. Itaque hoc malum anticipem habet euentum salutis aut mortis. Si febris diu perseuerat, & si nihil expectoratur, in phibisim degenerat. Ægrum ad tabem tendere hinc scies: febris interdiu minus, noctu magis affligit: si sudat, nec allevatio consecraria illi veniat: si quæ inanis quædam tussendi fatigat cupiditas, nihilque magni momenti si expectorant. Materia enim acris & putrida stimulat pulmones ad tussidum: caui euadunt oculi, rubent maxillæ, summi digiti incallescunt, cibos non appetunt. Si, expuratum cùm factum est, pus non promptè excludatur, exulcerat pulmones, hinc illa tabes. Quæ iam consistente, & genæ liuescunt, exudat collum & frons, & carnes liquefcunt, & homines pingues pallefcunt. Vomica autem quæ est à peripneumonia,

*Transitus  
ad aluum  
vel ad  
urinam  
signa.*

*INDICA-  
TIONES  
curandi.*

*PRO-  
GNO-  
SIS.*

*Uti nos-  
tas mor-  
is, extabes-  
cit.*

rumpitur citius: & nisi hæc etiam citius perpurgetur, tabescunt ab ea prius suppurati. Iam verò tabidi facti, qui ex iniüs concepta phlegmone tales facti sunt, breui moriuntur: atque tanto brevius, quanto ex phlegmone ardentiore purulentiam cõceperit. Pulmo sanè facili putrescit propter humidam, mollemque substantiam qua præditus est. Cum autem empyema rumpitur, in strangulatus summo periculo versantur, si multum, subitanèque pus emanauit: nam id pro termino est arteriis: sin pedetentim emittatur, præclarè ad salutem id facit. Attamen celeriter expectorari debet, idque album, mitigatum, inodorum, læue, rotundum: aut alio deurbatum, tuium & salutare. Pallidum, biliosum, inæquale, prauum est: maximeque huiusmodi, atrum, & putridum: exedentia enim vlcera denunciat. Per vrinas etiã sciliciter iudicatur: nam vena azygos infert se interdum arteriæ aortæ tamulis, interdum cauæ venæ bifurcatæ, ad renes: interdum venæ adipalæ vi emulgentibus. Vidimus venam azygos in sinistram emulgentem inferi ad initium venæ cauæ. Arterius per secessum etiam sciliciter hac calamitate ægros defungi assent. Si tamen rationem consulas, aduacis naturæ negociũ dicas: non alias enim vias video quibus eõ eat quàm per cor & per iecur: an non cum cor feriet putida hæc cloaca syncopens: cum hepar attinget & intestinã, dysenteriam mordaci vi concitabit, ac vi hepatis frastu hydropem funestum inferet? sed nouit illa polydædalas vias nobis fortè incomperias. Quicumque ante quadragesimũ diem rectè à pure purgantur expectorando, vel vinam purulentam fundendo, vel ex aluo profundendo, liberantur. Si virtus fuerit valida, nec adsit lipothymia, pus crudum cum non prauo odore, curari poterit: nam abest febris errans, & catarrho nata: nec hecica fatigat. Cum enim foetoris expers est pus, mundum vlcus esse testatur. Præterea, si excretionem benè toleret, febreque vacet, rectè coquat, color si decens sit, cibumque si petat, facileque si expectoret viribus firmis, validusque feratur pulsus, euadet. At si febris superuenerit, cunctaque in deterius flectantur, calamitosam. Ossis autem sterni lentè abscedit empyema ob frigus partis. Sed tamen obser-

uauit, id plerumque funestum esse, ob expectorandi difficultatem. Lien verò, iecur, pulmo, & diaphragma celerius quidem pus ducunt, sed ob officij necessitatem, lethalia sunt hæc eorum vicia. Vi breuiter dicam, Empyematis materia vel subitò nimia copiã suffocat, vel in tabem vertitur ab ea pulmo, vel expectoratur, aut emingitur, vel per sedem excluditur, vel traducitur foras in pectoris musculos. Qui plura præfagia querit, accedat Libri secundi Prognosticon Aphorismum quadragesimum octauum, & sequentes distinctionis nostræ: quorum sententiam breuibus commentariolis aperuimus. Iam ad Curatorem venio. A phlebotomiã hic pax sit: etenim non sanguis sed pus euacuari debet, propereque corpus languet: nam cordi vicinus locus sordatus est purulentia quæ bellum cordi indixit. Quare nec ratione reuulsiois, deriuatiois, aut euacuationis, vilis esse potest phlebotomia. Summæ enim Indicationes curandi hic sunt, vt materia nondum expurata ad pepsimum promoueat, deinde vt pus erumpat, tertio vt pus excludatur. Si forsan sanguinis copia in vitio fuerit, in ferriis praeparatis, vice phlebotomiæ, cucurbitas imponemus. Sed vbi pus thoracis in spacio fluctuat, audebant proavi nostri pectus aperire: quod casus rem hanc docuerit. Refert Valerius Maximus, & Plinius, Diuinæ fortunæ vulnus Pheræ Iasoni à quodam, exitij eius cupido, illatum fuisse. Nam cum inter insidias gladio eum percussisset, vomitum, quæ à nullo Medicorum sanari poterat, ita rupit vt hominem pestifero malo liberaret. Quo euenit edocui Medici, cum vix decimum ægrum à concepto empyemate vltro euadere animaduertissent, ad thoracis sectionem ac eius vltionem se conuerterunt. Verum hic nihil fiat temerè: Si natura nec per abscessum, nec per effusionem quicquam molitur, sique nulla alia ad salutem via, aperitur: sed sint vires integræ. Quare optimum factu fuerit, ne medendi subripiatur occasio, ad pharmacam fortiter expectorantia venire illico. Verum si triginta elapsis diebus plurima adhuc materia in pectore perennet, ad id vt nulla spes sit eam excludi posse decem sequentibus diebus, nõ expectandus erit dies quadragesimus, sed illico pertundatur thorax.

Coniis.

folio 23. B.

CYRA-  
TIO.  
Phlebotomia.Chirurgia.  
21a.

Taracensis.

Valer. 1.  
lib. 6.  
Plin. 7.  
lib. 50.6. Aph.  
27.

Aretius.

Obfer-  
14.



rax. Quod si iā quadragesimus dies elapsus fuerit, frustra secabis. Et hæc molitio agredienda erit ea prædictione, nimirū malū hoc iotā suā naturā calamitosum esse, solamq. hanc viā patere ad salutē, dubiā tamen eā esse. Quare præstaret hac de re primū sermonē iniici ab ipso ægro vel ab eius amicis. Admonet Oribasius, aperiendū esse pectus virtute validā, crudo humore, antequam illū putrescat, modō ille morbus nō fuerit hæreditarius, nec sæpe laborauerit æger ex empyemate. Non tamē illico ab expuratione aperiendū latus, sed ab illa rutione differendam esse sectionē dicit Hippocrates in Coacis. In decimum quintum diem, quō iterum misceat pepasmo: nā ab effusione crassescit & refrigeratur; illicoq. seceatur à decimo quinto die, ne putrescat ac vires atterat. Sectio non fiat vbi cartilaginee sunt, nā ibi musculus triangularis tegit interna illa pectoris. nec etiā propē ad spinā fiat sectio, nec ad diaphragma. Aperiatur spaciū inter tertiam & quartā costā Legitimā, infernē sursum numerādō. fiat incisio oblique, superne dorsum versus: nam interni intercostales musculi eō vertūt suas fibras. spaciū etiā inter quartā & quintā costā eommodū videtur, nam illud carne vacat plurimā, Palmæ latitudine ab i. spina dorsī: nam diaphragma parte pectoris postica lechuius est quā anticā. Scindatur foramen mediocre, quō cōmodē clabī pus possit. nec sit nimis patulū, ne spiritus vitalis effundatur: tenui id fiat nouacula: & spōia imponatur, ne status exeat. Primō semihus effundatur, post diē cyathus. vt rī: effundat pus, tolliat, ægroque lateri incumbat. Vt faciliē egrediatur pus, infundatur à chirurgo mullā, ita cōmodē effluet. r. sectione molienda caue ne ferias inferas costæ partes, nā ibi in sculpus est sinus teretis & neruo: sed, si costa secanda, ad superiores partes eam seca. Cautio etiā adit: secandus æger validē febricitet, vel iam chexiā teneatur. Pertusum locū cura oleo facto ad biduū. Tertiō die munda & coe mellis sextā partem cum aqua, ad terē partis cōsumptionem, iniice, ac voluat æger in aduersum latus: effundatur, reperitur dum clarum redeat, si vires id ferant. grauis putredo adit, fiat decoctio ex yrrha, lupinis, & melle. Cū rā eodē nihil eris profert injectio, strepta sensim tenuē-

tur, ac claudatur vlcus. Illine strepta melle solato, terebinthina & farina hordei: adde myrrham, sarcocollam si magis absgerendum: si maturandum, melle vitellum cum pauca scenogræci farina. Deinde fiat scarcocosis mastice, thure, mumia cum terebinthina. Tandem foue decoctio ex vino rubro balauftiis, nucē cupressi, turia. Sicca partes quæ expuūt excrementa in hanc partem, ne fiat fistula. Perulustra si lubet obseruationes quas doctissimus ac diligentissimus Schenckius collegit libro Obseruationū Medicinaliū secundo. Pauli Æginetæ sententia aliō abire videtur. efficacissimū, inquit, remediū in vitione inuentū est. Verūm, dicit, qui febrem vel vredine pertuderūt latus, aut statim moriem autulere, vitali spiritu acuatim vnā cum pure euocato, aut fistulas incurabiles efficiūt. Sententia itaque Pauli est, vt inurantur pectori & dorso cauteria non penetrantia, sed in cure solū. Illisq. indendas dicit radices aristolochiæ longæ oleo imbutas. Vnum, dicit, cauterium inuratur inter clauicularum cōmissurā, sursum tracta cure, ne ferias scilicet subiecta vasa: duo verō parua paululum ad mentū à soporariis arteriis abeundo: duo sub mammis grandiora aliquantū, inter quartam & tertiam costā: alia duo inter quartam & sextam paululum nurantia retrorsum: & aliud in medium pectus, & aliud supra os ventriculi. Tria autem à tergo, vnū in mediū dorsum, & ab vtraq. spinæ parte duo profundiora: sed ne pertundant pectus: quod Arculanus etiā prohibuit. Videtur sententia Pauli esse, Quia naturæ beneficio pus foras interdū extrahitur, atque in externos musculos abcessus erūpit, eō etiā prolestandā esse hanc materiā. Nam plerumq. vsti aut secti moriuntur, vel à fistula calamitosa enecantur tandem. Poterimus hanc molitionem inchoare à vesicatoriis: deinde cauterijs potentialibus incumbere, vt fecit Aetius: nam, auctore Galeno, omnium Empyricorum facultas languida est. Quare si ubi mens sit aperiendi, à cauterio frustra adhibito id fiat. Quæ autem cauteria in sublimibus partibus, vt sub mento, sub mammis, sub scapulis inurantur, auersionis causa maximē faciunt ad salutem, nam deriuant succos à capite labentes ad thoracem. Verū materia morbifica exhauriuit à loco infimo

Obseruationes 251.

Pauli sententia de pertusione lateris.

24. capiti de arthritide & aneurysmo. 4. loc. eff. 8.

vbi.

ubi strepitus sentitur: tibi maxime vrendum ac secandum. Noli temere perturbare pectus, nisi tumor aut mutata qualitas foris appareat, argumentum præsentis puris. Tunc cautius admove, non tamen ultra costas peruentia, sed propè ad costas accedatur, lataque potius quam alta fiat plaga, ducta ad costarum excursum. Locus vilis fecetur phlebotomo bis, ter, dum locum deprehenderis puris; id enim absque dolore fiet. Cunctatio nocet in tali tumore: nam melius est ne intro se convertat apostema, & expuratum faciat. Ut iam tandem ad Pharmaca veniamus, videndum quò natura & materia viam afficiet. Si ad aluum inclinat, propina mel rosatum laxativum, cum manna, ex decocto seminis enici. Vel propina vnciam cassiæ ex decocto pectorali. Cautio adsit, ne dum huc repit materia, abradantur ab eius incurfu intestina. Sint igitur in promptu cne-mata ex lacte, decocto hordei, surfurum, malurarum, seminis psyllij, seu ouillo. Leuiter itaque materia purgetur: & si crassior materia puris fuerit, accipiat hieram simplicem cum agarico trochiscato: vel da diatubith cum Rhabbaro. Quod si materia effuderit se per vesicam, quia materia puris crassior est, extenuetur succo marrubij cocti cum melle. Fiat etiam decoctum ex asparagis, alkekengi, cicerum, pimpinellæ, betonicæ, fœniculi, petroselinij, capillorum veneris, seminum melonum, radicum pentaphylli. Coquatur aliquid seminis vriticæ in aqua hordei, adde mel. Accipe quinque radicum aperitiuarum maceratarum in vino albo, glycyrrhizæ, singulorum vnciam: seminum quatuor frigidiorum maiorum, cuiusque semunciam: adianthi recentis manipulum: cicerum rubrorum seminipulum: coque ad dimidias: aromatizetur drachmis duabus ieros siccæ, & dulcoretur saccharo. Urinalia remedia potenter iuuare solent: nam catarrhus is qui ad pulmones illabitur ibique putrescit, non solum ducit originem à capite, verum interdum excluditur à toto ambitu venarum in partem imbellem: huic itaque propiè remedio est sudor & urina.quare decoctum radicum Chinæ cum scabiosa & aliis pectori vrinæque dicatis rebus proderit. Corpus, ne quid affluat ad pectus, ut mense purgetur cassiæ vncia,

cum agarici recenter trochiscati scriptulis duobus. Si nondum expuratum factum est, ut suppuratum rumpatur, à leuioribus auspiciandum erit, ne exhaustis tenuibus, id quod crassum est remaneat, nè ante pe-pasum fiat rupio, quod calamitosum. Res calidæ, leptomeræ rumpunt suppura-tum, ut situpus de prassio, & de hyssopo: Auicenna in hanc spem præbet theriacam & mithridatum: nam vnâ calorem natu- ralem firmant. Fiat fons ex malua, althæa, meliloto, chamæmelino, semine fœnigræci, lini, & cydoniorum malorum cum spon-gia. Mox illine oleo chamæmelino & lili-no, cum adipibus, iunge mucagines lili-nis lini, fœnigræci, althææ: adde ceræ quod satis sit ut fiat vnguentum molle. Vel, Excipitur diachylon pinguedine gallinæ & oleo chamæmelino & lili-no. Aut folia caulium coque cum butyro: postea misce crocum, farinamque bordei, fiat empla-strum. Accipe fermenti tritici vncias tres: petriâ excipe, ac in libris octo aquæ dimitte: abductâ petiâ, adde aquæ illi mellis li-bram: bulliant ad consumptionem tertie partis: cola. Sæpè bibat ex hac aqua: & pulcra etiam ex hac fiat cum ficibus. Lacti etiam addat mel, & comedat. & ficus comedat. In secunda mensa pineis & amygdalis amaris & dulcibus vtiatur. Semper tamen materia coquatur, quo felix fiat expuratum. Bibat decoctum ficium, da-ctylorum, passularum, seminis fœnigræci, seminis althææ, radicum maloræ. Si cras-sior sit materia, adde radices liij: si calor vrit, adde hordeum & violas, iunge sac-charum. Fiat linctus ex semine maluzæ, & lini, cum sirupo violato: misce cum deco-cto præscripto, teneat in ore ac deglutiat. Cuncta semper propinentur calidè. Cunis quidam volunt ægrum. Si ad vicissimum diem non rumpitur, plerumque moriun-tur. Sin rumpatur, ac pus bonum effun-datur cum febris remissione, plerumque conualescunt. Prodest hæc potio, quæ fit ex glycyrrhiza, iuiobis, ficibus, passulis, dactylis, semine althææ, adianto recenti, scabiosa, hyssopo, hordeo: dulcoretur cum saccharo penidiato: & aromatizetur drach-mâ ieros: & duabus drachmis cinnamo-mi. Ruptum apostema expectoratio maxi-mè excludi solet. Sed dices, quo quaso modo expectorabitur materia illa quæ flu-

Expecta-  
tione.

Dulcium.

Quat

Atque inter thoracem & pulmonem? Respō-  
demus, rursi. nam ea comprimit alas pul-  
monis adducto vehementer thorace. Cum  
vero asperæ arteriæ fines magis in periphe-  
ria pulmonum pateant, quàm læues arte-  
riæ & venæ, ac multò ampliora habeant ora,  
quæ nec ita compressa concidunt, sunt  
enim cartilagineæ, in asperas arterias com-  
migrat, & expectoratur. Vtatur hydrome-  
le, oxymelite, sirupo de liquiritia: & tan-  
tè infunde hos sirupos decocto ireos. Qui-  
dam probant looch de caulibus, & looch  
le scilla. Ego, summi Dei beneficio, curavi  
uosdam, de quibus conelamatum erat,  
oc succo. Accipio ruberrima recentis bras-  
icæ folia, iubeo confindi, ac ollæ indi, co-  
que in balneo obturato vase. Liquor is  
ræbetur cū saccharo manè & vesperi. Sed  
illè corrumpitur hic succus, recenti sæpè  
pus est. Vbi pus externi cœpit, etià dari  
oterit decoctum hyssopi, ireos, & glycy-  
rizzæ, ex aqua mulsâ in qua decoxit pras-  
um & rulsilago, vel hypericum, aut capil-  
res herbæ, addimus, vbi leuita materia,  
liqid nicotianæ. Vel lingat looch de scil-  
cum looch de pulmone vulpis. Tandem  
i Auicenna deuenimus ad Diasulphur,  
medium enim id est potentissimum. su-  
et cū vitello oui. Et bis in septimanâ su-  
at terebinthinam, nucis paræ copîâ.  
am omne studium adhibebimus vt tota  
arteria expectoretur intra dies quadragin-  
. Quare si materia fuerit crassior, exte-  
abitur succo marrubij cocti cum melle:  
aqua mulsâ cum semine anisi. Da sulfu-  
ignem non experti drachmâ: &, vt fue-  
febris, misce frigida: quale est sirupus  
ilatus, de iuiubis, saccharini crystalli si-  
rus. vel superbibat lac amygdalinum, &  
ulsionem seminum melonum. Conso-  
atio fiat lacte. Da nucis ponticæ quan-  
tatem antidoti Panacæ descriptæ à Ni-  
ao Myrpeso; est præcellens id remediū.  
perofa hæc compositio nō placet, vta-  
antidoto Philoxenio, ab eodem descri-  
. Scribonius hoc commendat: Seminis  
nasturtij, vriticæ, radicum ireos Illyri-  
æqua pondera misce, & cum melle de-  
mato frequenter exhibe. Galenus disse-  
tia materiam & vias liberantia præscri-  
& dum phlegmone adest, mediocria,  
visanæ cremorem & mulsam. Cum  
mitescit, dabimus valentiora, vt se-

men vriticæ cum mulsâ, origanum, hyssopum,  
calamintham, pulegiū, radices ireos,  
oxymel ex marrubio. Ex intervalis detur  
theriaca, & mithridatium, & antidotus Ef-  
dræ. Potet bolum Armeniæ. Vbi in intesti-  
na repit pus, cum sirupo iofato miscebis  
drachmam masticis, bibat cum aqua en-  
diuiz: ita non inflammabuntur intestina.

Cura ad sit vt tandem venias ad farcosin, *Catida.*

ita tamen vt interdum repetas abstergen-  
tia: quin hac nonnunquam conficienda  
erunt. Lac commendatur, & aqua destil-  
lata ex cancris & hordeo; & saccharum ro-  
satum cum bolo Armeniæ. Præclarè ad sa-  
lutem facit si ab expuratio ilico vtatur aqua  
hordei cum rubro saccharo, vel melicraio.  
Accipe mellis semilibram: sacchari libi-  
a: aquæ libras quattuor: coque despuman-  
do, dum tertia pars exhauiatur: aceto ad  
saporem temperetur in fine decoctionis as-  
fuso: coque puro igne. accipiat huius vn-  
cias duas, cum aquæ scabiosæ, lilij, hyssopi,  
cuiusque vnciâ: bibat id in aurora. Post bi-  
nas horas poterit calidè sumere vncias  
quattuor aquæ hordei, ad semilibram vs-  
que. Quin tale decoctum præclarè etiam  
præscribitur nonnunquam. Accipe capil-  
lorum veneris, hyssopi, calaminthæ, prassij,  
cuiusque manipulum: sicum pinguium  
vncias tres: passularum sescunciam: liquiri-  
tiz vnciam: radicem apij & feniculi,  
drachmas quinque: pinearū vncias duas:  
seminis fenugraci semunciam: fiat deco-  
ctio. accipiat vncias quinque cum melle.  
Interdum adice hyssopum, radices ireos,  
semen vriticæ, dactylos. Detur rusticis  
drachma picis liquidæ cum melle. Enula  
campana cum semine vriticæ & pincis, ad-  
de iridem, myrrhâ, crocū, pulmonem vul-  
pis, cum saccharo crystallino. Quin ex his  
iâ dictis puluis fieri poterit, cuius cochlea-  
rium sumant cū sirupo, vel potu, aut cum  
succo caulium. Bibat manè vncias sex ca-  
prilli lactis calidi, cum saccharo. Varijs in  
hoc malo remedijs pugnari debet: est enim  
periculi plenum ac præceps: quæ res me  
cogit vt selectâ quandam copîâ remedio-  
rum proferam. Dabis interdum melicra-  
tum in quo coxit pulegium, hyssopum &  
thymus, vel ruia viridis, & prassium, cum  
pulvere ireos, & glycyrrhiza. Optimum  
est hydromel cum iride & plurima glycy-  
rrhiza. Eclegma fiat ex lini semine siccio, cū  
h h nucis

nucleis pini & melle. Tandem reparatis viribus, terebinthina vitatur. Si tabesit, Esdiæ antidotus præscribitur: forisquæ admove emplastrum Mnafer: & muhrida-tio sæpe vitatur vel theriaca. Hippocrates dicit nucleos cum galbano ex melle. Sed iterum reperio, studendum esse ut ex suppurato fiat bonum expuratum. Quare cum ex febris dolorisque remissione, & ex grauedinis incremento circa locum afflictum maturacionem factam intellexeris, tussiat data opera sæpè, hora interiecta, & in ægrû decumbat laius. Digito vomitum prouocet, prouocet dicos, non tamen promoueat. Rupta à vomica propinari etiam potest ius antiqui caponis, in quo coxit hyssopus, capillus veneris. Progresso malo ad cerata transendum est. Foris etiam admove-mus remedia quo ex suppurato foelix fiat expuratum. Accipe farinæ foenigræci & lini, cuiusque vnciam: radicum althææ vncias decas: ficus decem: passularum viginti paria: florum chamæmeli & meliloti, cuiusque pugillum: traice cinbro raro: adde butyri recentis vncias duas: iunge oleum chamæmelinum, & parum olei iuniperi: admove hoc emplastrum calidum pectori. Si placet materiam foras trahere, adice aliquid fermenti veteris: nam egregiè dis-cuit. In primis enim hic notandum est, num pus foras trahi debeat, an verò intus rumpendum sit apostema. id enim vel ca-lamitatem vel salutem adferre solet. Ete-nim magna copia pusis collecta in regione arteriæ venosæ sæpè cor suffocat. Quare coniectandum num pus in ea parte consi-stat. Ut maturecat pus, fiat fotus ex decocto maluz, foenugræci, seminis lini, & si dolor virget, adice anethum, parietariam, melilotum. A fotu illine mucagine foenugræci, lini, cum adipibus: vel admove diachylon cum mucilagibus: est sanè id efficax. Vel brassicæ folium ad ignem ta-bescatum illinatur butyro vel adipe anatis, & lateri admove. Tandem iunge empla-stro de mucilagibus radices ireos. Tardè ad fimos veni. Vbi pus maturum, hoc decocto rumpatur, Accipe organi mani-pulum: decoque cum aliquot allis: dein copiosè mel insperge. Dentur etiam terebinthinæ lotæ drachmæ tres. Ruptio ab-cessu, ut ante monui, vide quò id vergat, eò abducas. Molle remedium hoc est, Ac-

cipe mucaginis seminis lini & foenugræci singulas semuncias: adipis gallinæ, an-seris, butyri, cuiusque drachmas sex: hy-racis calamitæ semuncias: olei violarij quod sufficit: vngatur pectus. Vel Accipe mi-cam panis, vel farinam hordei: coque ex hydrelæo: adde radices althææ, maluz, & caricas: iunge oleum amygdalinû, adipem anserinum & crocum. poltez, ut rumpatur, singatur cataplasma ex fimo capillo. Cum factum est expuratum, tunc diapho-resis vtiliter instituitur, propter à foueri-mus pectus decocto thymi, hyssopi, fam-buci, chamæmeli, ireos, spicæ, aristolochiæ rotundæ: filtro id agatur. ter vel quater re-pete hanc impositionem singulis vicibus. dein sicca locum panno calido, illumque illine oleo lilino, anethino, balsamo, & oleo ireos. Si maiorem vim quæris, adice sulphur. Fiat emplastrum ex radicibus al-thææ, & ex radicibus ireos recentis: coque simul: adde axungiam & farinam foenu-græci & lini, oleumque lilinum: asperge, cum opus est, fimo columbinû. & tunc tussiat, vomituriat, subitoque se conuoluat in ægrum latus. Vel accipe caricarum pin-guium libram: tere cum adipe suillo & oleo amygdalino. Veficatorum pectori ad-mouentur etiam. Hoc etiam decoctum val-idè in periferiam corporis materiam pro-lestat: Accipe radicum cucumeris agrestis & cbuli, artemisic, hyssopi, calamithæ, dictamnii, cuiusque manipulum: coque ex aqua, & fiat fotus. Vel poma duo colocy-nthis incoque vino albo vel aquæ: est ef-ficax is fotus. Accipe adipis anseris, olei amygdalini amari, cuiusque vnciam: myr-thæ drachmas tres, ceræ parû: fiat vnguen-tum molle. Aliud: Accipe farinæ hordei semilibras: caricarum pinguium vncias duas: terebinthinæ claræ vncias tres, fimi columbini, nitri vel salis drachmas: misce: fiat emplastrû lento igne. imponatur per tres vel quattuor horas: nam fit siccum & effectum. luoat etiam oleum irinum si fo-tu admoveatur. & oleum illinatur ex nu-cleis pinearum cum resina. Et ærinos ex-pice liquida valdè commendatur, nam co-quit & stæus amouet. Foras ex lixiuio fa-lis & sulphuris. Hoc emplastrum dissecit succrescentem materiam: Accipe coricum radicum vlmii, liliorum, cuiusque vncias duas: maluz, violarum, hyperici, chamæ-meli,

meli, singulorum duos manipulos: coque & contunde, adde fermenti ex atro panis rancias tres: farinae seminis lini & fœnugræci, cuiusque fœcunciam: olei amygdalini dulcis vel buryi infusli & olei violarū, cuiusque duas uncias: fiat cataplasma. Ab expectorata materia robur pectori addatur, & lacerā vniantur. Vtatur radicibus ioulæ cum symphyti radice: coque eas cōtusas cum melle. Sæpè vsum ineat theriacæ & mithridati: quibus etiam ad foelitem expectorationem vtendum est. Dodecatheon Pauli, Accipe ieros Illyriæ, erui, hyssopi, seminis verticæ, liquiritiæ pulueriæ, fœnugræci, singulorum semunciam: pulborum contritorum fœcunciam: seminis lini semunciam: nigellæ, pulegij, cuiusque drachmas duas: nucleorum pini totulorum vncias tres: pipetis nigri drachmā: cum melle fiat electarium: sumat cottidie ante prandium drachmas tres. & Diaprasij probatur. Accipe mairubij, ieros, hyssopi, pulegij, singulorum semunciam: cacciorum vncias tres: nucleorū pini contulorū vncias quatuor: coque ex aqua dum æqua pars inaneat: fiat fortis expressio: ac per melis depumati ad pondus decocti: nisce, & lento igne ducatur ad spissitudinem mediocrem. Fiunt etiam suffitus ex hure, myrrha, styrace, aristolochia, sulfure pyro, & nicotiana: ad siccationem & dispersionem puris. & ex decocto ieros cum alphure. Cibis sit facilis coctionis & cgectionis, & euchymus: optima est puifana cum melle. Si in alium repit materia, concedat ofculca ex beta, malua; & spinachiam cum butyro: & poma dulcia confectant elixa cum butyro. ficus, passulæ, datyli. Vtatur ouis recentibus, carne vituli, pullis. Puls etiam fiat ex hordeo, auea, vel milio: auiculæ etiam proderūt. Ius cerum cum hyssopo & petroselino: sit utem ius pulli vel galli. Maximè talia præribimus, si ad renes viam affectat materia, quin tunc etiam vitum asparagis. sed indem, cum glutinandum est, pedes præribimus vitulinos & porcinos: oryzam rabemus etiam ex lacte, & calcem lacteentem adhuc ac salis experiem. Cauter à guminibus, piscibus, horis fructibus, herbis crudis, & a frigidiis. Priscianus adificet pulitib. piper. Potus sit aqua mulla, si incoxit origanum, & hyssopum: & ci-

cerum ius cum passulis decoctum. Vinum tenue dulce cum aqua saccharata dilatum. Si foetidum sit pus, dabis decoctum fœnugræci & dadylorum: vel bibat lac asininū. Testudinum vsus commendatur, & siu-  
pus inde confectus cum aqua ex illis distillata. Decoctum si bibant ligni Indici & saxæfias (ex ceruisia nimirum his decoctis) iuuat. Quin Indorum ligum coquitur cum humectantibus, vt cum althæa, & radice symphyti, scabiosa, glycyrrhiza, & fo-  
his aristolochiæ longæ: additur mel. Aëris omnem fugiat intemperiem, maximeque humidam & frigidam, & venios australes & aquilonares. Cauter nec cubic sit loco humido. Clausis fenestris dormiat. Plurimi sanè hoc morbo occupati, quibus integra superest ætas, si citra offensam in diac-  
ta, expectorationi studerent, euaderent, qui alioqui aut cibis à re alienis indulgentes, aut aërem intempestiue captantes, ventis-  
que se dantes, vel plurimo potu algioso vientes, sua sibi damna augent, aut in no-  
uum empyema se præcipitant, cum iam ferè priore empyemate essent defuncti: quemadmodum Polemarchi euenit vne-  
rum. Alius ducatur cottidie, duarum vnciarum passularum dulcium esu. Quies pro-  
dest expectorationi: si per alium fluxit ma-  
teria, leniter ambulet, sic enim materia fa-  
cilè cōtepet: si vrinarum vias materia ac-  
cesserit, moderata exercitatio proderit. Me-  
tus & timor absint. Empirica quædam ce-  
lebrantur, vt Aquæ hederæ vncias accipe  
quatuor: calidè bibat, idque quater cot-  
tidie. id ruptum apostema à sanie liberat,  
& ne in phthisin incidat prohibet. Accipe  
carnium cancrorum fluuiatilium elixatium  
libram: pistat cuncte, & cum farina  
hordei fiat cataplasma. maturat hoc vo-  
micam pulmonis. Si à catarrho, lauetur  
caput singulis septimanis ex lixiuio in quo  
decoxit maiorana, calamintha, abrotanū,  
folia lauri, pulegij. sicca benè, ac caneat cu-  
riosè, eo tempore quolauit, ab aëre, &  
vertici capitis inspergatur pulvis ex styrace  
calamita, benzouino, myrrha, iride, & ro-  
sis. Aqua hederæ misceatur cum aqua res-  
ludinum aut cancrorum: quater de die bi-  
bat. Scabiosa rumpit apostema, maceretur  
in aqua eius, ac pulvis remisceatur, & vñ  
cum theriaca bibatur. Hæc de Empyema-

7. Epi-  
dem.Empirica  
ta.

## CAPVT IV.

## DE ASTHIMATE,

*hoc est*

## ANHELATIONE.

**A**STHMA Græcis ab ἀσθμῆς, hoc est anhelare, nomen habet, unde ab Aurchano anhelatio dicitur; suspirium à Quinto Horatiano appellatur; ab Arcæto etiam ἀσθμα nuncupatur, quò l'ἀσθμῆς tacite spiritum ducant, decumbentes enim strangulantur. Est autem Asthma respiratio difficilis, frequens, & velox, cum sonitu; facta ob meatuum pulmonis interceptionem, circa febrem. Dixi in Definitione, asthma pertinere ad respirationem. Sunt autem triplicia respirationis instrumenta, nimirum excipientia, deducentia, & adiuvantia. Præcipuum verò respirationis instrumentum est pulmo. Vt naturam huius morbi rectè percipiamus, indagandum num respiratio sit actio voluntaria, quæque τῇ ψυχῇ ἀναγκάστως fiat; vel num sit actio merè naturalis, quæ sola naturæ videtur: an potius sit ex his remixta quædam actio. Auertihoc credit Galenum voluisse hunc prorsus esse voluntarium motum. Nos putamus, quod etiam Galenus, Auicenna ac probi auctores censent, hunc motum esse permixtum ex naturali & voluntario. Cum enim volumus, forbemus, vel flamus: & dormientes nihilque tale cogitantes, respiramus. Propterea Galenus scripsit, respirationem habere instrumenta tum naturalia, tum voluntaria. Naturalia, ut pulmo, qui princeps est organum respirationis; qui dilaturat ac compimitur, non quidem sui ratione per se, sed ratione musculorum thoracicorum, quorum sequitur motum: etenim nervi motorij non deueniunt in pulmones. Conueniunt verò ad respirationem musculi & diaphragma hauri vt organa naturalia, verum vt voluntaria. Propterea Galenus hæc actionem spirabilem confert egestioni viinæ & sæcum: quòd viinæ excretio sit motus mixtus: vesica enim vi naturæ instrumentum est, (quod & excernit & attrahit sine nostro imperio & arbitrio) ita musculi est voluntatis. Id autem animaduersione dignum est, quòd etiam si respiratio

sit motus mixtus ex naturali & voluntario, tan en lege facultatis ita constitutum est, vt motus voluntarius, sit domina & imperatrix. hinc est quòd Galenus hoc modo loquatur, cum dicit, pulum esse actionem merè liberam: quòd nesciat voluntatem dominam. Respiratio itaque non est merè libera: quare nec mirum, si quidam scientio spiritu, se necarunt: exemplum est apud Galenum serius Barbarus. Voluntas itaque in actione respirationis superat: attamen est motus mixtus. Sed dices, Galenus tamen assensu totum negotium respirationis esse à voluntate: si ita, quid igitur imaginamus huius naturæ locum esse. Respondemus, quod si ita subsolum legatur Galenus, sibi refragari videbitur eodem ipso loco, vbi sanè admittit naturæ etiam locum esse in actu respiratorio. Quare decisionem dubij huius adserimus ex libro Galeni De respirationis causis; Dicimusque respirationis opus absolui inspiratione externi aëris, & expiratione aëris interni fuliginosi. Vtrique hæc actio sit à voluntate: hoc est quod Galenus voluit, à voluntate scilicet fieri non solum aëris expulsionem, sed etià inspirationem. Nec propterea inferri, à sola voluntate fieri respirationem. Diximus præterea in definitione, esse difficilem respirationem. intellige tñ inspirationem, tum expirationem. tunc enim Asthma ad est, cum non solum est densa respiratio, sed etiam valdè cum est densa cum sono. Scripsimus in Definitione, hunc affectum nasci ob Meatuum pulmonum Interceptionem. Ita actionem hanc læsam respirationis, referimus in suam causam, quæ est morbus in mala conformatione. In pulmonibus sunt rami asperæ arteriæ, & venæ arteriales, arteriæque venales, & pulmonis ipsa substantia laxa & spongiosa. Cum autem propagines asperæ arteriæ, quæ disseminantur in pulmonum substantiam, in angustum rediguntur, maximè hunc affectum proferre solent. vt cum à crassa, lenta, viscidæ materia infarciuntur illæ propagines asperæ arteriæ, vel cum asperæ hæc arteriæ (nam per hæc proximè fit respiratio) à læuibz arterijs turgescenibus comprimuntur, quod Antipatro medico evenit. Respirationis in vniuersum sunt tres causæ, nimirum Vfus triplex: instrumenta quoque triplicia: & causa

1. De motu musc. 6.  
2. Quæstio.

2. apb.  
26 & 3.  
De diffi.  
resp. 11.

3. 27.  
rius 6.  
& De diffi.  
resp. 11.  
2. 3 11.

4. De locu as.  
Respira.  
tionu caus.  
sa.



causam efficiens. Vfus dico duplex, scilicet caloris temperatio, spirituum nutritio, & fuliginis exclusio. Influximenta quoque triplicia, larynx, aspera arteria, pulmones cum thorace. Causa verò efficiens vna est, voluntas: quæ in vigilantibus mouet musculos ab electione: in dormientibus verò ab instinctu. Itæ ad Causas venimus quæ huic actioni officunt. Quicquid eiusmodi est vt claudat pulmonum meatus, huius morbi causa esse poterit. Hoc autem euenire potest ab intemperie spirabilium partium erique hæc intemperies materia ex-  
*Alia*  
*maius*  
*thoracis*  
*in vigi-*  
*lantiis*  
*est volun-*  
*taria ab*  
*electione:*  
*in dormi-*  
*tibus ve-*  
*ro est vo-*  
*luntaria*  
*ab instin-*  
*ctu.*

CAV-  
SA H.  
Fumus  
Mercurij  
& cancer  
na metal-  
lica siccat  
pulmones.  
*Historia.*

Observa-  
bile de  
statu.

3. Aph.  
22.

Parosy-  
pathiam.

6. Aph.  
49.

pers interdum, plerumque tamen materiae est participes. Sine materia, vt cum animalis facultas stupet, ita vt thorax alas suas ac pulmones non explicare possit. Ita si siccitate in angustum cuncta ibi interdum ar-  
*Observ-*  
*abile de*  
*statu.*

Quantur, quod chymicus nonnunquam euenit, & auri ferrique fabris. Vidi in quodam Typographo ad eò siccatos pulmones, vt aridum pomū ferè dici potuissent. Ita madore etiam interdum occupantur pulmones, vt in se candiant. Atque en hoc malum plerumque materiam participes est; eaque ferè est pituita à capite vel toto corpore in pulmones influxu; vel ibi colligitur. Hæc autem cunctis pulmonum vasis se insinuat, quin & ipsas pulmonum spongiositates inuadit. Quin copiosus crassiusque status plerumque se iungit cum materia asthmatis auctore: qui auctor paroxysmorum esse videtur. Ortum habent à cruditate, ocio, somno à cibo, & à loco humido. Materia quæ asperas infarcit arterias, est plerumque crassa, lenia, viscida, ibi genita, vel eò fluens, vt cum ab autumnali frigore à capite exprimitur, quæ ibi morà concretescens, bronchiis infarcitur. Hæc sunt ferè causæ quæ faciunt vt per Idiopathiam spirabiles partes hoc tædio affligantur. Quin & per sympathiam affliguntur hæc partes, ac inde asthma proferunt: vt si apostema partibus vicinis conceptum, pectus opprimat; vel hydropicus si id fecerit tumor. Vel si in spina dorsii constitit apostema: nam inde intercepti spiritus animalis, illic aditus intercludunt à diaphragmate, ac pectoris musculis. Vel si nervi alij qui ad pectus & diaphragma seruiunt conuellantur, vel soluantur. aut si gibbus nascatur, distortus ad interna vertebri, ob humorem pituitosum quo occupantur li-

gamenta spinæ: quod sensim euenire solet. Quin si pectus naturæ angustius factum sit. Vel si vitium sententia parit, deorsum trahat diaphragma, vt pendulū hepar aut lien. Vel cum vterus sursum repit. Vidi hæc affectionem in muliere fusca, bene habita, xianis medicæ. secui venam, purgati, multa alia, frustra tandem dedi mithridatium optimimalico restituta fuit S. Dei beneficio. hæc vix spiritum nictitudo ducbat. Euenit vt status, tendendo, diaphragma opprimat: imò vidi quæ hæc ratione obierant. Vicius mala ratio, quia in status est secunda, sordes fecundissimas huius mali esse solet, vt si quis præter naturæ legem sæpè potet. Ita quicquid opacū crassumq; præbet aëra, ad hunc morbum facit, vt vbi aceti sunt frumentorum minimè diffusorum: & vbi hypocausta cuiusvis animæ receptacula. Hinc enim caput gravatur, ac suum vitium in imbelles pulmones elidit facit, ac imbecillitatem illi addit: hincque fit vt tandem æconomia pulmonis stupeat, vnde ex proprio vitio laborare, ac synathismum facere solet. Causa verò cur quosdam maximè de nocte media inuadere, quod id tempus maximè è mædeat sua natura, nocte enim, dicit Aristoteles, maximè plueri solebat. Itæ ad signa venio: In omni motu concitatore se profert hic affectus. Cum enim ex illa motus exagitatione validior calor surgat in corde, magna eueniatione illi opus est: nec alia via illi patet quàm respirationis ductus. cum verò infarsus à viscidis crassæ materia pulmo alas suos explicare nequeat, necesse est vt frequentia respirandi resarciat id, quod eius robori denegatur. Hinc crebra illa anhelatio ac pectoris oppressio. Et supinus homo asthmate fatigatus decumbere nequit, quod ita partes spirabiles opprimantur. Spiratione sibilus et stenor auditur à pituita crassa adhaerente lateribus pulmonis & bronchiis asperæ arteriæ. Hic enim spiritus exiens ac obfasculum inueniens, sibilum edit. Præclare de his Aretæus: In acclui, inquit, minere, & sufficilis & ægra spiratio editur, status adfusus & eruotiones præter rationem, humidâ, obseura & sono carens vox est: multum & frigidū aëra cupiunt. Sub diu ambulant, quolibet enim domus ipsi ad trahendum spiritum parua & angusta est. Ercu respi-

*Historia.*

*Causa*  
*externa.*

SECM.

h h 3 rat,

Rione proficiscitur asthma, id sensim subnascitur. Sin fuerit ab afflicta spina, vel à ære, tunc etiam aderit resolutio alicuius parvis. Qui rarum & magnum spirant, hi ex phlegmone in dyspnœam trahuntur. Qui vero frigidam aëram spirant, laborant ex dyspnœa ex calore naturali imbelli. Proprie dictum asthma quia consistit in pulmonum connuentibus bronchiis, propterea conqueritur æger se maiore anxietate emittere quàm admittere spiritum. Sin ipsam pulmonum substantiam occupavit materia, erit dilatatio difficilior restrictio: nam materia extra fistulas quæ confedit eas premit. Si sensim increvit malum, sine sterore sineque expectorato, & si in exercitio præter morem anhelat, erit à tuberculo. Sin expectoratum aquolum fuerit cum ampullis, nascitur à pituita statulenta. Quodsi homo pleuritidi diu implicatus fuerit, de purulenta suspicandum erit. Si illico in anxiâ respirationem trahatur homo, sine dubio cauit huius deciduus è capite vel toto à corpore id effecerit. Nam, ut ait Priscianus, frigido phlegmate pulmonibus adhærendo, cauenæ vel meatus quibus naturaliter spiritus redditur & accipitur occluduntur. Quodsi malum confedit in læuibus arteriis, quæ nascuntur ex vena arteriosa, & ex arteria venosa, præcessit pulsus inæqualis, ut euenit Antipatro: quodsi præorepat malum, in palmum ac syncopem degenerabit. Num verò synarismo sensim congesta sit materia, vel an ex capite subito influxerit in pectus, hoc modo id deprehendemus; ubi à congestione, aderit fracta vis partium spirabilium, ac pederentim hæc spirandi difficultas irrepit: Sin verò ante catarrhis exaratus fuerit homo, inde natum esse asthma arguendo erit. Crudum tuberculum pulmonum agnatum arterijs vt noscitur, docet Fernellius. Est hoc vehemens sanè malum, ac mali moris, diuturnum & acutū: diuturnum dico, ratione totius historix; acutum verò ratione paroxysmi; etenim vel pauculis horis enecare potest. Est affectus intermissionis participes, & parti peculiari ascriptus, scilicet pulmonibus. Natura itaque huius mali cupi deprehensa fuerit, huius contrarium medelam opponimus. Diximus plerumque crassam materiam hæc in vitiis esse: quare ratio suadet hæc esse attenuan-

dam: si viscida fuerit, vt dissecentur, lenta abstergeantur, quò aprior expectorationi reddatur. Quare, quod in tussi etiam observabile, remiscebimus etiam, præter calidam & siccam, quæ humectant & molliunt. Præterea ea cautio est adhibenda dū crassam attenuamus, ne dum attenuationi operam damus, id fiat nimis imbelli medicinâ, quæ reuocando nimis fundat materiam, dumq; nihil exhaustum, ne tam in maiorem molem prouehat, vnde geminaretur faciliè infarsus. Iterumque cauendum, ne ad id leptomeriâ excellat remedium, vt paries tenues nimis exhauriantur, restansq; crassitudo in duritiem restagnet. Itaque hæc remedia modeste exhauriant. Aut si opus sit magna vi attenuandi, perpetuò consocietur vis mollium. Vnde repudianda sunt in asthma ea remedia quæ nimis æstu ac squalore excellunt: sed semper huius iungantur quæ madore quodam algiosa sunt: ita tamen vt quæ stricto frigore circumfluunt absint: quale optimum, mandragora, hyoscyamus: nam talia expectorata inirecipiunt. Est tamen his locus, ubi catarrhi vehementia cō cogit. Postquam materia morbifica fuerit expectorata, erit succidendū, partesque quæ affundunt materiam, quæque eam excipiunt erunt firmandæ, ne id amplius faciant. Si malum hoc maxime subnasci videatur à statulenta materia, indicatio nascetur vt facili nasa solutioni studeas statuum, rebus nimirum discutiendis: deinde vt ab infarsu vindicentur obstructa. Si febris emicuerit, fricentur extremitates. Si sit à catarrho, is frustatur. Si fuerit à angusto pectore ab eius vi fracta, prouiso habeatur ne in illud se præcipiet catarrhus, & vt fugiat cuncta quæ plethoricis causis caput implent. Si ortum ducat ab aliqua alia parte, hac ab iniuria atrecatur, perpetuoque id studium adsit vt expellent se alæ partium spirabilium: pulmo purus sit ac robustus. Iam videamus, antequam

Prognosis.

4. *res.*  
aff. *mult.*5. *lib.*  
10.Differen-  
tia com-  
munes.Tolerantia  
del. *curat.*  
sua.





Barum, quò foras sepat materia : quò his tandem cauteria imprimantur superficialia : fluat utentem anni : his succedant illico fontanellæ brachiorum & crurum. Fuccetur pectus in ruborem vna manu oleo chamæmeli : & partes inferæ fricentur manè. Fiat etiam lotio pedum ex decocto saluæ, betonicæ, maioranæ, florum stœchados, & chamæmelorum. Iam ad Purgandam venio. Seriatim erit præparandum & purgandum. Præparatio instituat de coctionibus quæ sunt ex aristolochia, helio, iride, semine viticæ, hyssopo, liquiritia, capillis venteris, hordeo, semine lini & scœnugræci, scœniculi, scabiosa, prassio, betonica, passulus, dactylis, sarsapa, rhymo, viola, sicubus. His adde sirupor, vnde hyssopo, de liquiritia, de prassio, boraginis, oxymel, botryos. Si materia indulescere videatur, accipe adiantum manipulum, violarum seminam pulv. glycyrrhizæ vnciam : radicem rufci, asparagi, cuiusque semina : seminis malvæ drachmas duas : quæ libras quatuor : coque ad mediæ parvis consumptionem : colaturæ adde sacchari vncias duodecim : mellis clari vncias tres : aquæ hyssopi vncias quatuor, coque dum ad sirupi formam veniat. Vbi crassa solum materia vitium facit, accipiemus oxymelitis simplicis, sirupi de hyssopo, & de liquiritia, singulorum semunciam : decocti glycyrrhizæ, hyssopi, boraginis, vncias quatuor. Interdum vitium etiam sirupo capillorum venteris, de duabus radicibus, violato, calamintæ, stœchados, iuiubarum, melle rosarum, aceto scyllitico additur aliquid croci. decoctum ligni guaiaci, & ligni salsapiræ commendatur valdè. Accipe radicem enulæ, iros, cuiusque vnciam : acri 3 j. hyssopi, sarsapæ, scabiosa, singulorum manipulum : glycyrrhizæ sesquunciam : scœniculi drachmam : passularum Corinthi, vncias tres : dactylos quinque : seminis scœnugræci semunciam : florum violarum, thymi, cuiusque pugillum : coque ex aquæ sesquilibra : ad tertæ partes consumptionem : adde mel : & parum croci. vel sumat cotidie oxymelitis scillitici cochlearium, ex decocto liquiritiæ, hyssopi, aristolochiæ, & capillorum venteris. Si adest vna intemperies frigida, incoque lacti pugillu porris sumat vncias duodecim, & potet solum. Varia præparantia scribo, nam in hoc

malo pluribus opus est purgantibus : quare & variè coquendum & parandum. Cautio. Titio in his adhibeat ne hæc nimium serueant, talia enim relinquunt crassum succum insanabilem. Eadem lege etiam abstinentum à frigidis crassis, ac insalutem interuentibus. Quòd verò Galenus interdum his vitatur, hoc fecit quòd catarrhus sistere ut qui à capite pectori molestus est. tunc nos etiam lubenter vitum diacodio, sirupo papaueris, & cydoniorum, bolo, thetici à recentia cum paucis philonio. Admonuit etiam Auicenna cauendum esse à validis vrinariis, ne tenuibus partibus abieptis, crassæ relidant. Cum varia materia in vitro fuerit, vi crassa & tenuis, miscemus sirupum de hyssopo cum sirupo myrtillorum vel de iuiubis. Durici si fuerit materia, utemur scœnugræco, passulis, sicubus, iuiubis, malua. Si cohibendus catarrhus, propinabimus sirupum papaueris cum decocto myrti : & vi facili ducatur anima, remisce parum croci. Si sit materia calida & asperum pectus, ex sententia Mesues accipies ficus siccæ decem, & iuiubas triginta, sebesten totidem : passularum, liquiritiæ rasæ, cuiusque drachmas decem : seminum alihæ, cydoniorum, hyssopi, violarum siccæ, singulorum drachmas quinque. decoquantur ex aquæ libris tribus, usque ad libram vnam. Dosis eius sit omni manè vnciarum trium : cum nyrobalanis & violis, ab auris quatuor, usque ad vnciam. Et post illud sumat manè & sero electarium, quod accipit capillorum venteris, seminum melonum, citrullorum, singulorum drachmas quinque : confice cum sirupo violato. dosis eius sit drachmarum trium. Si iuncta sit febris, deur et cubanti aqua citrulli aut cucurbitæ, in qua emulgeatur semen portulacæ, & psyllij. Si fuerit febris expers, sumat lac caprillu, quo extinguat situm. Cum his materia morifica ad mediocritatem redacta fuerit, ita vi sine vi viam inueniat, excludatur à toto corpore : succisa enim causa antecedente facile vindicabitur pectus à molesta illa congestione, quam inseri illi affluus perennis. Quare iam de purgantibus causam antecedentem ago. Crassissimæque attenuatis, ac tenuibus coctis, corporeque meabili, instituat purgatio causæ antecedentis, Causæ summopere ac purgatio præscriba-

Præparatio  
vnde  
vnde saluæ.

Purgatio  
vnde saluæ.

Cautio.

tur tempore paroxysmi. Præterea, si ægrè excludatur materia, ea tunc abducatur repletis vreis, ne vires fatiscant. Nec sint vectoria pharmaca, ne fiat anhelitus interceptio: sintq̃ talia quibus iam vsus subscripsit. atamen trahant à remotis partibus, tale est agaticum præparatum. quinetiam elysinis hic reuulsio. Quotidie extra paroxysmum, dum sanus videtur homo, alius ducatur pilulus & ficubus. Ægineta iubet vi valide (nimium periodis quibusdam) continuoque (scilicet modeste) purgetur: nam euacuata intestina liberiores concedunt anhelitum. Si catarrhus in vtro est, pilulæ sine quibus dicitur, omniū sunt præstissimæ, vel accipe pilularum coctiarum, & aurearum, & de agarico, singulorum scriptulum: trochiscorum alhandel granat: fiant pilulæ septem. Si materia in ventriculo & in intestinis venis stabulari videtur, exhibe drachmas duas specierum hæræ, cum melle rosato laxativo. Sæpe reperitur purgatio: nam, dicebat antiquissimus medicus Archigenes, maximum remedium est fortis purgatio instituta, per intervallo: si id autem lentioribus solutius alium mollire oportet: quale hoc est. Cui acriacula duos optime consundantur, & cum ferolactis decoctis, percolatum serum modico melle permixtum bibatur. Commendat Actius pondus drachmæ vnius ad quatuor fabinæ herbæ intæ, & deinde absinthij potum præbet. Mihi placet galli decoctum. Accipe agarici trochiscati recentem semunciam: polypodij recentis vncias duas: fenicinis cathami leuiter confusi drachmas sex: foliorum fenæ vnciam: liquiritiæ rasæ drachmas duas: seminis anisi drachmam: in gallo veteri ruffo coque ad purillaginem: Accipe huius decocti vncias quatuor, cassiæ, sirupi de mentha, cuiusque semunciam, rhabarbari infusi vi decet, scriptulos duos: diacathami drachmam vnā: si uis potus. Vel hoc modo, Accipe huius decocti vncias quatuor, sirupū violati, capillorum veneris, singulorum semunciam: fiat potus, aut solum dulcoretur hoc decoctum saccharo vel melle. Ita perennis quedam fiet humorū à pectore reuulsio, adest etiam quedam humoris enī prauitas, leuat etiam vsus pilularum coctiarum, & de hiera cum agarico, diatribis cum rhabarbaro, & diluti agarici, cassiæ, mannæ,

caribami, polypodij, diaphcenici, electarij Indi. Accipe mannæ vel cassiæ vnciam vnā, adde trochiscorum de violis scriptulum, si materia sit biliosa. Trochisci de violis ita fiant: Accipe florum violati medio: crinet exicatorum drachmas sex: turibis optimi semunciam: succi liquiritiæ, mannæ, cuiusque binas drachmas: scamonei drachmas duas fiant trochisci. Vtrum si corpus fatiscent, ab his abstinere: & potius hoc vitare; accipe agarici recentem trochiscati scriptulos duos: rhabarbari electi scriptulos quatuor: cinnamomi, & zinziberis, cuiusque semiscriptulum: infunde aque capillorum veneris & vino tenui: macta totā nocte, colaturæque addantur mannæ optimæ drachmæ duodecim: vel vncia misce, fiat haustus brevis, sumat in diluculo. Si pilulæ vtiliores videntur, quod à capite veniat materia; accipe pilularum coctiarum scriptulos duos: trochiscorum alhandel granat quatuor: fiant pilulæ quinque: eas deglutiat in diluculo, & superdormiat. Quod si materia morbi fuerit tenuis, viles erunt pilulæ sine quibus dicitur. Auenzoar lubentius colocynthide hic vrbatur. Nos eam cautionem semper adhibeamus, vt nonquam ea vitamur: nisi præparata: est vero optime parata in trochiscis alhandel, hoc est, de colocynthide. Propterea pilulis de hiera cum agarico etiam aduicimus hos trochiscos, & cum oxymelite fiant pilulæ. Viles etiam sunt pilulæ masticeæ, & aggregatiæ. Sed spaciis quibusdam interpositus est purgandum, nam materia est viscida, nec pharmaco trahenti, nec naturæ expellentis facile cedens. In Vniuersali autem declinatione vomat, modò fuerit iuuat, hoc est, si vomat ex facili, alioqui non sine meta suffocationis hoc fieret. Si ventriculus circumfluit pituita, oxymelite in vomitu irritetur: vel misce decoctum raphani cum oxymelite. Oxymel Gesneri forte est vomitorium. Non datur vomitoria nisi ubi indicia sunt à paroxysmo: ubi enim difficilis adest respiratio, id non fiet sine graui metu suffocationis: nimium enim ille nifus affligit pectus, metusque aderit ne materia in œsophagum adducta, opprimat asperam arteriam. Iubet Rases vt post sinapis & mellis sit homo in vomitu irritetur, & alius vt docetur his catapottis: accipe agarici grana octodecim, trochisco-

Act. 1.  
17.

Cent. 1.

Vomito-  
ria.

TUR.

rum aliâ del grana sex: elaterij grana quatuor: facci liquiritiæ sesquidrachmam: fiat massa: fumat ad drachmæ pondus. Deinde, inquir, nostrum deitur præparans remedium cum confectiione: & iterum vomat, & ventem deiciat. & hæc tentanda, aut, donec redintegretur æger. Postquam igitur prouiso habita fuerit de causa antecedente, tandem ad eam materiam euellendam veniemus quæ pectoribus concepta est, ibique anxium spiritum premit. Hæc autem materia cum plerumque sit crassa, lenta, vel viscosa, erit incutenda & detegenda cum emollientibus. Leniunt ac emolliunt viola, cassia, pinæ, vitelli ouorum, iuscula pingui, sebesten, liquiritia. Abstergent vnâ buyrium, fœnugræcum, semen maluæ & althææ, & hoc mucago, caryophyllus. Absterget mel hyssopites, & sirupus hyssopi, thymus, prassium, origanum, crocus cum melle, laurus, enula, aristolochia rotunda, centaureum, looch sanum & expertum, looch de pino, & de scilla, cappares salitæ, porrum cum melle, iris. Decoctum calaminthæ cum ficibus & passulis crassos humores expectorat, ac spirabiles partes explicat. Accipe thymi, hyssopi, prassij, baccarû lauri, quantum videbitur: incoque aquæ, colaturæ adde mel. Plerumque viemur in hoc malo, liquiritia, capillis veneris, tussilagine, croco, præcellit etiam decoctum passulorum & fœnugræci cum castorei parua parte. vt, huius decocti vnclis iribus incoque semiscriptulum castorei. Vel gutta ammoniaci deitur cum oxymeli: potens id est remedium. vel deitur decoctum hyssopi, & ficuum cum melle & croco. Villia etiam hæc sunt, mithridatum, theriaca, aphanasia, diamofcus, philonium, quod proprietate quadam iuuare videtur. Meminerimus in primis esse maturandum, vt ficibus, daçylis, viis passis, capillis veneris, fœnugræco, melle, sirupis. Deinde educendum esse materiam de pectore, vt viciæ femine decocto in hydromeliter & cæteris talibus. post dies octo interfere purgationem per aluum vel per vomitum. Hinc sicca materiam, ac spirabiles partes explica, vt suffitu sulphuris, auripigmenti cum croco, & cannâ exepiatur. Si sola pulmonum inempties adsit sicca, vnde in squalorem aridum trahuntur pulmones, id gemina ratione cuenit, vel

enim est febris pectore, vel eius expecti. Si febris fuerit expecti, mollibus soueatur pectus vnguennis: potest lac aluminum, quod vini boider & maluarum rediet, Bilneo viatur aquæ dulcis, ouis indulget & restaurantibus. Sin febris fuerit pectore, viatur aqua hordei, & iolabo, & aqua melonum, vel cucurbitæ cum saccharo. Vescatur cocta lactuca & cucurbita cum butyro. Manè & vespera bibat aquam citrulli, cucurbitæ, vel melonum. Vnge pectus oleo violato cum mucagine psyllij extratta cum aqua lactuæ vel citrulli. Viatur sirupo violato: cum febris declinat, ineat balneum. Eodem modo habeatur æger cum pulmones ex calore laborant. In crassa materia pectore concepta, præclare ad salutem facit oxymel, & mel scylliticum, & acetum scylliticum: secundò radix dracuntij vel dracunculi minoris, & aristolochiæ rotundæ, & galangæ, & capparis: deinde aium, iris, helenium. Præterea hyssopus, marrubij, tussilagis, scabiosæ, semen viciæ & nasturtij: ex his fiant apozemia & sirupi. Pueris præbetur scriptulus nasturtij, linteo excipitur & maceratur ceruisia calida, tota nocte: manè leniter exprimitur, adde mel rosatum colatum. Cautio ea adsit, vt semper admoveamus flatus discutientia. Si varia materia in vitio fuerit, vt si ea fuerit crassa & tenuis, miscbimus sirupum de hyssopo cum sirupo myrtillorum vel de iuiubis. Durius si fuerit materia, tunc in vsum ducemus ficus, fœnugræcum, passulus, iuiubas, semen maluæ, althææ. Si sistendus carinthus, utilis erit sirupus de papauere, diacodion, cum decocto myrti: & vt facilius eatredeatque spiritus, parum croci admiscbimus. Potio fiat ex passulis, ficibus, hordeo, iuiubis, glycyrrhiza. Accipe loch de pino vnciâ. bō. li drachmam. vel accipe diatragacanthi frigidit, looch de pino, cuiusq. semunciam: pulpæ sebesten drachmas duas: croci grana quinque: cum sirupo violato fiat linctus. Si crassior fuerit materia, viatur radice enulæ condita melle: & fiat sirupus ex enula, nicotiana, fœnugræco, & passulis. Cautio ea adsit, vt sensim ad fortiora veniatur. Accipe oxymelitis simplicis, sirupi de hyssopo & de violis, singulorû æquales partes: lingat. adde tadem oxymel scylliticum, looch sanum, & de pulmone vulpis, sirupum

cū febr.

Tueri.

Cautio.

Varia materia.

Particula  
vniuersa  
tu pectore.obserua  
tione.

pum de praffio. vt vehementiora illa remperentur & quafi emolliantur, confociamus fupum de pomis, de bugloffa, capillorum veneris : vel de emulſiones ſeminiū maluz, althææ. Si pauperes, accipiant radicem fœniculi vnciam : glycyrrhizæ ſemunciam : paſſilatum, ficuū, ſingulorum vnciam : capillorum veneris, hyſſopi, cuiusque manipulum : coque ad dimidias. huius vncijs duodecim adde ſacchari & mellis quod ſufficit vt dulceſcat, croci ſcriptulum : coqui poterit ad apozematis vel ad ſirupi formam. Accipe ligni guaiaci vncias quatuor : vel ſaræ panilæ, aut ligni ſaſſiphras ſi ueradicem chinæ (quod maxime horum conuenire videtur ægro) ſclicunciam : ſcindatur in taleolas, & maceretur horis vnginti in aquæ libris tribus : deinde adde conferuæ violarum vel botrys vncias tres : dactylos ſeptem : ad di poſſunt caricæ : ſemen ſæ uiculi, folia adiantii, hyſſopi, ſcabiœ, praſii, ſemē vrticæ, liquiritiæ, paſſulæ : radix ireos, helenij. coque in balneo horas octo, colaturæ bibat vncias quatuor manē & vesp̄a. Aliud : accipe hyſſopi, calaminthæ, adiantii, origani, farfaræ, cuiusque manipulum : radicem ireos drachmas ſex : ſemini vrticæ drachmas tres : ficuum, dactylorum, iuiubarum, cuiusque duodecim : coque ex aqua ad ſequilibram : adde mellis deſpumati vncias quinque. Si vis vt ſimul purget, adde polypodij, ſeminiſ carthami, paſſilorum, cuiusque vnciam : agarici recens trochiſcati vnciam : foliorum ſenæ vncias tres : & cum ſaccharo fiat ſirupus : aromatizetur diareos ſimplicia drachmā doſis ſit duarum vnciarum, cum decocto capillorum veneris & ruſſiaginis. Ius galli deſcripti, inquit Meſue, conſert omni aſthmati. de hoc antea : at diſ xai vpi rā uad. Accipe radicem ireos, ſeminiſ carthami, cuiusque ſemunciam : ſemini vrticæ drachmas tres : pulegij, ſummitatum thymi, hyſſopi, ſingulorum ſemina manipulum : cinnamonomij ſcriptulos quatuor : leuiter tunde, tenuique liſteo excipe, ac ventri gaſti inſue. Pro ſenſibus : Accipe calaminthæ, glycyrrhizæ, hyſſopi, pimpinellæ, pulmonariæ, roſiſmarini, omnium ad libitum : baſilanti ex aqua, & cum melle fiat ſirupus : adde ſemunciam agarici : ſumat manē. Si ſimplex remedium velis, propina aquam ſcabiœ, betonicæ vel ruſſiaginis.

& primum adde oxymel ſcylliticum : deinde ſirupum de praſſio : tertio purga pilulis de agarico, cum granis tribus trochiſcorum alhandel, & iuberibibit tale decoctam : accipe ſucci liquiritiæ, hyſſopi, capillorum veneris : piperis nigri, amygdalorum amarorum, ariſtolochiæ rotundæ, ſemini vrticæ, cuiusque ſemidrachmam : fiat decoctio. Fit eclegma ex melle, croco, myrrha, & pipere. vel radix draguntii coquitur in aqua, & conſiditur cum ſaccharo & ſirupo violato. Scilla etiam aſſatur, & cum melle & oxymelite teritur : vel cum ſirupo praſſij. Diatragacanthū cum paucis guttulis olei aniſi vel ſceniculi conſert : & conſerua enulæ : puluis pulmonis vulpis cum ſirupo de farſara : diariſ : diaphylphur cum vitello oui. Si materia fuerit admodum craſſa, ſingatur ſirupus ex nicotiana hoc modo. accipe nicotianæ ſiccæ manipulos tres : hyſſopi ac calaminthæ ſiccæ & praſſij, cuiusque ſemina manipulum : capillorum veneris ac ſcabiœ ſiccæ, ſingulos manipulos : ſiccam ſiccariū numero decem : dactylorum pinguium tantundem : ſcœnigraci, radicem apij, fœniculi, ſingulorum ſemunciam : ſeminiſ fœniculi & aniſi cuiusque drachmas tres : ſemini vrticæ ſemunciam : radicis ireos drachmas duas : glycyrrhizæ drachmas decem : coque in libris quatuor aquæ, vſq. ad tertiam : & adiecto ſaccharo & melle, fiat ſirupus : ſumat bis die, manē & vesp̄e cochlearia duo. interdum radices gentianæ & ariſtolochiæ addi poſſunt. Conſerua helenij cum ſpeciebus diareos, & pauco croco, adiecto ſirupo capillorum veneris & de hyſſopo, ac ſaccharo cryſtallino. Accipe ſirupi de praſſio, de hyſſopo, ſingulorū ſemunciam, looch de pulmone vulpis & de ſcilla, cuiusque drachmas duas : radicū helenij drachmam : ſucci glycyrrhizæ, ſacchari cryſtallini, ſingulorū ſcriptulos quatuor : croci ſemiſcriptulum : fiat looch. Apud Meſuen illud Serapionis commendatur : accipe ſcillæ aſſatæ drachmas ſex : radicem lilij cœleſtis ſemidrachmam : hyſſopi, vel naſturtij, praſſij, cuiusque drachmas duas : myrrhæ, croci, ſingulas drachmas : tere & conſice cum melle : explicat alas pulmonum, ac attenuat craſſā. Si ab initio vocaris, præſcribe gargariſma calidum, quod materiam affluentem arceat, vt radicem cypeti cum iuiubis, ficubus, dactylis.

Sirupum  
Nicotianæ

da dtylis. Constantinus Africanus ex Ioanne Damasceno ita præscribit: accipe caricas quinquaginta, iuuibes centum: aquæ libras nouem: coque vsque ad tertias: colaturæ adde sæpæ semilibram: & sacchari libram: & fenugreci manipulum: hyssopi pugillos duos: spicæ drachmam: fucus sex: fiat decoctio ad libram: colaturæ adde mellis puri vncias quatuor. Quidam sabinam coquunt, basilicum, rutam, prassium, semen maluæ, anisum, cum reliquis pectoralibus. Quidam iubent vt oleû pistachiorum semper cõineatur ore. Hoc præclare ad expectorationem facit: accipe sirupi capillorum veneris vncias: croci semidrachmam: misce ex æquæ, vt discrimen nullum appareat, ita mel ex scilla cum nucleis pineis: adde looch de pulmone vulpis, & sanum dictum looch. Accipe sanguinis suilli recentis, carniû limaciæ, cuiusque libram: pulmonis tres vulpium: carniû bubonis vncias octo: distilletur ex his aqua in balneo: hæcque aqua ore teneatur, ac sensim deglutatur: & ex ea bibat vncias tres, cum sacchari drachmis tribus, & croci grans octo: & adde sanguinis bubonis siccati, & pulueris pulmonis vulpis, cuiusque scrupulum: sumat hæc quinque horis ante prandiu. Accipe mellis virginci purgati vncias tres: manne recentis & pinguis vncias duas: iulapij capillorum veneris vncias: auri puri folia duodecim: misce in mortario: teneat in ore, ac sensim deglutat. Mel sic purgatur, reponitur in vase vitreo cum est liquidum: & quouis die spumam aufer. Quadraginta diebus hoc vitatur, Accipe aquæ optimæ libras triginta: coque ad dimidias: tunc adde cicurum rubrorum vncias sex: sinapi in linteo ligati drachmas duas: macera loco calido horas viginti quatuor: dein abice sinapi, & coque ciceres dum aqua redeat ad vnam libram: exprime ciceres & aquam per lintheum spissum: sume vncias sex cum scrupulo croci, sex horis ante cibum id agat, nec exponat se frigori, absit cruditas ventriculo dum vsum huius init. Sirupi nicotianæ vncie adde liquiritiæ pulueris sæpæ scrupulum. Scillæ extrahe meli-  
ginem aquâ vitæ, evaporando extrahâ: da eius scrupulum cum melleo. Sumat tandem cotidie semidrachmam pulueris pulmonis vulpis, cum sirupo de nicotiana,

& pauco mithridatico: nam his opus est vt pulmo robur ducat. Sorbetur etiam fumus siccorum foliorum nicotianæ fistulâ ad id comparatâ. Iteur etiam vulpis siccatum commendatur: talia enim attenuant, aperiunt, discutiunt status. Sumat interdum sulphuris viridis grana sex ex ovo: ita etiam diaphysum, & diamusum Mesues sumuntur. Attamen, ex Oribasij sententia, laudamus medicamenta secantia, quæ non potentissimè calefaciunt: quale est oxymel scylliticum, & scylla assa, cum melle trita. vel radis cocta ari, & eodem modo concinnata. Vel mel scylliticum, cum decoctio hordei, glycyrrhiæ, passulæ, & thymi. Oleum etiam terebinthinæ in pauca quantitate fumitur: sed ita extillari debet vt tradidimus libro nostro Methodi primo. ita etiam oleum sulphuris acidissimum, cum aqua sarsæ, ac sirupo capillorum veneris, adiecta pauca copia radicem conditiarum enulæ. Decoctum ligni salsapæras hic maximo solatio esse solet, si addantur pectoralia frigidiora, vt cõserua violarû, & talia. Goziaci decoctum potens etiam ad hoc malum esse. nam mit-  
tenes partes roborat, & ad centro ad periphæriam ductum humorum vocat. Sumat cotidie terebinthinam, a semidrachma ad semunciam, cum puluere hyssopi vel prassij: & superbibat decoctum pectorale. vel theriacæ vitatur aut mithridatio, vel aurea alexandrina, ad robur pectoris: & vino iuniperi. Extrahatur in aqua vitæ ros solis, adde dactylos, passulas, liquiritiam, prassium, semen borragis, & crocum. Accipe sæpæ parillæ vncias duas: conseruæ violarum vncias tres: dactylos septem: coque in duplici vase ex aquæ libris octo. Cum propinabitur adde parum croci. Accipe aquæ roris solis cochlearia duo: vini bastardi cochlearium vnum: sacchari crystallini semunciam: oui vitellum: ferueat ab igne: adijce parum panis hordeacei, vitatur manè pro ientaculo: Fiat pilula ex thure, eam sumat dormiturus. Accipe sol. mellissæ & prassij, cuiusque semimanipulum: conseruæ rosarum vncias tres: theriacæ optimæ vncias: infunde aquæ vitæ libris medicæ. sumat eius aquæ cochlear, ac fudet: id agat biduo. repere post hebdomadam. Si puer fuerit qui cum asthma cõsistatur a materia frigida, exhibeat ei mel cum myr-

rhâ. Si materia fuerit calidâ; accipe feminis papaueris albi drachmani: tragacanthi semidrachmam: feminis cucurbitæ drachmastres: contunde omnia, & cum decocto sebesten fiat liquor. Confice diatrachanthû cum succo farsaræ, misce mel cum semine lini & croco. fiat linctus. Râs dracuntij cocta in aqua hordei, pistetur cum saccharo & sirupo violato. Coque aliquid guaiaci cum foliis lauri, radice helenij, prælio, & passulis corinthiacis. Sed iam manum de tabula sollo: ferraginem prolixam medicatarum scrum, earumque non ex triuio, habes: tu variè misce, ut laudent varæ Indicationum circumstantiæ. Iam ad ea quæ foris ad mouere licet venio.

Feri.

9 Syn.

Commendat Oribasius pectori ad mota attrahentia: ut si spuma nitri cum iride cribro tenuissimo traicta oleo excipiat, & affricetur. Ego soleo sumere ceram albam & butyrû recens, æquali copia: his liquefactis adicio tales pulueres: indeque emplastrum factum pectori ad moueo. interdum addo quid olei rutæ & lilini. Quin dropax Pauli, adiecto melle anacardi, admouetur (sutura coronali (quando inde manat malum) ac plurima aqua extrahitur. loco mellis anacardi licet vi cantharidibus vel euphorbio. & pro erthino misce granum vnum elaterij in lactis vnciis tribus. Capiti admouetur etiam sacculus ex fursure tosto. Thoraci autem impone olea & vnguenta calida, ut irinum, anethinum, rutaceum, cum adipibus: & oleum amygdalinum, chamæmelinum, keirinum, laurinum, cum mucagine scœnugræci & althææ, & butyro, & cum croco. vnguentum Agrippæ. Accipe olei amygdalini dulcis, butyri recentis, cuiusque vnciam: succi aranciorû semunciam: aquæ vitæ drachmas sex. Accipe olei iasmini vnciam: mucaginis feminis althææ & scœnugræci extractæ in aqua scabiosæ, singulorû drachmam semissem: cum cera fiat linimentum. Balneum sulphurearum aquarum his confert. Hoc Mesues probum est, nam marurat & lenit, accipe ceræ eitrinæ vnciam: olei keirini semunciam: adipis anatis & gallinæ, mucaginis feminis scœnugræci, & linii: myrrhæ: cuiusque drachmas duas: fiat vnguentum, myrrha exacte puluerisetur, & miscetur cum mucagine, dum dissoluatur in ea. Oleis etiam indimus semen vtri-

cæ, calaminiham, helenij radices, anethû, draconium, styracem, & talia. Fimò thoracis regio fricetur linctis. vniui adipe etiâ vtimur. Si materia sit calida, accipe olei violati vel amygdalini dulcis vnciam: mucaginis feminis psyllij drachmas duas, cû pauca cera fiat linimentum. Caucant nutritrices ne puerorum huic passioni obnoxiorum capiti igne & tegumentis calefacti, & ab ingluuie abstineant nutritres, vsumque aromatum & vini fugiant. Auenzoar capiti inspergit caryophyllos, cinnamomum, macem. Balnea tepentia, non calida laudantur: sicut ex sulphure cum chamæmelis, & stœchade. non fudet in his. Fiet suffitus, quo ex ore eliciatur aqua; accipe sulphuris viridis drachmas duas: sandarachæ drachmam: cum gummi tragacantho dissoluto fiant trochisci: imponat vnum carboni, fumumque excipiat. Iam, hanc siccitatem pulmonibus conciliat suffitus & fumo niofianæ siccæ, quem hauriunt fistula in rem hanc facta. Gentilis tamen mirè commendat suffitum ex arsenico præparato: ita etiam ex sulphure præparato. Tandem venimus ad thoracis picationem, & sinapismos: quin ad cauterium, quod medio pectori inurimus. Iam ad victus rationem abeo. Aerem fugiat frigidû & humidû. Differtur interitus, dicit Aretæus, opere conficiendo, aut lanis elaborandis pulmo incalcescit, & accenditur, quemadmodum calcis opificibus, aut ærariis, aut ferrariis, aut ignis in balneis excitatoribus. Primis diebus tenuiter: saturitas his mala, dicit Mesues. postea tamen, quia in diem excurrit malum, liberalius habeatur. Vniuersim, inquit Rases, & crassorum & acidorum, & austerorum vsu ægrotus diligenter arcendus est. quin à valde calidis, frigoreque potenti excellentibus abstinere, nam inde crassescunt materiæ morbificæ. Cibi coquantur cum hyssopo, scœniculo: & quasi oxymelitis vim gerant iucula. Sitque victus extenuans, calidus moderate, & siccans. Si à pituita natum malum, condiantur cibi melle, petroselinum, thymo, calaminta, & maximè hyssopo. At tamen antequam expectorato madece-

La pueri.

Diata.

Cautio.

dabimus lac melonum cum amygdalis dulcibus extusum: cum sirupo de pomis, vel de boragine. Carnes, cum eò ventum sit, commendantur vitæ: nam asæ expectoratum impediunt. Lufculus tuoque extenuantia, vt rufflaginem vel eius radices coniusas; foriter dein exprimantur: hoc mirè confert: aliqui incoque passulas, iujubas, dactylos, ficus, aut talibus ventit pullorum infarciatur, vel calamintha & hyssopo, & reliquis. Si adsit siccitas in pectore, istic vsus lactis maximè commendatus est ab Aretæo. Puerorum cibus mel-le conditur: vel anielæ sumat mel. Mel-litici cibi plerumque hic viles, nisi æger sit picrocholos vel megalosplachnos. Ius concedatur pulli, in quo ciceres coxere. Vt breuiter dicam; Multi curantur victu tenui, vsu mellis, & decocto guaiaci cum hyssopo vel rhyno. Sic aer clarus, à paludibus semorus, siccus, apricus, insolatus. Montanis vtatur auculis, fugiat vsu crudorum fructuum, piscium & leguminum. Memoriz hæreat illud, parentis tibi & potus curat asthma. Potet sirupum crystal-linor sacchar ex decocto sebesten, si materia morbifica calet. Alioqui vtetur mulsâ, dein vino tenui dulci, si febris sit expens. Mulsâ etiam conquisit cum hyssopo vel prassio. Exhibetur etiam vinum enula-tum. Præstaret tamen, initio vti solo de-cocto glycyrrhizæ, hordei, & passularum, vbi tenuis materia in viua est. Aqua hor-dei cum prassio, adiecto melle, vtilis, vbi materia est crassior. Exercitium subita-neum vitet: nam plurimè iuxta interiere. Fi-cetur manè etiam thorax. Cationibus se oblectet. Dormiat elato thorace, quasi ses-sili quodam situ, nam ita recreabitur pul-mo. Et dormiturus, capiti aspergat pulue-rem caryophyllorum, iereos, & santalo-rum. Fugiat iram & mærorem. Iuber Mesue vt id studium habeant, quò alius emollescat, quare vrantur decocto galli veteris cum carthamo, vel agarico, & poly-podio: adice epithymum, iridem siccam, calamintham, organum, vel hyssopum, cum passulis. Vel initio mensæ detur car-thami decoctum ex iusculo carni. Et oua forbilia, boryrum, aut oleum amygdali-num dulce cum saccharo vel melle. Vsum ineari sicuum, & passularum. Purgetur vel vomat eo tempore, quo affligi illi soleat.

ne est. Saltem bis cottannis purgetur: & decoctis, aliisque rebus pectori robur ad-datur, quare vtetur aliquot diebus deco-cto salsaphras. Poterit quin semel septem dierum spacio purgari his pilulis, quas ves-peri cubiturus sumat: accipe pillularum as-fœieth Auicennæ, drachmam; garici tro-chiscati, rhabarbari cuiusque scrupulum: cum sirupo violati fiat massa: sumat semi-drachmam. Flatuum causa vtatur diacy-mino aut diaspolicico. Hactenus docui-mus quo modo intercalari illo tempore, quo silet paroxysmus, huius mali causa domari possit. Nec sine periculo, flagran-te morbi exacerbatione, vsu iam dicto-rum remediorum inear: nam, auctore Galeno, In paroxysmo potius est blan-diendum, quàm curandum: tunc enim mi-nimè siccandum, ne suffocentur ægri. Hoc itaque tempore ablint cuncta purgantia, ne materiæ copîa irruente subitò in pul-mones, suffocentur. Potet tunc aquam hordei coctam cum passulis, iride, hyssopo. Si tenuis sit materia, aquæ hordei ad-ice penidia, & liquiritiam. Parum mosci dissoluatur in aqua calida, in qua coxit se-men ocymi, & per infundibulum accipiat fumum, & mox potet aquam illam, adie-cto sirupo capillorum veneris. Natisbus & humeris, & locis supra renes paululum & scapulis da cucurbitas. Frica pedes & liga. Vescicatoria admoue sutoræ vel ceruici, vel ponè aures, ac palmæ manuum, vel carpo: hæc enim maximè reuellunt tuentem hu-morem. In humero fici fontanella. In an-xia respiracione da mosci & ammoniaci, singulorum grana duo, ex oxymelitis sim-plex vnctis duabus. Cauterium medio pec-tori inustum, extremum remediū est. Sit in aëre libero, ac frigore quodam temperato. Solue ab omni strictione: & mensæ mani-bus incubet. Potet aquam hordei, cum cro-co, saccharo, sirupo violato, & puluere pul-monis vulpis, vel ex hoc parum ore conti-neat, & sensim riget interna. Si æger ad eò à difficili respiracione opprimatur vt mo-ri videatur subitò, da croci semicriptu-lum, cum vini maluatici duobus cochlea-ribus. Sed nihil magis iuuat quàm auctori-tatibus studere: quare suppositorium aëre præscribe: nam dum stando respirant, ene-mari locus vix esse potest. Misce cum mel-le trochiscos alhandel & saleem. Si locus

In Pa-roxyfmo  
quomodo  
irascigen-dum.



sit, da talem clysterem. Accipe decoctum centaurei minoris & maioris, forluum, chamæmelorum, & aristolochiæ: cui adde mel rosatum solutuum, oleum amygdalorum dulcium, & chamæmelorum: accipe solū decocti vncias sex: adde diaphenici drachmas sex. Ille clyster discutit, euacuat, & euaporat. Caue à pharmacâ; ne materia mora, & in pulmones irruens, suffocet. Mesue quidem in plethorâ venam basilicam secat, in ipso paroxysmo: sed, dicit, si signa aliorum humorum appareant, superseceant à purgatione, vomitu & enemate, dum paroxysmi vehementia abierit, dumque expectorare inciperit mitigata pepasmo, dumque melius spirat: tunc caue hæc in vsum docere oportet. Quare, auctore Mesue, à vomitu abstine: nam hic suffocat. In vomitu ea materia quæ in ventriculo concepta est vacuatur quidem, sed non ea quæ paroxysmi auctor est: & dum ea vomitu forlū ferrur, comprimit asperam arteriam: vi suffocet. Versus augmentum fricetur pectus lineis asperis, quo se recludant pori. Illinc oleo amygdalino dulci, cum butyro, misce parum croci. Si flatulenta sit materia, accipies mosci semigranum: croci scriptulum: vini albi calidi semicyathum. Si intra quadraginta dies, inquit Mesue, paroxysmi & declinauerint, in scapulis fiat scarificatio ad motus cum eucubitis: dein da hieram & clysmata acria. Sin longius excurrat paroxysmus, sinapismus admoveatur pectori. Suadeo, si paroxysmus exurit in quartum diem, ut curvabitur inter humeros ponantur cum scarificatione: & dropaces vel sinapismi & vesicatoria pectori inponantur. Q. Horatianus emplastrum pectori imponit ex nitro, pipere, abrotano, castoreo, & Cyprino vel laurino cerariorio. Foculi etiam pectus potest decocto saluæ, chamæmeli, ex vino non stinguente: deinde illinc oleo amygdalino dulci. Flabellis illiretetur ær. Vult Cælius Aurelianus ut pectus molliusculè legatur lanâ post forū: ex oleo amygdalino, violaceo, & lillino calidè. Manus & prædes asperiusculè fricentur. Cibo non repleantur: id enim opprimat heracem: quare eo tempore sit vultus ienuissimus, da ignem nullam, vel oxymel sin plex: vel his adde aliquid succi pisonæ. Vel vtiatur ceruicis colla cum

ficibus paucis. Supinus vicietur decubitus: nam viscribit Aretius, strangulationis periculum adfert. Scutulum mali murgi æris serenitas, vitæ sobrietas, copiosis quies. In vigilijs accipe theriacæ optione semidrachmam: vel scriptulum: Philonij Romani grana sex: croci grana tria: misce: capiat horâ somni. Iam adiuco quædam abusu remedia. Vfus observatum præclarè in initio maturantia remedia præscribit, ac intercalari die quarto vel quinto præberi pillulas coccias. Terribi, ut hæc vtiatur, Accipe seminum quatuor sigidiorum maiorum, amygdalorum dulcium, pineorum, singularum vnciam & sensillum: feniculi, anisi, hyssopi, passij, capillorum veneris, calamini hæ, cuiusque semini vnciam: seminis hyoscyani albi drachmam: seminis papaveris albi drachmas tres: liquuntur rasæ, seminis malux, singularum drachmas sex: croci drachmas duas: opij scriptulum: clibani vel styracis calamitæ drachmas binas: conterantur, & misceantur cum mellis & sacchari duplo ponderis omnium: reconde in vase vitreo. Dosis vncias ad binas drachmas: ponat sub lingua & transglutiat: vel misceat cum decocto hyssopi: & ieiunet postea horas septem. Fermentetur bene ante vsum. Noctū ponat drachmam vnam sub lingua, & transglutiat. Viatur pullis coctis cum spinachis vel beta, vel cum saccharo & croco, passulis, & pauco aceto. Et si corpus sit plethoricum, post quartam purgationem secabatur venam quidam Arabes. dicit Mesue, ut Isaac Heben. Si crassa est materia asthma, vtiatur siupio de passio, quem describit Mesue, sin ea tenuis, de iulubis. Semel singulis septimanis vtiatur tribus pillulis assaïeth, cum rhubarbo & agarico: dein vtiatur eribinis ex succo nicotianæ. Alij purgationem instituant ex diacanthamo, vel diatribiū cum rhubarbo. Deinde sorbent suffium nicotianæ: & caput fricant tali seculo, accipe radicem acori vncias tres: milij vncias duas: torrefiant in sanguine: fiat sacculus, ac totum corpus siccant hac arie, Accipe ligni guaiaci libram: quæ libras duodecim: coque vltra dimidiat: in fine ce thonis aduice betonicæ, capillorum veneris, cuiusque seminis apulium: pelypodij vncias duas: passulorum vnciam: seminis carthami sesquiuunciam: manè bibat vncias octo,

Ad vigili-

Empirica.

Cap. de asthma.

&amp;c

& sudet: vesperi sex uncias potet. & tenuiter videret. Pro potu, accipe ligni guaiaci uncias sex: passulorum corinthiacarum uncias duas: aquæ libras duodecim: macera horis decem: coque ad dimidias, & colentur: quibus adde sacchari albißimi uncias quattuor: sumat pro potu, dum sumitur decoctum. & singulis octo diebus purgetur mannâ ex decocto pectorali. In viû guaiaci perennet dies viginti quinque. Haustus fumus nicotianæ potissimè siccat cerebrû. Fiat magistralis sirupus ex radicibus polypodij, enulæ, farfaræ siccatis, ireos, & althææ; folijs farfaræ, pulmonariæ, nicotianæ, calaminthæ, satoreiæ, semine viticæ, malux, passulis, iuinibis. coque ex mulla: & cum saccharo fiat sirupus. adde vel saccharum penidiatum. tempore vsus adice parum olei sulphuris: da cum mulla. Huius etiam sirupi uncia, remisce specierum diareos calidæ Nicolai scriptulos duos: pulueris pulmonis vulpis scriptulum: misce: vtantur pro celegmate. Illud etiam probum est. Accipe aquæ radicis helenij libram: incoque ei gentianâ, aristolochiam rotundam, thymum, pulegium, origanum: colaturæ adde olei sulphuris tantum quantum satis est vt leniter acescat. Oribasius cõmendat aristolochiâ rotundam, ex aqua potam. Grautissimum remedium hoc est, & nuper natum, Accipe aquam vitæ, cui iniice rorem solis: hæreat in ea dum optimè in flauedinem tingatur aqua vitæ; deinde inclinâdo cola, ac iterum nouum rorem solis inde; ac id sæpius repete. tandem quæ velis pectoralia adice, da stylos, passulas, liquiritiam, anisum, crocum, & talia. Potio theriacæ ex aqua nicotianæ distillata. Sumat manè ex ovo flores vel oleum sulphuris. Vel accipe sulphuris viui semilibram, fiat puluis subtilis: infunde aquæ farfaræ horas viginti quattuor: & cum eadem aqua abluatur: & cum sacchari optimi copia decenti fiat electarium: Sumat semunciam manè & vesperi in ingressu lecti: & in ipso paroxysmo. Vel immitte aliquid illius sulphuris aquæ vitæ; & huius guttulas fume cû ovo. Castoreum etiam potitur cum melicrato. Quidam alternis diebus fumunt semunciâ terebinthiæ claræ. Pomum in quo coxit thus, mirum in modum confert. Accipe cutiones ( ita Latinus author Marcellus

Empiricus vocat illa animalcula quæ sub madidis tectis stabulantur: millepedes appellant alij cærules, nos *psilbedde*, Galli *eloportes*, Itali *porcellesi*, Germani *esel* ) hos in olla calcina dum albefcant: fiat pulvis, melle excipe: ante & post cibum exhibe cochlearium. Mirificè hoc confert. Vsu etiam doctus sum, si his adieceris milij solis semen, molliter ab hoc atteri calculem: renum & vesicæ. nescio quid pinguedinis de se fundant illa animalcula, etiam in puluerem exsiccata. Conquat æqualem partem succi scillæ cum melle, & id lingat. Hoc sequens Aëiū est: accipe opij drachmam; sulphuris viui, plantaginis, feminis hyoscyami, succi radicis dulcis, styacis, myrtiæ, thuris, terebinthiæ, singulorum drachmas duas: croci drachmam vnam: cum vino fiant trochisci, pondere drachmæ vnus. vnum bibat: præbet ægrè spirantibus doloris allevationem. Sirupus de ligno alcei descriptus Capite De Palpitatione cordis. Ammoniacum cum pice humida ex melle. Myrtha ex ovo. Hyssopus, prassium, ruta decocta ex hydromelite. Semen viticæ ex melle. decoctum centaurei Mefus. Cutiones linteæ excepti vino macerantur: exprimitur, & potatur: ilico iuuat: hoc etuo Grecis familiare remedium. Diatrageanthæ tabella irrigata aliquot guttis olei sceniculi. Accipe florum violarum, radicem glycyrrhiæ, summitatum lupulorum, cuiusque manipulum: foliorum senæ uncias duas: anisi drachmas tres: coque ex hydromelite ad uncias duodecim: adde colaturæ sacchari crySTALLINI uncias duas: sumat uncias duas. Accipe crocum ad pondus scriptuli vsque, mosci granum dimidium: bibatur ex vino optimo calido. Sed si hysterica fuerit mulier, loco mosci pone castorei scriptulum. Folia ocymi & crocum infunde aquæ vitæ: da cochlearium. Sumat manè ouum liquidum cum drachma puluerisati pulmonis vulpis. Conditæ radices ireos, vel helenij. Radices ficæ ireos, valerianæ, & farfaræ, coctæ cum passulis, liquiritia, semine fecuridacæ & fœniculi: adde botiyn, hyssopû, veronicam matrem, scabiosam; adde parum croci tempore vsus. Pinci ex melle. Fiat electarium ex pice & melle. Semen nasturtij bibitum. Porrum capitatum ex melle lingat. Aqua vitæ cum iolabio violato. Gutta ammo-

niacum oxymelite præbet. Q. Horatianus, vel cum callosiore pulvere. Idem decoctum præscribit ex semine sænugæci, cū passulis, & tota viridi. Sunt trochisci, dicit Q. Horatianus, magna approbatione diffamati. conscriuntur sic, Anisum, sulphur viuum, guttam ammoniaci, castoreum, & melanthium, ex æquo omnia, tusa ex aqua miscentur, & fiant trochisci: vnum diatrium ex oxymelite. Accipe aquam hordei, cui incoque viticam cum semine eius, adde semen nasturtii, & folia calaminthæ: vbilenta est materia, adde ficus, & radicem bryoniæ, colaturæ adde mel. Pauperes videntur bacis lauri cum melle. Laurus, inquit Mesue, cuiusque baccæ, & oleum, omni ratione admodum. Audite quæso quid dicat Mesue, Ad superfluum humiditatem pulmonum & pectoris, inquit (puto illum loqui de pulmonibus qui defatigati longo affluxu viscidæ materiæ tandem putrilagine ferè contrahunt) accipies arsenicum tritum ac iemixtum cum vitellis ouorum; deinde accipe ferulam, & incide eam per taleolas rotundas, easque illine eo medicamine, & siccetur: sed prius illine, tempore vsus, cum seuo renum caprarum vel boum. Fiat suffitus ex iis, & recipiat fumum ex infundibulo. Hoc agat aliquot dies, ter de die: id siccet, & sanet. Verum si inde siccantur nimium pulmones, humescant vsu sirupi violati & decocto ficuum: dein repete suffitum, & non negligere eum, quia sanat, inquit Mesue. Idem agit, inquit Mesue, sulfur citrium, si remisceatur cum æquali paste arsenici, & cum seuo caprarum fiant trochisci: ex his fiat suffitus. Eodem modo committitur arsenicū cum myrrha & croco, huiusque trochisci ex his cum seuo renum caprarum aut boum. Decoctum galli veteris cum hyssopo & carthamo. Hermes, vt scribit Mesue, hoc mirabile proposuit ad asthma & tussim, Accipe puluerem siccorum foliorum sabine, si nique ita comminuta vt aleool, vntiam vnam: iunge cum buiyræ sæpius loti semencia: mellis colati quod satis sit. Sumat binas drachmas, velumat cum decocto passulorum & hyssopi. Semen nigellæ ex melle linctum. Accipe folia brassicæ rubræ, scinde: poculo inde: coque in balneo. Succum mane bibat: sed cotidie coqui reus debet. Accipe ammoniaci scriptulum

vnum: fiant pilulæ tres: sumat cum ovo forbili. Si causa sit frigida, sumat croci scriptulum: mosci semigranum: vini albi optimi semicyathum: calidè bibat. Accipe succi ocimi semunciam, parum bolis Armenæ, potet. Commendantur etiam hæc, olei philosophorum aliquot guttulæ: mithridatium, cui accessit parum philonij: confectio de musco, aromaticum naidinum: athanasia magna, & diaspulphur.

## CAPVT V.

DE PERIPNEUMONIA: quæ etiam Pneumonia appellatur. Latinis Pneumonia, vel Inflammatio Pulmonum.

PRIMO viscus est plurimis tædiis expositum: nam attrahendi causam in se continet: in eius enim medio æstiosissimum totius corporis viscus sedet, cor, viæ ac spitandi principium. Id quoque pulmone attrahendi frigidiæris desiderium inicit, siquidem ipsum incendit. Quare hoc viscus & attrahendo sibi non raro malum accersit, & materias exulatas ab aliis partibus facillimè accipit, eoque fit, vt sæpè grauissimis morbis implicetur. Inter quos non minimus est Peripneumonia, quæ est phyma phlegmonodes, quod facit rheuma concitatum, ac in pulmone consiliens, febri consociatum. Dicitur esse Phyma phlegmonodes. Ideoque adest intemperies calida materiæ consociata, quæ pulmones tendit. Phlegmonodem tumorem dixi, talis autem sanguineam materiam morbosificam hanc innuit esse: etenim bilis non potest hære in tā raro corpore, ideoque raro à bile nascitur. Imò raro primarius affectus est peripneumonia, sereque alij morbis est succedanea: nam faucium & oris tumores huc abire solent. Si hæc primaria affectio fuerit, fit à sanguinis tantæ copia, vt à vasis in subsistantiam pulmonis incidat. Sed plerumque ex valentibus in pulmones distillationibus, vel anginâ, aut suspirio, aut pleuritide, aliusve morbis contrahitur. Præterea diximus in definitione, Quod facit rheuma concitatum: insuit enim materia sanguinea quæ, mutata ad naturam biliosam, pituitosam, aut melancholicam. Non aliter ac in pleuritide

Definitio,  
& eius  
explanatio.

4. De  
caus.  
Ful. 12.

attamen

stramen id differunt, quòd, ut plerumque pleuritici soboles est sanguinis biliosi, (rarò pituitosi, crassij) ita rarò pulmonis phlegmone nascitur ex bilioso sanguine, verum plerumque ex pituitoso sanguine. Nam membrana costis intertexta est densa: at laxus pulmo; hincque est quòd densior succus membranae illius corpus peruadere nequeat: at is per pulmones faciliè fertur. Tenus verò sanguis faciliè se traiecit per membranam: verum tenuis ille sanguis non imbitur nec inhaeret pulmonum substantiae, quamvis alioqui hos peruadat; attamen ita ut allabatur iterum elabatur. At crassior succus illius pulmonum substantiae haeret ita, ut ea tendatur. Diximus etià in definitione, Ac in pulmone consistens. Scribit Caelius Aurelianus veteres vehementer de sede affecta conflixisse. Diocles solas venas pulmonum affligi defendebat: Erasistratus arterias: Herophilus arterias & venas simul: Asclepiades verò pulmonum bronchias: Praxagoras lobos pulmonis spinæ vicinos: Demetrius Herophilus voluit cum Celso integros pulmones affligi. Soranus volebat pleuritum esse, cum pars pulmonis affligeretur. Nos scire debemus duabus partibus expleri pulmonem totumque absolui: dextra scilicet & sinistra, mediana quadam linea interceptæ, duabusque alis velut fibris instructæ, ac tribus intertextæ vasibus: antè quidem arteria venosa: post, vena arteriosa: inter quas media decurrit arteria aspera. Omnibus in pulmonem ramosè distributis usque ad illius tunicam à sacroscali ortam, neruulosque à sexta coniugatione sortitam. Affirmamus itaque carnem totam pulmonis inflamari, modò in hac, modò in illa parte, vel totum corpus pulmonis id pati, turgentibus etiam vasibus. Febri consociatum diximus in definitione. Nam Celsus dicit, magna febris adest. Sanè ob viciniam cordis non potius est ut sit febris expertus. Hæc autè maior aut minor erit, ut fuerit ardor materiae morbificæ. Hæcenus definitio explicata est, iam ad causas venio. Veram peripneumoniam facit rheuma in pulmonibus consistens sanguinis, multa & effera bile perfusi, proptereaque temperamento calidissimi, substantiâ tenuissimi, & qualitate æcerrimi. Quibus ex causis anadrome fieri solet, omnisque organus concitari: tum

maximè ubi ad vim concitiam efficiens causæ, accedit suscipiens præparatio. Quare fieri potest ab influente materia per vasa: proptereaque à quaque materia sanguinea nascitur: sed facilius à sanguine pituitoso. rarò à bile in tam raræ texturæ corpore provenit, nam tenues labitur ea in auras. Affluit autem hic sanguis vel à corpore cordis, luxuriante sanguinis copia: & si, corde calidissimo, pulmo obruatur materia illabente à capite, à calore inardescit hæc materia, ac peripneumoniam facit. Provenit etiam peripneumonia, eum à synaetismo sensum materia aggeritur, ex nutriticus pulmonum copia: & hæc non subito premit, sed sensim ingrauescit. Fit etiam à pleuritide eò translata: rarius ab angina: ab asthma fit etiam cum cunctando in pulmone pituita putrescit: sed bilis, ut dixi, non ita laxet laxo in pulmonis corpore. Notat Auenzoar, pulmones interdum ex viscosa quadam sanie laborare, sine apostemate, ab irridente pituita, quam consequitur etiam difficilis respiratio. Nascitur interdum peripneumonia à virulenta materia, ut à lepore marino. Sæpe fit à catarrho: dum enim materia præcipitatur ex capite in pulmones, si euenit ut æstu incanduerit cor, sanè ab illo calore phlegmonem expledescent in pulmone. Quod si catarrhus non adfuerit, non ita faciliè inflammantur pulmones, sed potius hec tæ febris exiliens à squalido illo cordis ardore. Quare Galenus scripsit, Si catarrhus non sese consociat, potius pulmonem hinc fatigabit phlegmonodesque ducit afflicto, vel erysipelas. Quare Galenus videtur maximè causam eius reducere ad catarrhū. Vera tamen peripneumonia quæ per se affligit, fit à tanta sanguinis copia, ut à vasibus in pulmones ruat. hæc pueri non laborant: nā ante pubertatem nulla est concitatio neque collectio sanguinis ex adfuerit à bile: nā huic ætati nulla est sanguinis redudantia, quia ad incrementū & ad nutritionem assumitur. Nulla illi etiam causa est orgasmī, ubi sanguis non est acrior nec tenuior, nec calidior. Annotat Celsus Aurelianus ab opij vel hyoscyami usu, per tussim, hoc malum inferri posse. Iam ad Differentias venio. Peripneumonia est inflammatio, proptereaque adest interperies calida; talis autem erit per se, vel ex euenit. Per se, cum

Locus afflicti.

Nelatio ex Auenzoar.

4. de locis afflicti.

Fuerit cur non tenentur hoc morbo.

Causæ.

Differ. Rationes. Tiar.

ea agnoscat sui causam materiam morbificam quæ peculiari sua natura æstuat, qualis est bile multa perflus sanguis, sanguisque purus ac purus. Per aliud, cum piovenerit à pituitoso vel à melancholico sanguine: nam talis materia à sua natura frigit, sed ex euentu, cum putredine inquinatur, euadit calida; ac ita intemperiem æstuosam profert ex euentu. Quare hæc inflammatio erit biliosa, pituitosa, sanguinea, vel melancholica. Ita à causa efficiente. Ratione verò loci operati differentias ponere licet, ut modò hæc, modò illæ pulmonis partes affliguntur, utque confedisse maxime videbitur phlegmone vel in pulmonis affusione, aut in arteriis venosis vel tracheis, & in harum propaginibus. Est hoc malum confociatum, phlegmone cum febre. Vehemens est hic morbus, plerumque in calamitatem abit: est mali moris, difficilisque iudicij. Ad signa iam proporo, ut rectè dignosci hoc malum possit. Huic malo febris adest acuta, difficilis respiratio, parua & frequens, & in spirando meteorismus, calidaque exspiratio, dolor sub omopla, qui proreptit ad iugulum & mammâ, pectoris grauitas, anxietudo & iactatio, & interdum delirium. Facies rubore flagrat, quod cerebrum impletur causis plethoricis: hinc enim malæ rubent, ac oculi tumet. Pectus, inquit Aëtius, absque dolore graue pondus habet, nisi diaphragmatondas membranas feriat illa inflammatio: tunc enim medio pectore dolent. Lingua his sicca est: expectoratum procedit nullû: vel si quid, spumofum, & interdum cruentum & biliosum. Lingua primò ex flauo rubescit: prorepente morbo fit crassa nigra, tandemque finditur, & breuitate quadam crassefit, ob membranam retractam. pulsus sæpè intercurrents est: supinus cubat, nam in latus nequit. Sedendo quasi dormire cogitur. Collum sæpè turget, à vaporum surfectione, liuet viina. Tanta in hoc malo adest difficultas respirandi, ut ægri existiment se mox suffocâdos. Non tamen æquè dolent: nam, dicit Aræteus, nervos habent exiguos & graciles, ad motum ciendû opportunos: ob id non dolent, nec, inquit, arteriæ asperæ pulmonis insertæ sentiunt, sunt enim cartilaginossæ. Attamen membrana qua obregitur pulmo duos accipit nervos sexta à coniugatione nervorû, qua-

re grauantem quandam dolorem sentiunt. Calor foris non ita æstuat, at grauis intus flamma vrit. Magis tussient hic quàm in pleuritide, ab irrita contentione & concussione thoracis, quem ichor lacessit exudans ex inflammata parte. Malæ autem rubent, quia pulmonum anathymiasis tussiendo expressâ, ibi subsistit propter angustiam venularum: & his se iungunt spiritus, & sanguis. Pulsus adest mollis, non durus, non ferrinus; inæqualis quia in angustum premuntur arteriæ, nam pulmones comprimuntur à phlegmone. Magnus quidem videretur pulsus, verum languidus est, & vndosus, maxime si pituitâ sanguis imbutus fuerit. ratione aut phlegmones redditur magnus, hæc enim artetarum tunicas irritat. Quod expuitur, inquit Rases, spumofum est. Si expectoratum rubescat, à sanguine natam peripneumoniam denunciat: si flauer, bilem loquitur, ut albicans pituitâ: nâ nigricans, melancholiâ pronunciat. Accedunt etiâ familiares notæ ex habitu corporis, & dominâtis succi, unde facile colligas quis humor ibi in vitio sit. Perspectâ à morbi huius natura, iâ videamus quo modo adimi possit. Ratione intemperiei calidæ oritur indicatio refrigerandi intemperiem calidam. ratione materiæ quæ iam influxit, nascitur indicatio eâ auferendi: ratione verò influentis, & fluxuræ, reuellendi. Sed quia non licet partem euacuare aut roborare, nisi primùm habita fuerit prouiio de toto corpore, hoc primùm agendû. Si itaque tumor hic afluxit ex cumulo biliosi sanguinis: & si repletionis & inde affectionis natæ remediû est repletionis propria euacuatio: nascetur Indicatio euacuandi id quod inflammationem facit talem, quodque laxitate adfert, ac in primis doloris remissionem indeque partis obfessæ redintegrationem. Præterea id quod dolorem facit ut foras euocetur: quare expectorato erit studendum: nam id salutarum peripneumoniarum est epiphænomenon. Et ab omni phlegmone exudat tenuior portio humoris, modò densitas partis obfessæ id non impedit. Ita pulmo inflammatus humiditate quandam effundit in spacia sua interna, quæ sunt arteriæ bronchia reâ auferenda est expectorando. Meatum spirabilem laxitas etiam præclarè ad salutem facit, quò sumidi vaporis

SIGNA.

Hæpoc.  
lib. 3.  
De mor.  
bu.

Signa diff.  
serenitatis.

Indicatio  
nes curan-  
tium.

etundam

PAO-  
BRUSIS.

abundantia à corpore perspirabili euacuetur. Nam in Coacis scriptis Hippocrates, coacta corpora celerius à pleuritide & peripneumonia intercunt. Sed videamus iam num his Indicationibus satisfacere possimus. Vt verù dicam, vix & ne vix quidem hoc à morbi malignitate obtinebimus. Hoc sanè genus morbi, inquit Celsus, plus periculi quàm doloris habet; & plerumque in calamitatem abire solet. Nam occupatus est hic pulmo à materia quæ tendit ac opprimit meabilem anhelitus viam. Hæc autem materia aliè est immixta carni pulmonum: est quæ cordi proxima: & propterea validis opus est remediis & calidis. Verùm talia ad inflammationem faciunt; nec sine motu violento expectorari materia hæc morbifica potest: cum, ex a dverso, inflammatione parti debeat quies. Propterea Galenus vnicam speciem salutis agnoscit virium robur: nam tussiendo libido sensim vires atterit. Quin etiam datus cibus morbum inflammatorium augeat: quia & febris & phlegmone à cibo exardescunt. Quare ubi vires titubare incipiunt, concludatur esse exilima; equidem à tussi fatigationem ferre minimè poterunt. Attamen, auctore Galeno & Auicenna, minus periculi adfert si à pituitoso fuerit sanguine. Si hæc inflammatio fuerit biliosa, hoc est erysipelatoses, erit periculi plena. Attamen observatum est sputum flavum paulo permixtum sanguine, in eunte morbo editum, salutariter euenire. Sed si cruentum floridum sputum fuerit, dicit Aretæus, bilioso & spumante est perniciosius. hoc enim significationem adfert pulmonem exedi. Propterea etiam pronunciat Aëtius, Cruentum sputum esse malum. Dicit quis, videtur Auicenna aduersari Hippocrati, qui scripsit, Minus periculi esse à morbo quorum causa respondet parti obsessæ, etique est congener. Pulmonum autem genuina temperies est calida, minimeque algida. Quare phlegmone à pituitoso sanguine oborta, erit periculosior, vt parte parti morbo obsessæ, nimirum pulmonibus, non analoga. Quidam respondent, discriminandum esse inter temperiem nativam partium, & inter acquisitionem earum temperiem. Nugæ. Respondemus, Aphorismum eum rectè esse accipiendum, ac ita ipse accuratè pro se respondebit. Dicit Hippo-

crates eos morbos minùs calamitosos esse, qui analogi respondent temperiei & talibus. Ex qua sententia malè inferas, Hic morbus est analogus temperiei ægri: ergo minùs periculatur. Nam vix fieri potest vt aliquis morbus reperitur, qui ratione alicuius rei non sit analogus, & ratione alicuius rei sit analogus. Vt causus iuvenem implicans humidum frigidum & pituitosum, illi quidem esse analogus ratione ætatis: non analogus à temperie. Est tamen minùs huic periculosa, quàm seni calido & sicco, cui analogos erit ratione temperiei, at illi non erit analogos ratione ætatis. attamen huic periculosior euenit. Itaque non ad vnicam temperiem solam debemus collineare, sed cuncta intueri debent. Ita inflammatio biliosa pulmonis, analoga est substantiæ pulmonis: attamen non est analoga eius compagini, structuræ, & habitui. Nā habitus esse potest mollis vel durus, rarus vel densus. Pulmones naturā sunt molles, non duri: sunt rari, non densi: sunt laxi. Si habitum inspexeris, faciliè animaduertes biliosam inflammationem minime esse analogam substantiæ pulmonū, attamen temperiei pulmonum respondet hæc inflammatio biliosa. Quare Auicenna ex Galeno, quem ibi imitatur, benè dixit, erysipelatodem phlegmonem pulmonis periculosiorem esse pituitosā. Nam licet biliosa sit con focalis illi ratione temperiei: attamen est maximè dissidentia ratione habitus & compaginis. Ad reliqua præsentia venio. A bile itaque est periculi plena hæc affectio: quamvis aliqui bilioso ex sanguine nutriatur pulmo. Sed symptomatum magnitudine percunt ægri, ubi à bile malum hoc est, nam cor in ingentem febrem trahitur. Quidam, inquit Cælius Aurelianus, in pleuriticam passionem redeunte malo, releuati vixerunt, accedente dolore, qui illius permutationis est indicium. Sed plerumque id non fit: nam vel plurimum hi percunt morbi magnitudine. Ab angina vel pleuritide si fiant peripneumonici, plerumque septimo die pereunt vel abit malum in empyema, mox ad tabē. Alioqui his rationibus finire poteris vel per insensibilem transpirationem, vel expectorato vel induratione, quod ratio sit, vel in caput translatā materiā & ad nervos, vel per diadosin transfunditur in pectus,

kk 3

vnde

Interpre-  
ratio  
Aphorif-  
morum 34.  
libri 2.

vnde pleuritis, vel in crus deponitur, vel per  
 vrinas & aluum euacuatur, aut degenerat  
 in pus, aut in putredinem. Fluxus etiam  
 menstruum & hæmorrhoidum subsidio  
 esse solet. Expectorationum si rectè proces-  
 serint interfeceant febrem, euadent. Sin praua  
 quædam signa appareant, non ultra deci-  
 mum quartum diem viuet. Sin cuncta  
 prauitate præferant, etiam citius inter-  
 ibit, & vi prælagit Aretæus, septimo die. In  
 melius verò vergit, auctore Aretæo, si ve-  
 hemens oboriatur hæmorrhagia, vel si  
 aluus biliofus spumantibus ætæpæ feratur:  
 & per vrinas bonis ægrorum rebus mate-  
 ria hæc morbifica interdum excluditur.  
 Hæmorrhagia sanè iuuat liberalis, vbi  
 sanguinea vel biliosa peripneumonia sati-  
 gat ægrum: at in pituitosa minimè iuuare  
 solet. Hinc est quòd Galenus huius mor-  
 bi prognosin iungat cum lethargo, vbi ait,  
 In lethargo & peripneumonia non iuuat  
 hæmorrhagia. In Diarrhœa etiam opus  
 est distinctione, nam modò ad salutem,  
 modò illa ad interitum apparet & facit: si,  
 inquit Galenus, ea eueniat ab hepate adeò  
 vi huius morbi afflictio ac pressio vt ne-  
 queat nutrimentum ad se proleferre, nec ci-  
 bum mitigare, adeoque si cunctando in  
 ventre putrescat is, hoc immanitatem in-  
 domitam morbi arguit; nam natura putri-  
 dum id alimentum deturbat, cum eo ali-  
 nequeat; vel pressa naturæ vi, nisi morbi  
 effunditur aluiua deiectione. At in mode-  
 ratiore peripneumonia, vbi oboritur diar-  
 rhœa à signis pepasmi editis in expectora-  
 to & vrina, præclarè ea ad salutem euenit.  
 In crus deponitur aliquando hoc malum.  
 nò tamen ilico, hoc cum fit, in victoriam  
 triumphum est exitiendum: sed cogitandū  
 depericulis & iustitiam crebram esse vi-  
 cissitudinem. Et cuncta quæ aliò certis  
 locis commigrant, eò sæpè remigrant vnde  
 abierāt. Sic abscessus cruales peripneumo-  
 niæ, nisi fistulentur, palidiorum sepe in-  
 Hæstut ad ipsos pulmones. Quin frequen-  
 ter est peripneumoniæ mutatio in empyema:  
 eò nimium venit, ni intra dies quattuor-  
 decim cœperit expurgari. Nota eius est,  
 quòd spiritum salum dulcescere incipiat,  
 nam tunc fit empyema. Pleuritidi succeda-  
 nea grauior est primogeniâ. illa verò ratio  
 in pleuritidem abiit. Ex angina, vt etiam  
 antea monui, mortem iussit etiam infra

septimum diem: vel infra vigintiannum facit  
 parulentum. Si diebus criticis nullam ana-  
 catharsin habuit, sed si delirat vsque ad de-  
 cimumquartum diem: nec quicquit phle-  
 gmone hæc nec phlebotomâ, nec phar-  
 maciâ, nec diuina, nec parotide, nec abscessu  
 cruali, indicium erit phlegmonis viam af-  
 fectantis ad empyema, si antè nò fuerit ad  
 mortem fatalis, nec ægrum intra decimū-  
 quartum diem ad exitum præcipitarit.  
 Sunt autem pleuritidis & peripneumoniæ  
 dies critici tertius, quintus, septimus, non-  
 nus, vadeimus, decimusquartus. Vnde  
 scribit Hippocrates, spiritum saluum præco  
 permixtum sanguine, peripneumonici  
 incunete quidem morbo editum, salutare  
 est multumque confert: septimum verò  
 diem agentis, aut prouectiori, securitatis  
 minus est. Patet itaque hoc malum periculi  
 plenum esse, funestiusque ipsa pleuritide  
 parvis principatur, & præ vicinia cordis, ac  
 difficultate curandi: dum enim pulmo vi-  
 breet se perenni moru, fieri nequit vt facile  
 curetur. Vbi expectoratum non procedit, si  
 nomen lethalia non apparent, at tamen fe-  
 bris perseueret cum grauiate pectoris, em-  
 pyema nascitur. Quæ si non excludatur  
 quadraginta diebus, fiet tabidus, vel suffo-  
 catur: & ægrè sensim tunc sensim spirare  
 incipit. Interdum abscessus non rumpitur,  
 sed doloribus, atrophia, tussiq. ac febri pe-  
 rit. Vel ita extenuato rumpitur: ac mori-  
 tur. Senibus est lethale malum. Obseruauit  
 est, si à vena scela effluerit sanguis niger,  
 qui non congelatur, id mortis significatio-  
 nem adferre. Parotides hic lethales sunt.  
 Iuuenibus hoc etiam malū calamitosum  
 esse auerit Aretæus. Iam ad curationem  
 auerit. Quia verò peracutum lethaleque  
 hoc malum est, nam ad eū inflammatio  
 repletioque pulmonis, propterea præma-  
 turè ferenda subsidia sunt. Nam, auctore  
 Auenzoare, Dum sanies nondum proue-  
 nit, curari poterit phlebotomiâ & tenui vi-  
 su. Sed estne vena secunda? sanè venæ se-  
 cundæ nihil à pulmone aut à corde, à quo  
 solo accipit pulmo sanguinem, abduci po-  
 test: nam obstant cordis cuspidēs, qui sinū  
 eius dextrum claudunt ita, ne quæ intus  
 sunt, foras erumpant. Quare sola ratione  
 plethoræ, vel affluxuri ad pulmones & ad  
 cor sanguinis, vena petendi debere vide-  
 tur. Ex propterea nec in rigore morbi, nec  
 in alia

Hæmorrhagia  
 quæ bona  
 & quæ  
 mala.

Diarrhœa  
 vt dicitur  
 quatuor  
 6. Apud  
 vis. 16.

Cautione  
 in  
 obsequio  
 obsequio.

Empyema  
 non  
 da.

In Coar.

Empyema  
 mala  
 signa  
 signa.

CRUA-  
 TIO.

Nuven  
 sit pœm-  
 da.

In aliis morbis consecrata peripneumonia peruritur vena. Sed præclare causam venæ necessariam præbet Aretæus: Seu pituita, dicit, seu spuma, seu quævis alia humiditas tumorem faciat, venarum inanitionis ampliorem pulmonis locum ad respirationis transitum efficiunt. Quenam ferienda vena? Qui adest tumor pulmonis, quem facit rheuma in utramq. pulmonis partem pariter æqualiterque concitatum, ibique consistens: vade significatio fit necessarii in utroque brachio phlebotomizæ, ad retractionem rheumatis concitati, & si fieri possit, (nam natura ignotas etiam tentat vias) ad cõsistentis detractionem, dum crudus manet tumor, nec liberam habet transpirationem. Huic sententiæ subscribit Aëtius. Statim, inquit, si vires ferant, secetur vena in viroque cubito: primò modicè abque lipothymia: idq. repetatur. Prima itaque sectio sit moderata: secunda sit largior (contrario modo ac in pleuritide) nam in secunda sectione non ita prosternitur ad lipothymiam. Cautio itaque addit ne ad animi deliquium procedatur vsque: nam id, inquit Aretæus, strangulatiū augeat. Itaque repetitis vicibus aperiatur vena, recollectisq. viribus: nam venæ sectio, inquit Aretæus, malum tollit, si sit à sanguinis copia. Declinante morbo admoue cucurbitas pectori, tergo, dorso, & largè sanguis educatur, inquit Paulus: nam dicit Aretæus, id solamen præbet, spiritibus foras euocatis, quibus pulmo opprimitur. Obseruatū à Medicis fuit in peripneumonia quadam, in qua si sanguis primo vel altero die detractus fuisset, euadebāt quinto vel sexto die. quarto verò vel quinto sanguinem detraxisse, nihil profuit, morbo iam confirmato. Hic nullus seruatus coe expectoratum biliofum vel sanguinoi permixtum erat. A venæ sectione, inquit Aretæus, humores & flatus deorsum trahantur glandibus ex melle, ruià, nitro. Aëtius vult acri elysmare aluum duci. Si sit à catarrho, accipe feminis carthami vnciam: agarici recenter trochiscati semunciam: glycyrrhizæ semunciam: capillorum veneris, hyssopi, coisq. seminanipulum: hordei mundati manipulum: passularum minorum vnciam: feminum quattuor frigidorum maiorū semunciam: fiat decoctio ex aqua ad vncias duodecim: colaturæ adde sirupi

violati vncias tres. sumat manè vncias quattuor calidè. Si sanguis bile sit, loco agarici adde ihababarum. Experimentissimus ac doctissimus Medicus Arabs Auenzoar iubet vt præscribamus hic abstergentia cum aliqua incisione & siccatione, absque calore: qualis est, inquit, terra sigillata, quia à proprietate conuenit pulmoni: sigillata, quæuis strictione quadam prædita sit, hoc non nocet. capillorum veneris vsus idem author laudat post decimū quartum diem. Quin idem cortices citreorum valdè confeste ait vbi sanies in pulmone, nam ibi mirum in modum solatio esse solent, inquit. Hos itaque coqui vult ex aqua, eamque bibi cum sirupo ex scariolis vel de rosas recentibus. Cape, inquit Auenzoar, bolum armeniz, & terreo impone vasi, quod carbonibus appone: tegmen eius habeat in medio foramen, quò aqua rosata conspergi possit, ac fumus quo erumpat. Æger illum fumum sæpè die excipiat: id excitat cor & pulmonem. existimo eum loqui de ea morbi parte vbi ad purulentiam ventū est. Bibatis etiam lac recenter multum, ita vt ærem non sentiat. theriaca tunc etiam prodest. Si pituitescat materia, Accipe ramum maluz, fœniculi, glycyrrhizæ, cuiusque vnciam: hordei mundi, scabiosæ, capillorum veneris, vulgæ caballinæ, hyssopi, cuiusque manipulum: florum cordialium pugillum vnum: passularum minorum vnciam vnam: iulubarum & sebesten, singulorum septem: prunorum subdulcium duodecim: fiat decoctio ex aqua ad scquidlibet: dulcetur saccharo. Huius decocti libz infundimus postea soliorum senæ vnciam: & bibat bis dies: ita vt alius cotidie bis vltet exernat. In duplici vase soleo decoquere brassicam rubram cum vitrica: liquamen sum saccharo manè propino ad vncias quattuor vel quinque. Si bilis serocià persusa sit materia moribifica, propinabimus sirupum ex succo cucurbitæ, & decoctum feminis psyllij, & feminis maluz cum violis. Ei sirupus sacchari crystallini, cum decocto feminis lactozæ, & cum emulsionē quattuor feminum frigidorum maiorū, & feminis papaueris, adice sirupum de violis. Auenzoar commendat capillos veneris. Cassiam exhibet cum sirupo de mallice. Aqua melonum & cucurbitæ:

Terra

sigillata

vbi...

Ciria.

In pini...

10/4.

In his...

Elegan...

comedi...

in qua



Pituita.

FORIS  
admodum  
da.Adare  
quid.

in qua fiat emulſio ſeminum frigidorum:  
adde ſirupum violatum. Coquatur in ſero  
laſcis hordeū, pruna, malua, & violæ: dul-  
cora ſaccharo. Si à pituita ſit, lingat myr-  
rham. Et exhibe decoctum ſicum cum  
iride, vel muſſam cum nucleis pineis & cu-  
cumeris ſemine: tandem cum hyſſopo &  
ruta. Foris attritaſoria admove, ſintque ta-  
lia quæ ſimul coquant & ſtatus diſcutiunt.  
nam dicit Aretæus, humores, calor, & ſpi-  
ritus ſoras educendi ſunt. Hiſitaque pro-  
deſt extremorum deligatio, & aerium illi-  
tio. Fiat ceratum ex pulvere iros, oleo, &  
cerâ: extendatur ſuper corium, ita euocabi-  
tur ſine turbatione materia & coquetur.  
Ægineta etiam præſcribit oleū rutaceum  
cum pulvere iros, adipē, butyro, medullâ,  
eroco. Celfus ſalem benè tritum & cerato  
exceptum peſtori imponit: quia leniter  
cutem erodit, & coque impetū materiæ quo  
pulmo vexatur euocat. Q. Horatianus pro-  
bat ſotus & cataplaſmata pleuritico-  
rum: & iubet ceratis addi ſinapi, quò ad exte-  
riorem cutem, pulmonis laborantis malum  
euocetur. Interdum tamen vitmur emol-  
lientibus, vt medullâ cetuinâ cum reſinâ:  
& vt attrahat, iungimus iros puluerem, &  
quò magis trahendum, eò plus reſinæ iun-  
gendum. quin reſina terebinthinæ etiam  
deuoratur, quo per vrinas materia deriue-  
tur: eſtque præcellens remedium. Conte-  
gatur, ex ſententia Aretæi, thorax lanis oleo  
imbutis, cum nitro aut ſale. Optima dicit  
inuſitatio ea eſt, quæ ex adare ſit. Eſt au-  
tem adare, ſpuma quædam falſuginôſa,  
concreta in paluſtribus locis, per ſiccitates  
proueniens, in arundinibus ac eremiis ad-  
hæreſcens. Halcyonii formam imitatur.  
Acerrimum eſt & calidiſſimum medica-  
mentum. Hippocrates libro De vlceribus  
eam *ἀρχαῖος* appellare videtur, quòd ea  
in lacu Orchemenio copioſe proueniat.  
Nos eius loco vitmur ſinapi, ita Aretæus  
hic vitur ſinapi cum cerato humido. Im-  
ponimus etiam lanam ſuccidam ex dulci  
oleo. Illinatur totus thorax hoc vnguento  
bis vel ter die, Accipe butyri recētis infulſi,  
medullæ cruris vituli, olei amygdalini &  
violati, ſingulorum vanciam: terebinthinæ  
claræ ſemunciam: iros drachmas tres: cro-  
ci ſcripulum: ceræ quod ſatis ſit, vt fiat vn-  
guentum molle. Declinationis tempore  
doſo medio interſcapulari & peſtori ad-

move, quo ſoras malum à pulmone pro-  
uocetur, & conſperge ſinapi, quo leniter  
arrodatur cutis. Oxyrrhodino ſomnum  
concilia, ne in delirium veniat. Alui im-  
moderatio fluxus leniter ſtingatur refrigerā-  
tibus. Si natura criſin tentat per ſudores,  
admove tunc peſtori veſicam aquâ tepidâ  
ſemiplenam. Tandem trantur enula cam-  
pana ſaccharo incruſtata. Iam ad Viſtus  
rationem venio. Aër ſit media quadâ tem-  
perie prædius caloiſ, frigoriſ, ac lucis. Tu-  
bet Auenzoar vt ab omni ſpecie carnis om-  
nino abſtineant, ob inflammationem qua  
tententur. & ego dico, inquit, quòd omnes  
ſpecies carnis ſunt malæ in hac ægritudine,  
nam ſtomachus debiliſ eſt. Canceri co-  
quantur, quo omnis graueſcencia abeat:  
colatura carnis eorum detur, inquit Auen-  
zoar, nam, dicit, vehementer eam Galenus  
commendat: pulmoni eſt quædam cognatio  
cum caneris: quare hic ſummè conue-  
nit. Alioqui hordeato tranſigant ad ſepti-  
mū diem: deinde ad ceruſiariam pulcem  
& ad poma veniant. Sola aqua hordei pri-  
mò in pomam veniat, vel aqua cocta cum  
ſaccharo violato. Inclinantur morbo detur  
tenuior ceruſia, ab vndecimo liberaliùs vi-  
uar. ius pulli & dein ova ſorbilia dentur.  
toto morbi decurſu vinum abſit. Ius pulli  
cum paſſalis: & protracto in morbo coque  
declinante, adde crocum & hyſſopum.  
Pruna coquantur cum ſaccharo. Comedat  
butyrum recens. Hippocrates incunte mor-  
bo exhibet potiones dulciores, quarto die,  
quinto, & ſexto non ampliùs dulces dat,  
ſed pingues, nam vt expectorent maximè  
ſtudet Hippocrates. Talis eſt piſana cum  
iure pinguis gallinæ. Vel propina incunte  
morbo, vt dixi, hordeata: deinde ſorbitiu-  
culam ex pane, ſaccharo, & butyro, cum  
ceruſia leuiter cocta, vel panatam ſorbeat.  
In fine morbi ſumat colatitiū cum emulſo  
hordei & ſaccharo. Magiſ hic cuncta inci-  
dant quàm in pleuriſide. Quare potus re-  
doleat vim hyſſopi autorigani, inquit Aretæ-  
us, vel piperis. Flatulenta cuncta nocent,  
autore Aretæo. Babat aquam coctam cum  
ſirupo violato. Pluribus diebus, inquit Cel-  
ſus, à vino abſtineat in reſecione, ne mor-  
bus reuiuſcat: diuque ſit leue alimentum.  
Potus modicus ſit, nam docuit nos Aretæ-  
us madefactionem pulmoni bellum in-  
dixiſſe: nam à gula & ventriculo trahit.

Sorbile

Robertus  
lia.Victus  
ratio.libro 3.  
De mor-  
bu.

Historia.

Sorbile ouum concedit Celsus. Passulæ coctæ. Vide ne cibi copia ventriculū & diaphragma premat. Q. Horatianus dat pisanam cum pulvere ieros. In duabus libris hydromelitis coque ieros drachmas tres. Narrat Auenzoar Historiam de ægro Hispano, quem curauerat eius auus. Hic Hispanus, inquit, ex hoc malo ita extenuatus fuerat, vt moles eius carnea omnino satisfaceret. Hunc, inquit, curauit auus meus: nam eum alebat panē optimē fermentato cum saccharo rosaceo, ac pane benē fermentato cum oleo oliuatum. Hic ad pristinum robur corporisq̃ molem antiquam redintegratus fuit: vixitq̃ die post auum meum, tandēmq̃ ex alio morbo obiit. Existimo eum loqui de purulentis. Die potius est dormiendū quam noctū. ante declinationem parcius dormiat. Celsus vult vesicitiō fieri in brachijs, primūq̃ in scapulis, in cruribus & pedibus, leuiter contra pulmonem, idq̃ cotidie bis facere. Breuiter iam subdo quædam empirica. Si à quarto morbi die procedat expectoratum, vel si id sincerum fuerit, extremaq̃ frigeant & lueant, vnguesq̃ cutuenter, ac vigiliz vexent, ilico moriuntur. Quando istius accidit inflatio pedum, auctore Auenzoare, tunc mors in prociū est. Si sanies sit viridia vel nigra, morientur intra vigesimum diem, inquit Auenzoar: nec ferē moriuntur antequam pedes inflentur. Si diarrhoea iam prostratis viribus oboriatur, celerrimē moriuntur. Scribit Hippocrates in Coacis, vt hoc quomuis non suo loco hic dicam, Quibus vrinē in peripneumonia crassæ, hoc est mediocriter consistentiæ, mox ante quartum diem tenues fiant, (à satisfacente natura, ac à metastasi ad cerebrum, vnde delirij) mortiferum. Quō citius, inquit Auenzoar, mala spūta expectorat, eō citius morietur. At si tertio saniem excreuerit, non superabit diem sextum. Sed si fortis ægri vis fuerit, morietur octauo. Sin sanies expectoratio cœperit sexto die, decimū is diem non superabit. Hi, dicit Auenzoar, sanguinem non expectorat, nisi rupto apostemate. Septem diebus ni curatur, enecat: nisiq̃ intra eum diem haimorrhagia liberalis oboriatur, vel spontanea diarrhoea, insania certam indicat mortem. Ab angina ipsa septimum diem occidit,

vel in tabem abit. Addo remedia quædam Empirica, Accipeligna mali viridia, vena in cineres sine semixtione aliorum cinerum: his adde fœniculum, anisum & glycyrrhizam: bulliant in vino albo: adde modicum mellis, & cola: bibat cyathum manē & vespertinus in quo cancri sunt cocti. Aqua lentieuulæ palustis bibita. Iulep rosatum. Philonium Romanum cum hydromelite. Iis cum melle & pipere: nam debent crassitudinem dissipare, inquit Aretæus. Decoctum ficuum cum inde vel mulla cum nucleis pincis, & cum cucumers semine: tandem cum hyssopo & ruta. Pomum dulce in quo coxit thus. Marcellus Empiricus hoc proponit, Accipe seminis dauci, alterci, thuris, myrtæ, croci, partes æquales: fiant passilli ad denarij semissem: deaur vnus ex aquæ mullæ cyathis duobus.

## CAPVT VI.

EMPIRICA.

## DE ERUPTIONE SANGVINIS per os.

GRACI hunc affectum ἀναισθησις ἢ ἀναισθησις dicunt. Quā ab ore fertur sine sciatu, ἡμῶν vocatur, hoc est, ex-puio. Cum guttatim ex ore, vel copiose etiam prolabitur ex capite, nondum dicitur ἀναισθησις, hoc est reiectio vel eruptio, sed πύσις, hoc est spuitio, vel ἀναισθησις, inquit Aretæus. Cum à pectore & infernis partibus, pulmone, asperâ arteriâ, locisque spinæ finitimis, ἀναισθησις, hoc est Eruptio dicitur. Quæ est reiectio sanguinis per os, quacunque ex parte eō delatus fuerit, Dixi esse reiectionem per os, quō abeat à profluio quod sit ex naribus, vtero, sede. Per loca non decentia hæc sit eruptio. cruenta ac crudelis, qua plurimi tyranni animam effuderunt. Qui, vt sui sanguinis pro patria parcissimi, alieni autem auidissimi, ita, fatiis vrgentibus, inaudita sanguinis effusione animam plerumque perdunt. Quod ingenuē fatetur apud Iosephum Aristobolus Hyrcani filius, qui primus coronam Iudææ inter Machabæos sumit: hic matrem postquam fame necasset, optimumq̃ eius fratrem Antigonom insidijs trucidasset, tactus factorum penitentia dū ægrotaret, maiorem animus fecit corporis mor-

DEPT.  
RITIO  
de eius  
expulsiōne.Tyrannus  
frequens  
mulum.Historia.  
11. Ant.  
quis.

bumis crepitibusque doloribus, sanguis per os erumpēbat. Cum verò qui illi à cubiculo erat, sanguinem expectoratum ab eo efflueret, cespitans cecidit eo loci ubi frateris Anigoni obruncati ab eo sparſe à sanguine hærebant maculæ. Tumuli autem ac fremiui à satellitibus oborior, qui contumelià id actum interpretabantur, unde re cognita ab Aristobolo, animi mordaci pœnitentiã actus in lachrymas se effudit, gemensque in hæc verba erupit: Ita nihil sanctum lateri Deum ex meis sceleribus, qui sine mora fratris sanguinis effusio pœnam à me repetit. O miserum corpusculum, quamdiu nolentem rennes animum? quem manes materni fraternique, in pœnam euocant. cur hunc tenuis vnà cum sanguine effundere? non officiosè satis particula- tum sensimque eis cruorem hunc offers. Quin age parenta ita his parētibz, qui tuo sceleris oppressi iacēt. Vix ea loquutus, cum iussisset se in locum fraternalis necis gestari, animum cum sanguine sudit. Ita apud Suidam legimus Hippium Pististrati filium, proſtigato exercitu Persico, in Lemnum fugisse, & ibi morbo extinguium fuisse inter magnos cruciatus, cum amisisset visum, & rupis venis sanguis confertim per oculos efflueret. Et nostro æuo obseruatum fuit, principem quendam virum, cuius auctoritate aut permissu laniena fœda per Gallias edita fuit, sanguine prolabente ex oculis, auribus, naribus, ore, vesicâ ac sede, miserè atrocissimòque fœdi mortis genere occubuisse. non dormit semper Adrastia Nemesis, vel vt verè dicam, Dei iustitia vindex scelerum. Attamen & popularis etiam talis morbus est, qui quæuis inuadat, ob corporis nostri fragilem œconomiam. quid enim præter coagulatum sanguinem fumus? sanè ex eo solo constar nostrum corpus, ac ex eo perennat. Haec noui, inquit Trallianus, an aliud quæ sit periculosum sit *phlegma*, vt sanguinis excretio. Non enim solum ipsum per se, dum immoderatam adfert euacuationem, enecare solet, sed plerumque origo ac causa esse solet diuturnorum ac calamitosorum morborum. Quæ se studiosè in diagnofin causarum huius mali vt deuenimus conandum est, ac explorandum quænam pars hic in vitio sit: vt rectè, & sine cunctatione medelam adferamus. Cum enim in cunctis morbis cun-

ctatio nocua sit, tum verò maxime calamitosa in sanguinis eruptione esse solet. Erumpit itaque ex ore sanguis, quare perpendendum ex quibus ille veniat partibus: & ob quas causas. Effertur potest ex venis ac arteriis gingivarum, linguæ, palati, & ex partibus oris accolis: nam ex vasis, cerebri, gulæ, ventriculi, iocinoris, lienis, vteri: nam à suppressis mensibus nonnunquam erumpit per os sanguis. Quin etiam ab aspera arteria, pulmone, & pectoris è venis interdum effertur sanguis. Sed cur erumpit sanguis ex his vasis? Hoc sanè symp-  
toma nascitur à violata vnione, vel à mala conformatione. A mala conformatione, vt cum vasa nimium rareſcunt, aut cum sua oscula aperiunt. Quare tribus de causis erumpit sanguis, vasorum rupturâ, erosione, vel aperi-tione, adde rarefactione. Sed cur his passionibus inuoluuntur hæc vasa? Id sanè fit à causis externis, vel ab internis. Internæ hærent in vitio ipsorum vasorum, vel facultatis, aut sanguinis. In vitio vasorum, vt si illa fuerint naturâ molliora, vel duriora, aut nimium gracilia, quod etiam euenit ab vsu aliois, & rerum acrimæ & validè abstergentium: nam ita emanare ac quasi per illa transſudare sanguis potest si ebullierit. Ratione verò facultatis, vt cum expultrix vis nimio impetu surgit. Hæc per osculorum aperi-tionem, vel eorum per poros elidit sanguinem: maxime tamen id per aperi-tionem osculorum peragere solebat: non autem à vasorum laceratione. Sed cur hoc agit vis expultrix? quia irritatur copia vel acrimoniâ sanguinis. A ratione san-  
guinis fit vasorum laceratio, vt in athletis præ copia, vel si tenuior sanguis fuerit, per poros manat: aut cum acrior vel flauulentus fuerit, valideque moueatur vt quasi surgeat, rumpit vas. Vel acrior vis recludit vasorum ora. Refert Mesue ex Ruffo, à suppresso lacte id fieri interdum: quo reuocato, sanguinis eruptio sistitur. Obseruatum etiam est, expulmonis phlegmone aperi-ti ac erodi etiam vasa: maxime si cor ac hepâr incendio incanduerit. sed hoc omnino funestum est. Hæc de causis internis, quas mox propius ipsis morbis adhibebimus: iam De externis pauca dicamus. Inter externas causas sunt ictus, lapsus, exclamatio, ponderis perferendi conatio, vomitus vehemens, tussicula perseque-  
rars,

*Ratione  
vasorum.*

*Ratione  
facultatis.*

*Ratione  
sanguinis.*

*A labe.*

*Obserua-  
tio.*

*Externæ  
causæ.*

CAV-  
SAB.  
Internæ.

rans, venus plurima, imperitè suppressa haimorrhoidis: copiosioribus & flatulentius mediatè id facit, nam inde talis fit sanguis. Fngus contrahit venas, quæ propterea facile rumpuntur, cum extendi nequeant. Quare abundantia sanguinis vel per se, vel cum crudo humore & frigido, & cū flatuoso spiritu ad rupturam facit: nam ab his causis profusè & repente effluit. Quin tempus humidum & calidum, inquit Aræteus, id facit, ut vere calidum & humidum. Venenum hanc calamitatem interdum attulit: exemplo est Aratus Sicyonius Græciæ vindex iustus, & moderatus in victoria, expertus fortunæ inconstantiam, & infidas regum familiaritates. Hic à Philippo Macedonum rege, patre Persci, cuius potentiam mirè auxerat, veneno cum filio suo necatus fuit. Cumque sanguinem vomeret Aratus pater, presentibus amicis solitus est dicere, *πῶτά μοι ἐπὶ τῷ θυμῷ πικρὸν ἔστιν ὄφελος*: hæc sunt præmia tyrannicæ amicitie. Quinetiam Luna tenuissima subiens, dormientem si feriat, eruptionem sanguinis accellere potest. Ita De Gradi refert de sibi noto Medico, qui si sub radiis Lunæ ambularet, alio traheretur in eruentem, eruptionem ex ore: at sub lucido sole nil tale illi eveniebat, etiam si se nudo capite soli daret: quod, auctore Avicenna, non aliunde quàm ex aucto à Luna madore eveniebat. Scribunt cuncti medici ab hirudine pota ventriculum lædi, ac hinc sanguinem vomiti. Opinio hæc ex Hippocratis scripto concepta esse videtur, ubi ait, Si cuipiam fauces implentur sanguine sæpe singulis diebus ac noctibus, neque caput antea doluit, nec tussim habet, ne vomuit, nec febre correptus est, non dolet pectore vel dorso: huius considerandæ sunt nares & fauces, si quod vlcus habere videatur eo loco, vel *βλάβη*, hoc est, hirudinem, vel varicosam venam, quam ex similitudine *βλάβη* appellavit. Iubet itaque Hippocrates considerandas esse nares & fauces, an vlcere obsessæ sint. Galenus ubi etiam bellæ meminit. Scribit ita Cælius Aurelianus, Depressa lingua, insipientibus visu locorum probatur asperitas. plerumque etiam, ut Erasistratus dicebat, tubercula quæ Græci condylomata vocant, visibus occurrunt, quæ sunt similia haimorrhoidis, ex quibus sanguis fertur.

Sic Dioscorides quidam antiquus Hippocratis interpres, varicosam venâ hic significari enarrauit. Galenus contendit Hippocratem de animali hæc tenuisse. Sed an possit ita diu faucibus hæc in cognita quomodo plena cruoris hirudo? an homo possit atrocissimos illos cruciatus sentire? Sane quæ Plinius de Elephantis, reclamant, qui scribit eos cruciatus maximos sentire haustâ hirundine. Et Columella ubi de bobus loquitur, hirudo, inquit, cibis transiitum intercludit. Affirmat etiam Dioscorides, haustam hirundinem dignosci à sanguine. Nec Hippocrates alias illas notas consociasset, si per *βλάβη* animal intellexisset. Ita enim scribit, quasi dicat, Si nihil horum adfit, vlcus aderit, vel varicosa vena. Sunt autem varices, venæ tumentes in cruribus, temporibus, venæ, maximeque circa umbilicum. Quin etiam interdum occupant pedus & pulmonem, auctore Hippocrate libro primo de Morbis, & libro De internis affectibus. Asseruit Aristoteles haimorrhoides nonnunquam effluere ex ore labore nullo, nec ex arteria violentè. Sed iam à causis externis revertamur ad cuiusque effusionis peculiarem causam. Diximus sanguinis effusionem nasci à vas ruptis, a pertis, erosio, vel rarefactione. videamus itaque unde hæc maxime eveniunt. Vasorum ruptio est omnium frequentissima. huius causa est lapsus, casus, idus, clamor: plethora sanguinisque ebullitio ab evacuatione solemnè suppressa: ventositas biliosa sanguinis, si quid ceciderit quod acriorem sanguinem reddat, ut ira: ac calidior vel frigidior: tussis violenta: clamor: vomitus in his qui agrè vomunt. In hoc affectu in eûre, copiosè effunditur sanguis: hinc parcius, & cum aliquo dolore. Aperiantur autem vasa, quod eorum ora sunt lata nimium: vel ab usu rerum laxantium ac madefacientium & calidarum, ut à tali diæta, vini usu, ac à frequenti balneo. vel id fit ab acrimonia sanguinis unde irritatur excretrix vasorum vis, ut fit in his qui frequenter aloè vtuntur. Quin à retentrice labefactâ id interdum evenit: nascitur hoc etiam à plethora: & etiam à sanguinis motu, qui ab exercitio vel ab animo. Sont etiâ quædam quæ propriè quædam agunt, ut euphorbium, ruta agrestis, aloè. Dignoscitur reclusio oris vasculi, quæ in-

8. lib. 10.  
6 lib. 18.  
lib. 6.

2. lib. De  
partibus  
animalium.

Ruptio  
causa,

Aperitio  
causa.

*Ex osæno  
causa.*

*Diapæde  
sis causa.*

*Stom.  
differen-  
tiam.*

*Signa ru-  
pti vasæ.*

*Signa  
erosi v. g.*

E.4. cunte morbo parcius effluit sanguis, mox copiosius: estque doloris expertus. estque magis spissus rubicundiorq., quàm is qui ex pulmonis substantia venit. Vasa vero eroduntur ab acerrimis succis illabentibus in pectus. Propterea expectoratus cruor puris ideam gerit interdum: nam corpus pulmonum est in tabum prouum. Sentim expectoratum iadum sanguinem, maximè si corrosio in carne pulmonis constituit, & non in vena. Et: deinde aliquando confertum erumpit sanguis: estque plerumque fædus sanguinis color, cum parce exullitur, ob miscellam rodentis succi. In primis morbi auspicijs paucus expectoratur sanguis luidus ac quasi virescens. Sanguinis verò exudatio à vasib fit, ex sanguinis tenuitate ac venarum raritate. ebullitio sanguinis agitati huius maximè causa esse solet. paucus ac tenuis hic prodire solet. Noui mulierem quæ singulis mēstruis spaciis sanguinem ore reddebat: nam, autore etiam Aretæo, hoc modo in spacio aliquo collectus sanguis, bene effunditur. Quædam eliso dente, periculis, illà cautà, menses reddebat. Sed quia magna curationis in hoc affectu pars est, exacta cognitio speciei huius affectionis, ac loci vnde sanguis erumpit diagnosi, hoc est, vt internoscamus num ex vase rupto, aperto, aut excolescendatur sanguis: & num ex pectore, pulmone, hepate, aliàve parte profusatur, & num *exanthes*, vel symptomatice fundatur, nos, etiamsi hæc *dis agis*, (quia *καλὰ*) de his exactè transigemus. Quibus ocium est examinent commentaria nostra ad decimumtertium Aphorismum libri quinti Aphorismorum Hippocratis. Siрупum fuerit vas, plenà manu ilico profuit sanguis. & cause illæ præcessere quas antea enumerauimus. Erosio vas si in vitio fuerit, paulatim, & non confertim, ineunte morbo, prodiu cruor: præcessit vñs mali cibi, & acerrimus catarrhus tussiculofus. Hoc est quod dicit Aretæus, Roga num prius tussierit, difficilèque respirarit, nausea adfuerit. Nam vascula pulmonis à diuturna copiosaque distillatione exeduntur, detritis attenuatisque tunicis. Processu itaq. temporis multum sanguinis erumpit. Febris plerumque sequitur hanc effusionem. Attius ex Galeo refert etiam inter causas, acrem mate-

riam, quæ gignitur in ipsi pulmonibus. Et dulcis catarrhus glutinosusque diu ex capite illabens, pulmones pedetentim excidit & in tabum venit: nam ibi cunctando putrescit ac acris emadit. Vidi in scdis cadaueribus plus quàm tricies pulmonum ambitum viscosa lentaque materia obductum adrò, vt pectori pulmone adglutinatret. Vascularum apertione nihil tale præcedit, præterquam quòd interdum conspicua plenitudo addit vascularum. interdum balnea præcessere frequentia, vñsusque humidus & calidus, & mora in loco calido Euphoria quædam sequitur hanc exclusionem, si moderatè eueniet: maximè à menibus, vel haimorrhoidibus suppressis solebat nasci. At vasis rarefactio citra rupturam est: hinc est quòd non subito euenit effusio ab hac, neque cum profusione multi aut crassi sanguinis. Deprehenso iam affectu, veniamus ad notas loci affecti, quòd noscamus ex quonam loco effundatur sanguis: hoc est, qua in parte sit illud ruptum, apertum, exelum, vel rarefactum vas. Præclarè hoc axioma pro cynosura hic erit, Omne excrementum ideam partis præfessert vnde fertur. Inspecie itaque sanguinem, & examina eius substantià ac consistentià, colorem, quantitatem, tempus periodicumque excretionis, & excrendum modum: hoc est, num spuendo, screando, vomendo, tussiendo excludatur. Ex venis atrior, ex arterijs purpureus prodit: ex pulmone spumans albicansque à purpura. Profuit enim ex vasib oris, narium, cerebri, ventriculi, lienis, iecoris, vteri, asperæ arteriæ, pulmonis, pectoris: vel prodit à membrorum substantia. In primis itaque interrogetur æger, quo modo effertur sanguis. Nam si simplici expuitione excludatur, ex vasib oris dicemus eum emanare. quare hic rimari debent oris affectus. Atamen nonnunquam in simplici hac expuitione sanguis labitur ex vasib narium vel cerebri: Sed tunc insolens aliqua titillatio palati adest, ac libido tussiendo, sine multa tussi. Cum à naribus ita manat atrior sanguis, hæ rubere solent. Cum à capite, id feruore vel dolore in querelam venisisonant aures, inquit Aretæus, vertigo interdum fatigat, vel percussus præcessit, aut frigus ingens, vel calores, vinum largios: nam ab ebrietate rarefacta vena etiam sanguineum sputum

*Notandū.*

*Signa  
arteris  
v. g.*

*Signa va-  
res. v. g.  
vasis.*

*Ex quo  
parte ef-  
fundatur  
sanguis.*

*Am ab  
ore.*

*movet.*

movet, at à sanguinis eruptione tædia capitis miteſcunt. Quin is ſanguis qui ex capite dimanat, interdum in ventriculum vel in pectus effunditur. Omnis autem qui ex ventriculo in os rapitur ſanguis, vomitu reſcitur. Venit autem ad ventriculum, ut iam dixi, vel à capite, vel ab hepate, aut liene, vel ab ipſis ventriculi venis funditur. Qui à ventriculi venis venit, auctore Auicenna, paucà copiâ manat, & inquit Aretæus, niger concretuſque, etiamli ab æteria fluxcrit. Si à vena, multò compaſtior & nigrior eſt. naſea multa adeſt; crebri viralenti ruſtus. Si multa collecta ſit materia, angorem coſectarium habet, & vertiginem: reſolvuntur, exæſtuant, aſſiduè dolet ventriculus; à vomitu leuantur. Nam cum ab hepate, liene, vtròve prodit, magnâ copiâ funditur. Num ex hoc vel illo viſcere dimanet, aperiet præcedens de viſceribus querela, & ſanguinis moles, character, ac qualitas indicium dabit. Nigrior & craſſior, eſt ſoboles hepatis; non admodum nigricâs ſæpè ex liene prodit. Si odoris grauius adſit, ab vtero eſt: maxime ſi euenerit à ſuppreſſis menſibus. Si præceſſit hypochondrii dextri tenſio, quæ à vomitu ſanguinis miteſcit, ab hepate erit. Magna ex vena profuſit, maxima ſanguinis copia, & frequentius, & craſſior. Si per ſecretum excludatur ſanguis purpureus ac paucus, ille veniet ex initio trachæ arteriæ, vel ex faucibus. Rarò tamen à gula rarefacta elabatur, nam cibi & potus hanc denſant & refrigerant. nec eroſiones patiuntur; nam fluxiones non diu eò perſeuerant: quia vel expuuntur, vel ad inferiora pelluntur. Attamen ruptio gulam fatigat: expuiturque tunc ſpurum cruentum, ſtium, exiguum, cum naſea & vomitu. & tuſſicula adeſt, conſentiente gulæ arteriâ, nam ſecundum illam extenditur, & illi adhæreſcit; deglutita calida vel frigida nocent: dolor interdum interſcapulum ſerit. Si vero non à læſa gula, ſed à ventriculo naſcatur malum, præceſſit vomitus, & ſecretus ille eſt doloris expers, nec aſſiduò exereatus prodit. Nec etiam neceſſariò is ſanguis qui ſecretus eliditur, ex vaſe gutturis funditur: nam ex capite & ex ventriculo eò incubuiſſe potuit. Cum manat ex faucibus, non plenâ manu effunditur ſanguis, ſed modicâ copiâ: & reliquæ partes extra quere-

lam ſunt: & in læſa parte percipitur dolor, eſtque vox inde rauca. Eſtque hic ſubſtantiuſ ſanguis, nec exactè miteſcit cum ſputo, adeſtque naſea vel vomitus, & tuſſicula interdum, ob laryngis (quæ etiam ſaux Latinis dicitur, teſte Auiceliano) cum gula coniunctionem, dicit Aretæus. Si ſanguis prodit cum tuſſi, id euenerit potius, coſeſſiente ex partibus ſpirabilibus, capite, vel ventriculo. Sed quo magis ab imo proficiſcitur pectore, eò maiori cum tuſſi expectoratur. Maxima autem cum tuſſi egreditur ex pectoris vaſis, & minori copiam quàm ſi à pulmonibus excluderetur: eſtque is qui à pectore labitur nigricans & grumolus, nam in bronchiis grumefcit: & dolet pectus aliqua parte. Cum ab vtero ſurgit ſanguis, vel à ventriculo, aderit quidem tuſſis, ſed non adeò moleſta, & maior acerbiorque eam comitabitur vomitus quàm tuſſis. Quin etiam ex aduerſo euenit, ut materiam ex pectore dimanantem comitetur vomitus: etenim ut ſanguis ex ventriculo afluat in pulmones; ita ex aduerſo, qui eliditur ex pectore, manat in ventriculum. Sed ſi primo prodit à pulmone, magis continuo fatigabit tuſſis quàm vomitus. Nam floriduſ & ſpumâs cum tuſſi ſuluiſque erumpit ex pulmone ſanguis: & repente vteriorque e pulmone labitur. Eſtque hic ſanguis, & quædam in hoc, hoc eſt ſpuma ſulua effloreſcens: Hoc eſt, ſanguis minutiffimis bullis obſitus, à ſpiritu & calore pulmonis, continenter folliſ modo agitati. Maxime ſi eroſio in cauſa ſit, eſtque rotunduſ ſpumans ſanguis ſic, ut pars à parte diſtincta ſit: indolentia adeſt, & rubor in facie maior. Quare vide copiam effluentiam, & modum: qui tanquam vomendo ſit, & ſine dolore. Sæpe euenit ut ſanguis ex capite in pectus delabatur per ſolum, qui deinde cum tuſſi expectoratur, ſine ſpuma nigricans: hi ſub ſole ſarte, vel aliunde indoluit caput, oculi rubent. Qui tamen ex capite ſanguis in pulmones labitur, interdum ſpumefcit. Spuma enim naſcitur ex vapidâ materia, cui ſe craſſamentum aliquod remiſcet, conſociante ſe vna calore, aut motu, vel triſque. Eſt enim ſpuma nihil aliud, quàm minutiffimarum bullarum generatio in circumtenſo humore, vel à ſpiritu vel à calore. An igitur ex his non ſpumam ducat illapſus in pulmones

sanguis? sanè multum spumifera est pulmonis conditio ac natura. Probum sanè est argumentum: spumofus sanguis expuitur; igitur prodit à pulmone. At minimè ita bene veritas, Non est spumofus, igitur non provenit à pulmone. Nam non spumofus prodire potest ex vase pulmonis lacero. At qui ex propria pulmonis substantia prodit sanguis, est mera spuma. Dicit quis, Galenus auctor est spumofum sanguinem non posse aliunde prodire, nisi ex pulmone. Respondemus, aliud esse spumam sanguineam, & sanguinem qui habet spumam. In recens matris ac iugulatis bobus dum profunditur sanguis, in ipso sanguine natantem antmaderimus spumam sanguineam saluâ purpurâ quasi albicantem; hæc à pulmonum substantia venit, estque mera spuma. Sed ex vasculis pulmonis sæpe effunditur purpureus sanguis, qui non est spuma. Quare rectum istud ratiocinium est, Spumat, igitur ex pulmone dimanat. Sed non rectè ita, Non spumat, igitur non labitur ex pulmone. Cum ex propria pulmonis substantia excernitur, mox aderit febris hætica ac purulentum expectoratum, cum animæ febre: nam nulla ferè corporis pars æquè faciliè in putredinem trahitur ac pulmo. Ex pedore profectus nigricat, & dolor adest in sterne, non adest spuma sanguinea, attamen potest habere spumam; & nigrescit, nam in bronchiis quasi grumescit. Spuma quæ gerit, faciliè evanescit. ingens, dicit Aræteus, tussis hic fatigat sine expectorato. Atiam nigricans & grumofus sanguis tussis reiectus non semper à thorace venit, nam nuper per somnum ex capite illapso grumescere potuit. Phlegmonem iam vulnus cōtraaxit, ærgumènto est febris cum spūto purulento paucō. Ex iccore vel liene cum prodit, tumor vel dolor in alterutro visceris præcessit, & sanguis eiectus niger est & concretus. Ex perpeccatis causis mali, ac deprehensâ ex parte affectâ, videamus quid agere debeamus. Generalis hic quædam oritur indicatio, nimirum accidendi humorum copiam: & ut illico conglutinetur lacerum vas. Nam, dicit Cælius Aurelianus, omne vulnus quod vsque in tertium diem glutinari non potuit, necessariò tumescit. Notandum hic maximè observabilem esse impetum erumpentis sanguinis, & causas effluentes sanguinis. Si ad impetum eius collineaverimus, oritur inde reuellendi sanguinem à vase lacero indicatio: id fit per epaphraicè sanguinis, & per frictions, foci, vinctula, & cucurbitas. Præterea refrigerandus est sanguis, ac citius acior vis castiganda. Sin ad causas huius symptomatis oculos mentis direxerimus, si sit fractum aut incisum vas, nascetur indicatio agglutinandi, & citra morsum adstringendi. Si fuerit abrasa pars, orietur notio nutriendi: nâ carne implendum id, quod arrosum est, & pharmacia sarcotica opus est, & si acior humor adsit, purgandus. Sin anæstomosis in vitio fuerit, dilatatum os adstringendum ac claudendum. Si per diapedesin emanat cruor, nascetur indicatio densandi illud vas. Sed tamen, ratione distributionis, & hæc sicca remedia ferantur ad partes spirabiles, miscenda erunt calida quædam leptomera. Quamvis interdum narcotica misceamus: nam hæc algiosâ suâ vi sistunt sanguinem, & somnum conciliant, sicque tussim mitigant. Ut itaque medicamenta stringentia penetrare, molli remiseri debeat. Summa sit Indicatio hæc, ut vulnus concrescat antequam inflammatio superueniat. Quatuor in hoc affectu maxime sunt formidanda: primò, ne nimia copiâ effundatur sanguis; vnde Indicatio oritur cum supprimendi. Secundò, ne suffocet nimia vberitate. tertio, ne grumescat in aliqua parte, quarto, ne vlcus faciat putridus sanguis. Ea itaque cautio adesse debet, ne, ubi opprimuntur à succorum copiâ, materia supprimatur astringentium vsu: nè sanguinis irruerit eruptio, à vitiuantium remedium. Si à catari periculum erosionis adsit, educenda erunt acia, & temperandus erit sanguis potius laxatis, & dein latis. Si humores acres & salsi à capite venientes pectus exedant, mitigandi erunt, & aliò reuellendi, diutius, vel excludendi. Tussis interim sedetur. Quare illico abundantia vacuetur: dein sanguis sistatur obturatis dilatatis, vel glutinatis rupris, à citra morsum, erosio sarcoticis & cibis succosis occurrendum. Sed videndum ac perpendendum num potis sit hæc indicatio. nec perficere. nâ inierdum huic malo mederi licet, interdum non. Temeritas à promissione abist: nâ Sanguis, inquit Hippocrates,

Obislin.

Ex pullo.  
m.Ex icore  
vel liene.INDI-  
CATIONES  
curatiue.

Notandū.

A causis.

Prospice  
indicatio.Qua me-  
tuenda  
hic.

Cautio.

Progre-  
su.

crates,



4. Aph. 11. crates, qui sursum fertur, cuiusmodi fuerit (spumans, flauus, niger, fusus, concretus,) malum præfereat. Maxime ruptis vel excessu venis, aut his deficientibus illis partibus, quibus remedia non facile adhiberi possunt. Nam Galenus in commentario ibi, affert Hippocratem loqui non de sanguine qui per nares sed qui per os erumpit. Nam, ut primum demonstrauimus, ægrè dignoscitur pars vnde dimanar. nam interdum suspicio nos inuadit de capite, cum iam tamen ex pulmone erumpat sanguis. Et quâuis à capite pulmones inuaserit, attamen inde facile pulmones abradi poterunt: maxime si sanguis is saluus fuerit.

7. Aph. 37. Sanguis, inquit Hippocrates, ab ore fluens, si cum febre, malum; si sine febre, salutare. Explicat ibi Galenus illud Salutare, significare curabile: ad differentiam alterius, curationem abnuentis. Id voluit, vitiū hoc naturā suā periculi plenum esse. Verūm interdum curabile malum est, cum prodit ex gurgulis, ex oris partibus, ex ipso ventriculo, ex capite, gurgure, pectore. Alioqui si à visceribus, ut liene, hepate, vel pulmonibus erumpat, cuiusmodi tandem is sanguis fuerit, dicit Hippocrates (id est, quacumque qualitate, tempore, & excernendi modo erumpat: hoc est siue niger, siue purpureus, siue dilutus, siue seri sit naturalis particpae, siue expers: siue fusus, siue concretus, siue vomitione è ventriculo & vicinis partibus, siue expectoretur è thorace cum tussi & dolore, vel ex pulmonibus subflauus & spumans) calamitosum. Quia vena lacera in illis partibus ægrè restituitur suæ conuinitati: & etiam quia res ea excernitur, quæ ex naturæ lege ibi continetur. Propterea ita loquitur Aretæus, Haut mihi vitiū, sanguinis enim exitus est: sanguis autem omnium est alimentum, omnium calor, omnium color: terroremque incutit sanguinem ab ore intueri. Si dimanar à pulmonibus, ex qua causa veniat, perpendendū erit. Si enim per diapedesin exiit, aut per aëstomum, curari poterit: nam orificia vasorum claudi poterunt, & tunice densari. Etenim menstruum sup-  

4. Aph. 23.

oseulis vasorum illie reclusis. Quod si ex lacero pulmonum vase erumpat sanguis: notandū erit num ex fracto vase proliui, vel nū ab inciso vel ab abrafo. Vicumq. fiat his modis, periculi plenū est. Vnde Ouidius:

*Cernis ut è molli sanguis pulmone remissus  
Ad Stygia certo limite duas equat?*

Propterea iudicium hac re noster senex paranomasia, vbi ait, ἀίματος πύλις, φθόνος: quasi dicar, idem est, si abundè feratur nec ètè viuificum, cor exhauriuit nimia copia. Est autem ruptio magnæ venæ difficulter sanabilis, de qua ita Hippocrates libro 1. ἄξιον ἐστὶ φλέψι ἀμείψθαι ἐν στήθει, hoc est, non coit. Sed iam tamen curari potest, mediocri copia modo effundatur, si à prudenti medico, dicit Galenus, antequam vas inflammetur, agglutinetur; si accesserit inflammatio, curari non poterit. & rupto vasi sæpe intra tridū phlegmone superuenit. Nam antequam agglutinetur, abradetur vas pulmonis, & caulecerabuntur pulmones: quibus exulceratis, actū est. etenim in spongioso pulmone corpore pus firmitus hæret, vnde acrius redditum, atrodit molle pulmonum corpus: inde calor, difficilis respiratio, & tabes. Quare conelamatum est, vbi ex abrafsione effunditur sanguis. Quod ita pronunciauit Orisbasius, Hi soli incurabiles, quibus ex vitiosis succis erosio euenit. Nam, dicit Aretæus, parte membri deficiente, ad solidationem vlcus non ducitur: rupturæ verò facilius solidatio, quia vulneris oræ se contingunt. minimus, inquit, in rasefacto vase metus est, nam refrigeratio & strictio satisfacit huic malo. Quibus sanguis ex iecore funditur, subito deficiunt: non ita facile quibus ex liene, sed in assem abeunt vbi ex liene perferat effusio: nec hi tunc restituantur. Ab hepate raro fit; cum semel à liene vomuerit, curari possunt, quarta vomitione sæpe deficiunt. Omnium itaque difficillimè curatur sanguinis eruptio quæ ex pulmone excluditur: cum à rupto vel eroso sit vase. Nam pulmo in perenni versatur motu, & ut dixi, quod ex spongioso corpore non facile pus excludatur, unde pulmo facile in purulentiam trabatur. accedit quod, cum pulmo alatur tenui ac acri sanguine, è difficilè consolidari possit: maxime cum pulmo sit defluxionibus obnoxius. Maturat itaq. curatio

Gal. 1.  
munda,  
torem

Apul.  
mon.



tionem Medicus: nam, ut breviter dicam, cum ad erosionem pulmonum ventus est, funestum ac calamitosum semper malum est. Præterea observatum fuit, eos qui ex copioso rari usu sanguinem expectorant, raro eademe. Quibus prostratis viribus effluit sanguis, moriuntur. Ab arteria si exit sanguis, periculosum, nam vulnus frequentius concussioni debet. Quibusdam scribit Rases euenire sanguinis eruptionem certis quibusdam vicissitudinibus: is supremi non debet, nam id valetudini prodest. Hoc, auctore etiam Aretæo, huic malo familiare, ut moror & vitæ desperatio comiter exiguam sanguinis excretionem; nam iugulationi id simile est: quis id non perhorrescat? nam & tauri sanguinis profusione illico intereunt. Sed illud summæ admiratione dignum, quod in sola ex pulmone reiectione, quæ omnium frivolisima est, homines animum non despondent, cum tamen in extremo discrimine versentur: indolentia causa est; damnosior, quàm terribilior. Contra, expeditior, qui & exiguus, mortis metum iniicit, ut in colico. Erassistratus, inquit Aurelianus, facile curabiles succulentos homines dixit, atque fortes & parvicollis, quos microtrachelos appellant, hoc est, qui minimè longitudinis habent colla. Difficile verò curari possentenes ac debiles & porrecta collorum longitudine formatos: nam tussunt facile. Asclepiades difficile curari dicebat succulentos & carnosos, ob vehementiam spirationis: ita & ætates medias & pueros, celerius enim spiritum ferri. Si itaque ex his eluceat aliqua spes sanationis, illico ad curationem veniunt. Videamus ergo quid chirurgia hic prosit. Vehemens est hoc vitium, nam prædium vitæ, sanguis effunditur: quare & prompto & valido remedio hic opus est: tale est venæ sectio. Galenus emisit sanguinem in iuvene, qui refrigeratis spiritibus instrumentis sanguinē reliciebat. Subscribit Galeni sententiæ Aretæus, qui ait, Si sanguine distente sint venæ, in qualibet sanguinis profusione secetur vena: siue extrahatur, aut erosione sanguis profluit, conducit. & cum rarefactio in causa est, ne copia vena frangatur. Si tamen, dicit Aretæus, æger fuerit tenuis & inops sanguinis, venam ne scindito. Iam modum sergandum dicamus in venæ sectio-

ne. In erosione priusquam sanguinem ex-puant, vena angusto secetur foramine: dein purga, ac acuerit catanhum: & caput pulmonesque firma. Admonet tamē prudenter Trallianus, vbi ait, Omni modo in cubito secanda est vena: at vbi expuisset sanguinem ab erosione, vira (inquit) sanguinis missionem: nam exuccum est horum corpus, ac in tabem prouum. Et Paulus, vbi admodum acris est defluxus, ait, non seca venam. Si vena secanda, inquit Trallianus *ἡ δὲ μέση τῆς αἰτίας* hoc est, non confertur euacuandū, nec vna vice, sed repetitis vicibus, i duabus tribusve horis interpositis. Iam videamus qua copia sit educendus sanguis. Ex viriū suada effluat sanguinis copia. præstat id agere repetitis vicibus, donec ea repetitione accidatur ea sanguinis copia. Nam vbi passio fatigat hæc a fastidio, bis aut ter sequitur venam Galenus. Ut repeti possit, ligetur vulnus imposito oleo & sale. Et Galenus in cacochymia vitæ epicrasi, qua edomabat succorum ferociam: idque maxime cibis. In muliere tamē Romana, quæ à cararho sanguinem expuebat, abstulit Galenus à venæ sectione, nam in bidui inedia erat. Aretæus vult ut prorsus ante animi defectum cohibeatur sanguis, & ne ita multus auferatur: nam, dicit, & per os cecidio hominem labefactat. Et, dicit, iterum detrahit post paucum sanguinem, repetatur posttridie, & perendie. Quare frequententer repetenda est phlebotomia ante quartum diem, dum recens est malum, siue vicere, si vires firmæ. Abduc tres vel quattuor uncias singulis vicibus. Quo tempore perturbenda vena? Inuente id fiat morbo. Si tamen, inquit Mesue, turgent acerrima bile sanguis, jusque effervescat, purgetur primum cholera: dein seca venā: tamen refrigera. Quæ vena perturbenda? secetur cubiti vena. Puto ex saluataella re-ctē abduci, si ex thorace & pulmone fluxerit non copioso impetu. Si ex vtero in os repit sanguis, quod si impetus auertatur, bene pedis perturbatur vena. Hoc est quod dicit Trallianus, vbi ait, Iuvat illos etiam non minus ex imis corporis partibus sanguinis detractio. Et testatur reliquit, se plus auxilij hac arte præstitisse, ob validiorem, qua præcellit autionem. A sanguine educto, suadet Trallianus ut quiescat æger, &

Copia  
emittendi  
sanguinis.

Admirandum.

CYRATIO.  
An vena  
frangatur

et Meth.

Modus  
venam  
secandi.

Tempus.

Quæ  
vena?

& ut non magnū spiritū trahat, & aquo-  
sam poscam sorbeat: ita grūmi solentur,  
& repellitur sanguinis effusio. Si ex hepa-  
te venit sanguis, auctore Archigene, vena  
dextri cubiti erit scissenda: si ex liene tume-  
nte, saluata vena aperitur. Sin vires aut  
vires non admittant venę sectionem, cucur-  
biturę admoveatur natiuis, lumbis (modo  
ab infimis partibus non prodeat san-  
guis) vel hypochondriis, non pectori: si ab  
vetro, infernis. Qui cucurbitas iccori & lie-  
ni sine scarificatione admovent, id inter-  
dum bonis ægrotū rebus efficiunt, in-  
terdum id cum calamitate ægrotū fici-  
tur. Nam si ex ista vel lapsa vas fuerit in his  
partibus ruptum, hincque natura sangui-  
nem reiecerit per os aut nares, tu id si im-  
pedis, visceribus phlegmonem accerces in-  
signem. Quod si in his vas fuerit reclusum,  
non autem ruptum, aut eiosum, tu id tūc  
cucurbiturę admovebuntur. Licet etiam a  
phlebotomia hæmorrhoides excitare. Vi-  
tetur etiam ad sanguinis reuulsione scitiorū  
nibus & ligaturis: articulos, inquit Q. Hu-  
ratianus, & extrema femorum fasciulis  
competenter stringantur: fiat id laia fasciā,  
sine dolore. Primo die, cum stringentia  
sumit, vesperi ab omni cibo prorsus abste-  
neat, inquit Oribasius. secundo die nu-  
tri, & iterum quid sanguinis trahat. Et pri-  
mo die a vena scissa, terribus horis poscā  
tepidē bibat. Triplici autem de causa hic  
prescribimus remedia: vel fluxus vix inter-  
cipiantur, cogendo vascula: vel ut defluen-  
tem humorem compactum & crassum effi-  
ciant, ne distillet: vel exiccent incurtus,  
sanguinem in antiqua sede retinentes, ne  
fiat exundatio & effusio. Si sit ab anasto-  
mofis, obturandum atque adstringendum.  
Xenocrates, apud Galenum, hædi sangui-  
nem concretum, pari mensura aceti elixa-  
bat: dabat drachmas tres. Dasi hæc pos-  
sunt ex sirapo de rosis siccis, vel ex sirapo  
myrtillorum, aut cydoniorum malorum:  
dilue decocto rubi aut polygoni. Tenuia  
interdum remiscemus, & plerumque mel,  
quod ad remota loca efferantur. Accipe la-  
pidem hæmatitem in pollinem versum,  
cui affunde aquam virgę pastoris vel plan-  
taginis, dum aqua rubescat: dein adde si-  
rupum myrtillorum & de portulacę. Si a  
ventriculo exundat sanguis, remiscemus eū  
adstringentibus aliquid absinthij. Si assa-

tim eū vomitu prodierit, a vena scissa hoc  
vitemur & omphacio: accipe lapidis ainei-  
nij, gummi arabici, balsamistorum, thuris,  
omnium æquas partes: propina tics inde  
drachmas cum succo cydoniorum. Sin a  
iccore effluat sanguis, miscbimus adstren-  
gentibus cicoreum, & agrimoniam. Fiat  
decoctio ex tribus animalis, cum iosis, vio-  
lis, nenuphare, absinthio, balsamistis, fiat  
sorus. Bibat feri lætis chalybeati libras  
duas, & vngatur vnguento fasilino: Si a  
liene, addimus ceterach. Sin ab vetro, ad-  
dicimus capillos veneris & parthenium, pro  
vehiculo. Cum a pulmone, remiscemus  
spicam, & semen ammeos. Si a capite, con-  
sociamus betonicam. In venarum rarefac-  
tione, adstrictio satis est, ut posca, & de-  
coctum palmularū; vel antiquum saccha-  
rum rosatum satis fecerit. Si sanguisoga in-  
hæserit naribus, modico sale admoto ca-  
det. Quod si ventriculum inuasit, bibat  
aquam salitam: vel incoque aceto thymū,  
& vomat: quæ exclusa, propina scilicet aut  
bis decoctum symphyti maioris: vel de co-  
rallum rubrum, vel bolum, aut masticem,  
vel conseruam veterem rosarum, cum lacte  
chalybeato. Si lacerum vas dehi sciat am-  
plē, non facilē coalescet: erit medendum  
glutinantibus. Sed in his casibus adst, ne in  
parte quę ruptum vas habet, sanguis ibi  
circumfluat, dum scilicet glutinantia illa  
propinamus: tunc enim damnosum erit  
omne glutinans, & etiam quicquid resfr-  
gerat. Sed primum propinetur quid, quod  
concretum sanguinem fundit: teneat ore  
vinctas duas poscę tepidę, ac sensim de-  
glutiat. Redditis tussis grumis, ilico gluti-  
nantium incatur vsus. Si levis fuerit ruptu-  
ra, erit stringendum symphyto, polygo-  
no, conseruā rosarum cum bolo. Accipe  
tenuium orbiculorum radices consolidę  
maioris, manipulum: latis libram: coque  
dum tenerescant radices: bibat cyathū hu-  
ius lætis bis die, cum saccharo penidiario.  
Commendat Galenus in omni rupturā va-  
sorum, siue ea magna vel exigua fuerit, la-  
pidem hæmatitem. Hic in pollinem redigi-  
tur exacte, daturque sæpē ad scriptulos  
quatuor: vel syndonē excipitur, ac vino  
immergitur, leuiterque exprimitur, id bi-  
bitur manē, id agat: hoc etiam pus ex-  
puentibus prodest. Vel da scriptulum eius  
ex succo gragatorum. Mesue eum in polli-

Rupto in  
calle re-  
media.

Cautio.

m m nem

Cucurbi-  
ta.

Frisio.

Medica-  
menta.Ad ana-  
stomofin.Ad ventri-  
culum.

nem redactum exhibet ex mucagine seminis psyllij. Propina boli optimi drachmā, cum vini adstringentis rubri cyatho. Accipe radicem consolide maioris vnciā: pulmonariæ, pyrolæ, polygoni, bugulæ, bellidis minoris, rutillaginis, portulacæ, plantaginis, singulorum manipulum: seminis acaciæ, portulacæ, cuiusque drachmam: fiat decoctio ad libram vnam: colaturæ adde sirupi de portulacæ, & ex myrtillis, cuiusque semunciam: vel coque hæc ex ceruissis. Et utatur in omni cibo portulacæ: & fiat conditum ex conferva rosarum veteri, & ex radice symphyti condita, bolo, cum sirupo de portulacæ. Accipe specierum diatragacanthi frigidi scrupulos duos: boli scrupulum, sacchari semunciam: cum aqua farsæ fiat tabularum. Si valida fuerit vnitatis laceratio, vicinor omphacio, acaciæ drachmā, vel hypocistide, gallis, balauustis, malicorio. sint sine morfu glutinaria, ut tragacantum, corallum rubrum torrefactum & ex aceto extinctum. Commendat Aretæus rhei radice drachma ut accipiat ex succo seridis & plantaginis, & ex poscæ cyathis quatuor. Et melli costio includi quædam, quod fiant catapota, ut gallam, rhoen, semen lapatii acuti. Quæ bibuntur, inquit Aretæus, tenacia sunt, ut concretione efficiant, ut coagulum leporis: sed parcè deit: nam coagula copiosa interimunt, inquit Aretæus. dicitur ad obolos quatuor: terra lemnia ad tres drachmas, cum decocto rubi & palmularum. Si febre vexatur, neque assatim tunc eruptio erit suppressenda, neque remedia in paroxysmo danda: quia à febre multo citius quam à sanguine intereunt. Poscam tepidam initio sensim deglutiat: idque, inquit Orisibius, bis aut ter agat, dein stringentibus utemur ex poscæ, mox illis ex melle. Rases in vena rupta, erosa, aut aperta, à vena partitum secta, accipit iheris, sanguinis draconis, cuiusque drachmas tres & scrupulum: succini albi drachmas quinque, lapidis haيماتis, terræ sigillatæ, singulorum drachmas decem: aluminis drachmas duas cum semisse: balauustiorum drachmas tres: opij drachmas duas: rhabbari drachmas duas, cum succo portulacæ fiant trochisci decem: quotidie vnum da cum succo cici maioris aut portulacæ. Si incrudescat sanguinis eruptio, alterum trochisci

cum agro somnum inituro porriges. Et si dolet pedus, ex aceto & aqua miscibus dictum trochiscum. Qui albumen liri gigitur cum bolo & tragacantio. Symphyti maioris decoctum: & portulacæ succus potens est remedium: & si herbam eius comedant. Annotat Marcellus Empiricus, eo die quo quis vitui symphyro, acetum non esse gustandum: hoc enim, dicit, eius vires resoluit. raditur, inquit, hæc radix cultello eburneo, & datur fonsanlibus ex ea. Aqua ex foliis quercus, & ex rubi fructu & eius ex cacuminibus. Polygoni succus cum terra lemnia, vel bolo, portulacæ succus cum porri succo, adiecto pauco aceto. Accipe iheris in pollinem redacti drachmam: sumat ex cochleari cum poscæ, vel ex decocto myrti, vel lentis aquatilis. Accipe terræ sigillatæ, iheris, amyli, coralli, gumi, aluminis, singulorum drachmam: acaciæ, symphyti, cuiusque scrupulos binos: cum succo porri fiant trochisci: sumat vnum ex poscæ. Si sanguis erumpit ex arteria, dabis succi polygoni vncias duas vel tres per triduum. ita etiam propinatior succus plantaginis: vel polygoni manipulus coquitur ad tertiam: bibat cyathos tres. Si ex eroso vase profunditur sanguis, erit corpus nutrica: tu redintegrandum, ac pars erosa glutinanda. catarrhus à pectore auertendus, caput ac pulmones roborandi. Verum nutricus vocis minimè respondet dum corpus impurum fuerit. at tale plerumque id est cum abraduntur vasa, quare hic inter dum corpus leniter erit mundandum purgatum. culā. Pareat itaque materia morbifica ad exclusionem, hoc modo: Accipe boraginis, buglossæ, lactucæ, portulacæ, capillorum veneris, pulmonariæ, singulorum manipulum: glycyrrhizæ semunciam: hordei deglutati pugillum: iurubas viginti: seminum quattuor frigidorum maiorum, vnciam: florum cordialium pugillum: fiat decoctio ad libram: colaturæ adde sirupi de rosis siccis & violati & de papauere, singulorum vnciam, sacchari penidiani vncias duas: fiat potus clarus: aromatizetur drachmā diatragacanthi frigidi capharati. bibat bis die cyathū. Post biduū ita purgetur, Accipe præscripti decocti vncias quinque: hama indorū pinguiū semunciam: sebesten duodecim: corticem omnium myrobalanorum, cuiusque drachmam: rhabbari drach-

Notat.

Ab erofione.

Rases in  
coagula  
vina.Rases pra  
cellens re  
medum.

Cadin.

drachmas duas: fantali citrini scriptulum: expressioni adde sirupi rosati laxativi vnciam: misce: fiat haustus. Ita sensim biliosi & nitrosi succi vacuentur. Sed, vt dixi, antea præparetur materia sirupo rosato, & de nenuphare, ex papauere, sirupo de oxyacantho, & de granatis: cum aqua portulacæ, calycū rosati, plantaginis, portulacæ, equiseti, polygoni, acetosæ: adiectis quattuor granis caphuri. Atramen vbi catarrhi materia acerrima est: quia hæc plerumque est separata à sanguine, & est tenuis, illico, sine præparatione purgari debet. Abstine à scammoniatis, nam venas aperiunt. Sed dices, Galenus 3. methodi 14. talia præscribit, & aloë, & colocynthidem, scammonium. Respondemus, cum illa præscribere non in præsentī eruptione sanguinea, sed vbi è catarrho acerrimo metus est ab abrasione, non autem in rupto aut aperto vase. Quidam præbent rhabarbari vtilitati ac in pollinem redacti drachmas duas cū aqua portulacæ. Vel semen portulacæ assūm emulgeatur in aqua fructuum, cui misce rhabarbarum: nam id proprietate quadam stringit sanguinem. Sed, vt monui, biliosus sanguis ad exclusionem parietur sirupo ex succo acetosæ, ex omphacio, ex succo granatorum, cydoniorum, malorum, ex myrto: cum aqua solari, plantaginis, vel portulacæ. Si æger sit febris expertus, interuallis purgetur diluto rhabarbari cum māna, ex decocto tamarindorum, passularū & cæterorū calium. Purgato itaque, si opus est, corpore, & si sanguis nimium profluit, sistatur adstringentibus, glutinātibz & refrigerantibus. Bis aut ter in die hac vtatur, Accipe lapidis haimatitidis loti cum aqua plantaginis, coralli rubri similiter loti, cuiusque scriptulos quattuor: terræ lemnis drachmas duas: misce, fiat puluis tenuissimus: adde trochiscorum de carabe drachmam: sumat sesquidrachmam cum aqua plantaginis & ex rosarum calyculis: affunde sirupi de ribes duas vncias. Si hac non sistitur, veni ad maius remedium, Accipe Philonij Persici drachmam vnam: lapidis haimatitidis semidrachmam: sirupi cydoniorū vncias duas: aque plantaginis quod sufficit vt diluantur omnia. accipiat tempore somni drachmā: sacchari perlati, con-

seruæ buglossæ, cuiusque vncias: vel melcum saccharo optimo, & rege folijs auri. Præscribatur semper talia, quæ vim habent retinendi humorum acerrimam vim: Vitaque hic sanguinis missionem, dicit Trallianus, & vsum acidorum & etiam adstringentium. Si sit ab acie catarrho, vtatur diacodio, & ore contineat conseruum rosarum. Vel hoc linctū vtatur à purgatione, Accipe conseruæ rosarum veteris, & conularum radicem symphyti, cuiusque vncias: conseruæ sacchari vel adianti & nenupharis, singulorum semunciam: coralli rubri vsti & loti aqua rosacæ, haimatitidis, terræ lemnis, carabes, puluis diapaucuris, diatragacanthi, cuiusque drachmam: cum sirupo de ribes fiat electarium: sumat castaneæ molem manū & vesperti, & longè à cibo. Vehementer laudo puluicē Haly ad talem. Rondelenius hoc videbatur: accipiebat caphuri grana quattuor: aque rosarū vncias duas: sirupi papaueris vnciam: misce. hoc sanguinem sistit, cuiusque flammulentam vim sedat. Succus plantaginis, vbi à corrosione malum est, potens ad sanitatem est. Sed vide semper minus plus sanguinis aut puris hic prodeat: Si plurimum sanguinis, vtere adstringentibus: Sin multum puris & parum sanguinis, erit potenter siccandum. Quare tunc cum Galeno 5. Meth. 6. vitemus folijs trochiscis Andronis Polydæ, vel trochiscis ex chaly cobusta. Alioqui pus perdit pulmonem. Sin ab erosionē sanguis copiosus effluat, solis adstringentibus sistatur: dein vbi pus misceatur, miscebis tu etiam trochiscos, tandem cum pus expektorator merum, solis vteris trochiscis. Commendatur etiā à Græcis & Arabibus coagulū hædi, leporis, vel cerui: nā deterget materiā acrē erosionis causa. Datur magnitudine cicicis, ex iis quæ acrē vim resringūt, vt aqua ferratā, mulā, lacte, vino granatorū. Fiat linctus ex cōserua rosarum, cum succo plantaginis. Fit etiā conserua ex folijs plantaginis. Præbentur etiam decocta cochlearum, testudinum, & inde aqua destillata, remifector aqua chalybeata, in qua coxit semen borraginis, nam absterget. Si tussis vexat, adde sirupum myrtullorum. Horā somni sumat drachmam coralli vsti, vel haimatitidis vel Lemnis terræ, vel trochiscorum ex electro, de spodio. Attamen si vsu adstringentium diffi-

Cadin.

culis reddatur respiratio, illico redi ad leni-  
tia. Iuber Paulus, vt exhibeamus ea quæ  
opium habent, vbi ab erosione malum  
venit. Vbi acris est materia, accipe sirupum  
violatum ac papauerinum cum mîna cy-  
doniorum. Et non solum narcoticorum  
vsum inibimus vbi ab erosione penditur  
æger, verum etiam in omni spûto sangui-  
neo vbi necessitas virget, siue id fuerit à di-  
rectis, siue vomitu feratur, siue à rupto vase  
aut aperto, cõ veniemus: cum scilicet ni-  
miã profunditur copiã sanguis. Præterea  
vbi vehemens est agitatio & somni pauper-  
tas. Author enim est Cælius Aurelianus,  
tussicularia immodica in hoc malo esse vi-  
tanda. Narcotica potentissimè tussim se-  
dant. Galenus vitur diaspermate, & the-  
riaca noua. Nos, quia theriaca noua sæpe  
caremus, recentare theriacam solemus,  
hoc modo, Accipe theriacæ optimæ semi-  
drachmam: Philonij Romani grana quin-  
que vel sex: misce: propina cum aqua pa-  
paueris rheados. Emulsio fit feminis papa-  
ueris rubri etiam, in aqua rheados papaue-  
ris: hoc enim organum sanguinis infringit.  
Si vomit sanguinem, Accipe philonij  
scriptulum cum conferua rosarum & con-  
ferua mentis. In catarrhorum illapsu po-  
tentissimè etiam hæc succurrunt. Damas  
Philonium Rom. cū polygoni fuceo, vel  
cum plantaginis succo, vbi vomitu erum-  
pit sanguis. In grauiori tussi remiscemus  
philonium cum aqua rosata, vel cum vino  
diluto. Interdum loco diaspermati sumat  
ante somnum duas pilulas de cynoglossa  
Nicolai. Oribasius laudat si vesperti cubi-  
turo detur theriaca noua trium mensium,  
cum malum euenit ab erosione & catar-  
rho. addit, cum particularum sedata est in-  
flammatiõ, eaq̃ue redire ad temperiem,  
theriaca & lacte vti licet. Præclare hoc si-  
lit: accipe lapidis haimatidis in pollinem  
redacti semunciam: capharæ semidrach-  
mam: feminis hyosciami albi, ac albi pa-  
paueris, cuiusque drachmas tres: terræ si-  
gillatæ, corallorum rubrorum exactè pul-  
uerisatorum, cuiusque drachmas duas:  
conferuæ veteris rosarum vncias duas: su-  
mat manè & vesperti drachmam vel semi-  
drachmam. Sæpe vitimur sirupo papaueris,  
ne enascatur in pectore erysipelas phle-  
gmonodes. Stringit etiam egregiè philo-  
nium Mesues cum succo plantaginis, vel

cum decocto masticeis. Philonium etiam  
Persicum, & aurea Alexandrina, trochisci  
de terra lemnia cum aqua plantaginis, tro-  
chisci diaspermati Galeni, ex passo. tro-  
chisci de corallo Nicolai: & de carabe. tro-  
chisci de electro Galeni. trochisci stellar, in  
aurora datur scripulus. after Galeni. Sed  
si stringentium vsu sanguis in pulmone  
retentus incipit putrescere, da aperientia  
& resoluentia, quò prodeat sanguis niger  
& puidus: ac postea mundum viscus red-  
datur, & glutinantibus curetur. Si in ven-  
triculo concreuit sanguis, vacua aloë, vel  
da thymbram ex aceto. Quibus ac capite  
influit sanguis in thoracem vel ventricu-  
lum, his non stringentia, sed dissoluentia  
debentur: vt aqua nucum, coagulum cum  
melle, pix. In diapedesi conferi portulacæ,  
assatum semen papaueris, iuiubæ, mucea-  
go psyllij cum puluere subtilissimo haima-  
titidis loci cum aqua plantaginis. Vel acci-  
pe haimatidis ita præparati semidrach-  
mam: succi portulacæ vel plantaginis, vel  
muecaginis psyllij vnciam: Psylliũ assum,  
& conuassatum cum succo portulacæ,  
dum fiat muceosum. Accipe feminis hyo-  
cyami albi scriptulum: succi arnoglossæ  
semunciam. Accum, inquit Cælius Aure-  
lianus, ex Themisonis & Thesiali decreto,  
in rupto vel aperto vase sincerum dabimus  
ore retinendum, vel gargarisandum, aut  
sorbendum, spreto quorundam iudicio,  
qui asperum aut tussiculam commouens,  
atque fluorem promouens aceti dixerunt:  
siquidem etiam gelatiũ sanguinem soluit.  
etenim asperat, vel tussiculam commouet,  
si iugiter & immodicè fuerit datum. Con-  
trunde malo punice cum aceto, expressum  
succum eoque: tandem adde mel. adice  
capita papaueris sicca cum semine. Accipe  
boli Armeniæ drachmam: conferuæ rosa-  
rum antiquæ semidrachmam: fiat puluis,  
& cum sirupo de rosis siccis, vel cum succo  
portulacæ fiant pilulæ instar cicoris. ten-  
cat vnam in ore: & capiat dormiturus  
quattuor. Accipe looch de portulacæ se-  
semunciam: diatragacanthi frigidis semun-  
ciam: misce, sumat sæpe. Studebimus vt  
robur visceribus afflueret hoc modo, Acci-  
pe terræ sigillatæ, boli, coralli viriusque,  
benè præparati, carabes, lapidis haimatidis  
præparati, cuiusque drachmam: feminis  
portulacæ, & plantaginis, singulorum fe-  
midrach-

Narcoti-  
ca.s. Ma-  
licia.

Contin.

In Dia-  
pedesi.In omni  
erupsione  
sanguinis.Exul-  
teri re-  
medium.Reberan-  
tia.

**midrachmam:** amygdalorum dulcium, pedicularum lotarum in aqua portulacæ & rosarum, vel per noctem infusarum in aquam myrtillorum, cuiusq. fescunciam: specierum electarij diatrachacanti frigidi drachmas duas: specierum diarrhodonis abbatis semidrachmam: pulpæ caponis vel turturum, aut carniū testudinum coctarum cum aqua extinctionis chalybis semilibram: sacchari albiissimi quod satis est ut fiat confectio solida, ad formam sacchari perlati. Vel saccharum solvatur in aqua amoglossæ, fiatque confectio solida per moriscos, pondere semuncie, sumat manè & vesperti vnum. Accipe confusæ rosarum, cornorum, radicum symphyti conditarum, cuiusque vncias duas: specierum diarrhodonis abbatis, diamargariti frigidi, erium fantalorum, aromatici rosati, singulorum drachmas duas: cornu cerui, coralli rubri pulverisati, singulorum sesquidrachmam: trochiscorum de terra sigillata, de carabe, de spodio, singulorum quattuor scriptulos: feminis acetosæ, portulacæ, plantaginis, cuiusque drachmas duas: aquæ portulacæ, plantaginis, rosarum, vini granatorum, singulorum vncias quattuor: decoctionis duarum turturum & vnus perdicis libras quattuor: cum mica panis albiissimi & infusa in vino granatoto, & carnibus vnus capi fiat distillatio. Mox accipe huius distillati libram: coletur per manicam cum confusæ rosarum solutæ in aquæ plantaginis vncias duabus: fantalorum & spicæ, cuiusque semiscriptulo. Vel Accipe aquæ salicis libram vnam: confusæ rosarum semilibram: fiat mel: detur bis in die ad 3ij in potu. Nam accedat eis æger à vino: vel illud diluatur decocto rosarum siccarum, vel tragacanthi, vel aqua rosarum. Viter dulcia vina, nimium enim dilatant pulmones. Iam ad ea venio quæ foris admouentur. Vt itaque sanguinis organum placeat, pectus & collum hoc illinatur. Accipe olei massicini, cydoniorum malorum, & myrtillorum, singulorum vnciam: seui hircini aqua rosatâ diluti drachmas tres: pulueris coralli rubri, boli, sanguinis draconis, olibani, massiches, cuiusque semidrachmam: ceræ albæ, quod satis sit ut fiat vnguentum. Vel voge pectus oleo rosato vel myrtino: hæc enim non ardent alas partium spirabilium. Si

potenter ex spirabilibus partibus funditur sanguis, solue in aceto succum acaciæ, vel hypocistidos, vel aloën, & spongiam admove. & potet vinum ex prunis syluestribus, nam, auihore Aretæo, præsentius remedio sunt quæ deuorantur & potantur, quàm ea quæ foris admouentur. Attamen omni ex parte succurrendum in tam præcipiti malo. Aretæus ille idem iubet ut emplastra admoveantur refrigerantia, & siccantia: addit acetum, & salicis foliorum succum, thus, myrrham, alumen, ær vstum, & talia, iubetq. ut emplastris spongiz pauco aceto persulæ superdentur. Vel fiat epishema ex palmulis vino nigro coctis in emplastrum, cum puluere malicorij & acaciæ. Aut lentis farina tenuis per incerniculum transmissa, ex vnguento rosato & cera imposito pectori, & remisce symphyti radicem tusam & cribratam. Radices pruni syluestris coque in aceto, contundeque in placentæ speciem, & remisce rhoën & myrtum. Iubet Trallianus ut si sequenter hæc mutantur, ne incalessant: id enim, inquit, sanguinem eò vocat, propterea vult ut locus sæpè oleo rosato cum pauco aceto rigetur. Emplastrum diapalma rosaceo & modico aceto soluiur. Quin Trallianus in erosionē, quæ sit à præcalida capitis temperie, fluxionis auihore, suadet ut rosaceum capiti infundatur ex alto, ægro in balneo hærente: nam balneum acerrimos succos mitificat. Ac interim purgetur corpus à salis humoribus, à præparatione scilicet, ut antè diximus. Si à pectore ipso venit sanguis, Quintus Horatianus postea frigidâ spongiam madidam thoraci adhuc calenti imponit, frequentius immutando: deinde oleum myrrinum miscet aceto, postea verò cum vino. Idem suadet Paulus Ægineta. sed tepidam admouet poscam: & post septimum diem lanam succidam cum rosaceo vel myrteo cum aceto: aut alumen, acaciæ, malicorij, thus, & talia. Emplastrum etiam barbarum pectori imponitur. Nonus, Græcus medicus, iniurio admouet pectori lanam succidam cum aceto & oleo rosato vel myrtino: dein emplastrum de salicibus diuicem dictum, Eorum remedium quæ foris & etiam intus adhibentur longissimam seriem recenset Aëtius. Iam ad diætam venio. Aër sit frigidior, inquit Aurelianus, cui etiam

Aët. 1. 14.

63.

Diæta,

Aët.

m m 3

sub-

Marcellus empiricus hoc laudat : Accipe acciez, hipocistidos, balustiorum, cuiusque drachmas duas : opij drachmā vnam. balustium cribratum ; cætera pridie macezata in aqua misceantur diligenter, vt fiant trochisci ad pondus semidrachmæ : dantur ad pondus surgendo drachmæ, ex cyathis duobus aquæ. Succus lingvæ propinatur per triduum. succus vel pulvis foliorum fabiaz, ex vino vetere picato, inquit Marcellus, sanat in viræ discrimine constitutum. Succi basilici vulgaris dantur vnciæ duæ. Si calet admodum, da succum portulacæ vel plantaginis. Si sanguis fuerit coagulatus in pulmone vel ventriculo, dabis oxymelitis vnciam : cum coaguli leporis vel hœdi granis quinque : adde aquæ faccharatæ vncias duas. misce. Aqua chalybeata coquatur cum tragacantho affo & gummi Arabico. Refert doctissimus ac diligentissimus D. Io. Schenckius, hoc pulvere quendam curatum fuisse à Iulio Scaligero, quem descriperat ex Serapione, Accipit spodij, rosarum rubrarum, boli Armeniæ, terræ sigillatæ, haimatidis, singulorum semunciam : coralli rubri, carabes, margaritarum non perforatarum, cuiusque drachmas duas cum semisse gummi, tragacanthi, singulorum drachmas duas : seminis papaveris, portulacæ, seminis malux, seminis rosarum rubrarū, seminis arnoglossæ, cornu cerui combusti, amyli torrefacti, cuiusque drachmas tres : terantur, misceantur, fiat pulvis. Huius dosis drachmæ tres : datur cum aqua pluuiali. Bononiensis Medicus celeberrimus hoc in secretis habebat : accipiebat seminis hyoscyami albi, seminis papaveris albi cuiusque drachmas decem : terræ sigillatæ, corallorum rubrorum, singulorum drachmas quinque : sacchari rosati antiquissimi, quantum satis est vt fiat electarium. dosis huius est semidrachma mande & vesperi. hinc crassior reddidit sanguis. Io. Crato Medicus Cæsaris huic præferebat sum diurnam chamædryos. Accipe fimi murini scriptulos duos, anisorum semidrachmam : fiat pulvis tenuis : fumar totum cum aqua plantaginis. Accipe sectam ouis crudi, abstrahere internam membranam : calcina : da duas drachmas ex sirupode totis succis, vel ex semuncia sirupi de

portulaca aut de myrrullie. Mesue iubet vt mande sumat semen psyllij assum & conquisatum in aqua rosata, cum coriandro affo. eodem modo etiam semen portulacæ cum aqua rosarum. hæc incrasstant sanguinem. Ita etiam semen retorridum papaveris concutitur cum aqua expressionis portulacæ, dum fiat mucaginosa. sic & semen hyoscyami. Bolus Armeniæ cum succo plantaginis. Decoctum cancerum & hordei cum sirupo de papauere. Aqua de floribus hystri, vel ex foliis quercus, vel equiseti, datur ad vncias sex cum saccharo. Accipe carniū limacum coctum in vino austero, & in aqua plantaginis, nimirum libris duabus : confertur rosarum, & consolidæ maioris, cuiusque libram : fiat distillatio. accipe huius liquoris distillati libram : sacchari vncias duas : fantalli flauis scriptulum : trahere per manicam. Gutturæ allquor olei sulphuris cum aqua burse pastoris vel plantaginis. Ad vinum robur, accipe confertur cornorum, symphyti, rosarum, cuiusque vncias duas : specterū diarrhodonis abbatis, diatrageantii frigidi, trium sanalorum, aromati rosati, singulorum drachmam : cornu cerui, coralli puluerisati, cuiusque duas drachmas : trochiscorum de terra lemmia, & de spodio, & de succino, singulorum drachmam : seminis acetosæ, portulacæ, plantaginis, cuiusque sesquidrachmam : vini granatorum, succi plantaginis, singulorum vncias quatuor : decocti duarum tururum & vnius peidicis libras quatuor : micam panis insulam vino granatorum, & cum carne vnius capii fiat distillatio : Illud ius trahere per manicam Hippocratis. Looch de portulaca cum philonio Persico. accipe theriacæ aut diacurcumæ drachmam : coaguli leporis scriptulum : cum aqua scabiosæ vel hyssopid soluit grumos sanguinis. vel aqua nasturtij pota. Afexis saudat finum muris potum cum succo plantaginis & saccharo. Stritiges, Accipe sirupi myrti & papaveris, cuiusque vaciam : boli scriptulum. sumat noctu. Cinerem corticis subteris sumat ex aqua vel vino. Accipe mumiæ drachmam, succi equiseti vnciam : aquæ equiseti sesquunciam : bibat frigide. Hæstæus de spurto sanguinis.

Serap. v.  
tract. §. 5.

Ad vires.



## CAPVT VII.

## DE PHTHISI, hoc est TABE.

Varia  
nominis  
significa-  
tio : nam  
Tabes  
species.

**C**VM Tabes generaliter accepta, sit  
vicius corporis ex siccitate con-  
sumptio, tres eius species apud auctores  
celebratæ fuere: quarum vna Atrophia di-  
citur, in qua totum corpus suo nutritur  
fraudatur, quamuis ab affectu tali interdū  
vel peculiaris aliqua pars gracilescat, cum  
ea sola suo fraudatur genio. Hæc nasci so-  
lebat à concepta intemperie valida, vt cum  
pulmo squalet & ardet : vel cum partis  
nervus resoluitur. Secunda eius species est,  
cum corpus prauis circumfluit succis, quos  
cum partes non in sui nutritum prole-  
stant, corpus arescit. Hoc est quod dicit  
Hippocrates, qui ventres habent calidos,  
carnes habent frigidas, hoc est, quibus ca-  
choymia obstat, ut viscera, his nõ attra-  
hitur in sanguinem à partibus corporis carnis:  
unde illæ frigidae sunt: nam tantum ha-  
bent partes caloris, quantum habent san-  
guinis. Tertia species Tabis est Phthoë,  
hoc est corruptio, vt interpretatur Cælius  
Aurelianus, quæ plerumque vlcus pulmo-  
nis consequitur, & per excellentiam Phthi-  
sis & Tabes dicitur: de qua nos hic age-  
mus. Dicitur Aretæo *phthorós*, & *phthis*,  
quando ab empyemate, vel illapso pure  
corroditur pulmo. Dicitur autem Phthisis  
*phthorós*, decrelescere. Athenienses pro-  
priè hoc malum *phthis* dixere, hoc est, cor-  
ruptionem. appellatur etiam *phthis*.  
Hippocrates recenset etiã tres species Ta-  
bis, vnam quæ fit à fluxu materię pituito-  
sæ à capite in pulmones: secundam à labo-  
re; tertiam à spinali medulla, ex qua luxu-  
riosis in primis laborant. Sed nos agamus  
de ea, quæ à pulmone exulcerato nascitur,  
cui consuetaria est febris. quam ita defini-  
mus: Phthisis est totius corporis accisio,  
orta ab vlcere pulmonis. Dixi esse accisio-  
nem corporis totius: immutatur enim cor-  
pus in charactere & mole, nam affligitur  
pars princeps, cuius officio vita carere ne-  
quit. Hæc autem macilentia dum noudum  
officit actionibus corporis, est symptoma  
in mutata qualitate. Consistit enim hoc  
qualitatis symptoma in mutata naturali

Libro De  
internis  
passionibus.

Definitio.  
& eius  
explicatio.

mole & charactere. Potest autem hæc ma-  
cilentia tandem in censum morborum ve-  
nire, cum ingrauescens eo peruenit, vt cor-  
poris actioni officiat. Sed dicit quis, Si  
macilentia hæc est symptoma, igitur vlcere  
remoto, cedere ea debet, nam symptoma  
sequitur morbum vt umbra corpus. Respon-  
deo, non quoduis symptoma habet suum  
causam, & suam penitentiã à morbo,  
sæpe enim ab excluso morbo persecuerat  
symptoma, vt cucurbit in idolo. Quare id  
potissimum locū habet in eo symptoma, quod  
immediatè refertur in morbum. At  
qualitas mutata non semper refertur æqui-  
parius in morbum (quemadmodum tumor  
paruus) sed actio læsa semper eo refertur.  
Et hinc est quod morbus definitur per  
actionem. Ideo diximus hanc maciem non  
dependere ab vlcere pulmonis, sed inde or-  
tam. Et hoc discrimine distinguitur hæc  
phthisis ab ea tabe quæ nascitur ex senio,  
& ab intemperie frigida & sicca. Præterea  
in definitione diximus, Cum febre hectica,  
cum enim pulmo pure ac vlcere occupatus  
sit, cumque cor pulmonibus quasi inhabi-  
tet & vndique ab iis inuoluatur ac tegatur,  
fieri nequit quin plurimi vapores saniosi  
ac putridi cor feriant, ac solidas eius partes  
in squalorem ac calorem abripiant: quare  
spiritus vitales incendio conflagrantes, &  
e corde in totum corpus emissi, id vñ in  
consimilem intemperiem abripiunt. Hinc  
nascitur funesta illa macies: cum partes  
corporis neccare ac ambrosia illa diuina,  
quam à corde temperato accipere solent,  
spoliantur. Indita partibus naturalibus vis  
tunc faiscit: nam partes cunctæ exaluant  
incendio, ita, vt non possitalimenta co-  
quere, sed potius evanescat vt incendij in-  
tenuis auras. Vltimò diximus in definitio-  
ne, Orta ab vlcere pulmonis: hoc enim  
obtinet rationem causæ consuetudine Tabis.  
huius autem causæ sunt, apertio, erosio, vel  
ruptio alicuius vasis pulmonum. Horum  
autem causæ sunt tum antecedentes, tum  
procatartice, quæ vim habent aperiendi,  
rodendi, vel vlcerandi. Nascitur hæc vera  
phthisis ex vlcere pulmonum. Omne vlcus  
fit à causa mordente ac lacerante vniõnem  
partis, ac detexit quid suū illā acerrimā vi,  
ab ipsa parte, nam ita discriminatur à vul-  
nere. Hoc autem ei evenit si falsa activæ  
materia: nam suavis pituita ac sanguis

Dubium.

C. A. V.

A. B.

n. n. abra-



subſcribit Aretæus. Vitetur acris ſumofus, & ventofus, & nimium madens : niſi acris ſuccus in vitio ſit. Euporatio fiat ex aceto in quo coxit ſantalum, roſa, caphura. Conſternatur ſolum pampinis, ſalice, quercu. Sanguinei colores ne oculos ſeriant. In eunic morbo parca manu detur forbitio : imò inedia eſt hic vilis. audeat hic Cælius Aurelianus triiduanam inediã præſcribere. Sint alimenta frigida aſtu & vi : nam calor ſanguinem euocat. Vbi à rupto vaſe venit malum, vitetur piſana cum amylo, vel pomo cotoneo : lueia ouorum comedat, inquit Trallianus, & panatella vtatur. Ab oleo & multo ſale caueat. Farina oryæ ex decocto cyroniorũ malorum & palmularum. ſi non tuſit, cum aceto : nam, inquit Aretæus, per varia eundum. Fiat pulcicula ex biſcoſto pane in puluerem tuſo. Coque cibos cum omphacio. Si ſament, edendi libidinem extinguant coſtã lactucã cum aceto, & ſpinachiã, acetosã, portulacã. vita nitroſa. Poſt ſeptimum diem pulli concedantur, vbi non amplius expuit ſanguinem. nam iſtis, auctore Aretæo, minimè ea quæ ægrè conſequuntur danda ſunt. Pedes etiam ſuum, & piſces ſaxatiles, aceto adiecto inter coquendum. Si lacti aſſuevit, inquit Trallianus, ſumat id, modò non febricitet. Cotonæ & pyra concede. Piſacia & malum panicum reſiit Trallianus. Si ſummum periculũ in metu eſt ob ſanguinis effuſionem, tunc, inquit Aretæus, iniucundis ac ægrè mitigabilibus etiam vtetur, modò ſalutem adſerant. tunc galli acida trita cibi aſpergantur. oua craſſius coſta, cum malicorio aut galli exhibe. & potus ſit paucus. Hæc ſtinguat & refrigerant. Sin ſanguinem & ſpiritum velis craſſiorem efficere, lac, amyllum, & alica proderunt : & hæc miſce cum lacte. ſed hæc forbitio non ſit liquida : adde palmulas. Coquitur ſax in lacte, cum malicorio. Sed cautio ſit, nam immoderate ſiccantium vſus, ruſſi quibuſdam venas lacerant. Hic, ne quid nimis : nam inſida ſunt hæc mala. Vbi ab eroſione provenit malum, vitet acris & acida, detur piſana, malua, amyllum : Et ſi non febricitat, vile erit lac, tragacanthum, & lactuca. His ſeptimo die, nam tuebant horum vices, gallinæ concedantur ſine ſale. Raro euenit vt calor his non oboritur, nam acris

plerumque catarrhus in vitio eſt, vbi ab eroſione vitium eſt. Dentur aſtici & piſces duri, pedes ſuilli, pomacei fruſtus coſti madentes, non ſtringentes, & paſſulæ, portulacæ, cucurbita, plantago, vituli extrema, cuniculi, ſed parè : cactri in lacte vel aqua hordei coſti, pyra, pruna acida & ceraſa condita. ſumat manè ſemen papaveris : & os riget diacodio; vel ore continet conſervam roſarum, Lac capillum ſanguinem craſſiorem reddit, & ſiccã intemperiem caſtigat. Lac chalybeatum ſiccet madentes nimum pulmones, & vna abſterget. Gallinæ aſſandæ veniet rebus adſtringentibus inſarciatur. Sed Oribasius cum provenit malum ex deſtillatione, vult ægrum ali ſolâ forbitione auſtiorum fruſtuum. Acidum lac in quo coxere lapilli fluviatiles. oua ex aceto coſta. Pro ientaculo ſumat pulciculam ſaxatam ex aqua roſis ſolis & ex farina auenæ. Vel ſiat puls ex lacte coſto cum farina hordei & ſemine papaveris. Raſes iubet vt ſub obſoniorum & agreſtiam cibis miſceamus, & interdum terram ſigillatam. Portulacæ conſert. Meſue laudat leporem, oryza. Sorbeat dormiturus piſanæ patinam cum conſerva roſarum veteri : & manè ſumat ovum cum ſuccini drachma. Abſtineat ab omnibus flatulentis, vt à leguminibus, à frixis in ſartagine, ab acris, à muſto, pomis crudis, à carnis antiquis ſale conditis. Non comedat vbi cruditas reſtat. abſtineat ab vſu petroſelini Macedonici, ſaſamentis, & à caſeo veteri : hæc enim rupto vaſi bellum indixere. Sin à rupta vena periclitatur, caueat à ſatietaſe, à crudis, & à vino meraco, à flatulentis, ab iris, nec leuet pondera manus ventrem ne cohabeat, nec vllas evacuationes ſolemnes. Si ab exercitio ſanguinem expuit, caueat à clamoſe, & à venetis. Potus,

Incoque ceruiſæ maſtice. Accipe amyli, coralli rubri, gummi Arabici & tragacanthi, cuiuſque drachmam : coque in libris decem aquæ chalybeata, ad tertie partis conſumptionem, & cola : pro potu. Ad ſitim vtatur ſirupo de roſis ſiccis, vel cotoneorum ex aqua chalybeata. Quidam, inquit Trallianus, toto anno à vino abſtinuit, ſolo lacte contentus, cui interdum ſarinam incoquebat; euasi. Cum etiam pus exaceret. Balneũ & refrigerium vitet. Fricentur

tur

tur brachia, crura, & vincula interdum his initice. Silentium his prodest, atque exigua respiratio. Lecto decumbat non tremulo, sed firmo: concussio enim malum emperat. non nimium sit profundus accedens lectus, nam nimium calere non debet. sit sublimior decubitus, & supinus, at tamen omnis molestia absis. Aluus quotidie faciat officium: sin minus, excutitur tamarindis, castiâ, sirupo rosato, thabarbaro, myrobalanis, vel assumat terebinthinam mule natis. Ante cenam & prandium assumat toto anno semunciam conferuæ rosarum veteris, & interdum addas parum terræ lemnis. Caput sæpe laueat vesperino tempore, cum non amplius egreditur domum, ex decocto florum chamæmelæ, rosinæ, & agarici drachmæ: agaricum linteio ionctatur, & postea exprime. Et caput aspergat pulvere ex ladano, santali, rosis rubris, iride, gummi juniperino, caryophyllis. Si periculum sit ne a catarrho sanguinem spuat, fumet in ore cum ingreditur lectum quantitatem ciceris ex bolo: nam præferat circa periculum: quamvis cum periculo curet. Novas cicatrices, dicit Aretæus, solidabimus gestationibus, molibus frictionibus, peregrinationibus, animi oblectamentis, cibis variis atque vltis. Igitur hoc modo hominem instaurare, carneque replere, & novâ cicatrice solidare necesse est. Ad virum robur fiat conditum: accipe conferuæ rosarum antiquæ vncias duas: conferuæ radicum symphyti maioris vnciam: margaritarum splendida-rum, coralli rubri loti cum aqua rosarum & subtilissimè pulverisati, cuiusque drachmam: cum sirupo de symphyto fiat conditum. Sub noctem contineat hos trochiscos sub lingua. Accipe terræ sigillatæ semunciam: gummi Arabici, tragacanthi, amyli, cuiusque drachmam: macis scriptulum: spicæ nardi semiscriptulum: penidiorum vnciam, misce, & cum sirupo myrtino fiant trochisci instar lupulorum. Electarium de styrace, Accipe passulorum excinatarum, & cribro staceo transmissarum vnciam: glycyrrhizæ rasæ & subtilissimè pulverisatæ drachmas sex: ligni aloës, nucis moscatæ, cumini, cuiusque scriptulos duos, & grana quindécim: styracis calamitidis selquidrachmam, boli Armeniæ præparati drachmas duas: sacchari in aqua

betonice dissoluti quod satis sit ut fiat electarium in tabulis. Excipe adstringentia melle, vel sirupo myrtino, vel sirupo papaveris. Si in potu exhibere quid velis, id misce cum socco portulacæ, granatorum, vel polygoni, vel cum lacte vitulato, aut cum aqua distillata limacum. Accipe aquæ ex limaebis distillatæ libram: coletur per manicam, cum conferuæ rosacæ & consolidæ vncis tribus, & santali citrini scriptulo: ac spicæ semiscriptulo. In initio ad grumos sanguinis solvendos sumat acetum cum aqua ita temperatum ut bibi possit, & adice coagulum ciccris mole. Corallū torreatur, & in aceto extingatur. Accipe conferuæ rosacæ antiquæ vncias duas: conferuæ radicū lymphii vnciam: pulveris diatrageanthi frigidī, & diapa-paveris, singulorum scriptulum: trochiscorum de terra sigillata, vel de carabe, aut de spodio semiscriptulum: sacchari rosati tabulati, quantum sufficit ut fiat tabulati. Et superbibat aquam equiseti: vel da dormituro drachmam trochiscorum de electro. validè sistit sanguinem. Succus viticæ bibitus quibusdam secretum remedium habetur. propinant diebus sex succi illius vncias quatuor: & in fusclo pulli & verucis incoquant ipsam viticam. Alij præbent succum centinodiz. Pulvis mororum siccatorem. thus cum succo millefolij. Amicus Empiricus Marcellus eoque sanguinem bubulum vel hœdinum cum aceto, vult ut per cochleare assidue gusteret. Succus cauliculorum rubi in sole ad mellaginem redactus. Alihæ radicis decoctum, inquit Oribasius, & mentastri, ilico supprimunt sanguinem. Centauri maioris ex aqua dantur drachmæ duæ si febricitant: alioqui ex vino. Grumos abigie thymus ex aceto coctus. Decoctum radicis lymphii datur cum eiusdem radicis pulvere. Accipe myrrhæ drachmas tres: croci drachmam: opij drachmas duas: thuris drachmas duas cum dimidia: seminis hyoscyami albi drachmas duas: corticum radicis hyoscyami albi drachmas duas: Cortex tenuissimè per se cribretur, dein crocū, hyoscyami semen, myrrha, thus: quibus misce opium pridie aquâ maceratū: subinde exiguum aquæ adiciatur: fiant exiguū trochisci, pondere duorum scriptulorum: dantur in noctem ex aquæ cyathis tribus.

Marcellus

EMPI-  
RICA.

Electariū  
de styrace.

subscribit Aretæus. Vitetur aër fumosus, & ventosus, & nimium madens: nisi acris succus in vitio sit. Evaporatio fiat ex aceto in quo coxit Santalum, rosa, caphura. Consternatur solum pampinis, salice, quercu. Sanguinei colores ne oculos seriant. Ineunte morbo parca manu detur sorbitio: imò inedia est hic vitilis. audet hic Cælius Aurelianus triduanam inediam præscribere. Sint alimenta frigida aëtu & vi: nam calor sanguinem euocat. Vbi à rupto vase venit malum, vitetur pitšana cum amylo, vel pomo cotoneo: luca ouorum comedat, inquit Trallianus, & panatella vetatur. Ab oleo & multo sale caueat. Farina oryzae ex decocto cytoniorum malorum & palmularum. si non tollit, cum aceto: nam, inquit Aretæus, per varia eundem. Fiat pulcritula ex bifcocto panc in puluerem truso. Coque cibos cum omphacio. Si fament, edendi libidinem extinguant cocta lactuca cum aceto, & spinachia, acetosa, portulaca. vita nitrosa. Post septimum diem pulli concedantur, vbi non amplius expuit sanguinem. nam istis, auctore Aretæo, minimè ea quæ ægrè consequuntur danda sunt. Pedes etiam suum, & pisces saxatiles, aceto adiecto inter coquendum. Si lacti assuevit, inquit Trallianus, sumat id, modò non febricitet. Cotonæ & pyra concede. Pistacia & malum panicum reiecit Trallianus. Si summum periculū in metu est ob sanguinis effusionem, tunc, inquit Aretæus, iniucundis ac ægrè mitigabilibus etiam vitetur, modò salutem adferant. tunc galli arida trita cibi aspergantur. oua crassius cocta, cum malicorio aut galli exhibe. & potus sit paucus. Hæc stringat & refrigerant. Sin sanguinem & spiritum velis crassiorem efficere, lac, amyllum, & alica proderunt: & hæc misce cum lacte. sed hæc sorbitio non sit liquidior adde palmulas. Coquitur far in lacte, cum malicorio. Sed cautio sit, nam immoderatus siccantium vfus, rursi quibusdam venas laceravit. Itè, ne quid nimis: nam infida sunt hæc mala. Vbi ab erosione prouenit malum, vitetur acris & acida, detur pitšana, malua, amyllum. Et si non febricitat, vile erit lac, tragacanthum, & lactuca. His septimo die, nam triabant horum vices, gallinæ concedantur sine sale. Raro enim & calor his non obuiatur, nam acris

plerumque catarrhus in vitio est, vbi ab erosione vitium est. Dentur affiaci & pisces duri, pedes suilli, pomacei succus cocti madentes, non stringentes, & passulæ, portulaca, cucurbita, plantago, vituli extrema, cucuculi, sed parè: cancri in lacte vel aqua hordei cocti, pyra, pruna acida & cerasa condita. sumat manè semen papaueris, & os riget diacodio, vel ore continet conseruam rosarum. Lac capillum sanguinem crassiorem reddit, & siccam interperiem castigat. Lac chalybeatum siccet madentes nimium pulmones, & vna absterget. Gallinæ assandæ venier tribus adstringentibus infarciantur. Sed Orribasius cum prouenit malum ex destillatione, vult ægrum ali solâ sorbitione austeriorum fructuum. Acidum lac in quo coxere lapilli fluuiales, oua ex aceto cocta. Pro ientaculo sumat pulcritulam satham ex aqua rosis solis & ex farina auenæ. Vel fiat puls ex lacte cocto cum farina hordei & semine papaueris. Rases iubet vrbis obsoniorum & agrestiam cibis misceamus, & interdum terram sigillatam. Portulaca conseret. Mesue laudat leporem, oryza. Sorbeat dormiturus pitšana patinam cum conserua rosarum veteri: & manè sumat ouum cum succini drachma. Abstineat ab omnibus flatulentis, vt à leguminibus, à frixis in sartagine, ab acris, à musto, pomis crudis, à carnibus antiquis sale conditis. Non comedat vbi cruditas restat. abstineat ab vsu petroselinæ Macedonici, salsamentis, & à caseo veteri: hæc enim rupto vultu bellum inducere. Sin à rupta vena periclitatur, caueat à satietate, à crudis, & à vino meraco, à flatulentis, ab ira, nec leuet pondera manus ventrem ne cohabeat, nec vllas euacuationes sole mnes. Si ab exercitio sanguinem expuit, caueat à clamore, & à venere. Potus, inquit Aretæus, omnino parcissimus esto. Incoque ceruissæ massicæ. Accipe amyli, coralli rubri, gummi Arabici & tragacanthi, cuiusque drachmam: coque in libris decem aquæ chalybeatæ, ad tertiarum partem consumptionem, & cola: pro potu. Ad sitim vitatur sirupo de rosis siccis, vel cotoneorum ex aqua chalybeata. Quidam, inquit Trallianus, toto anno à vino abstinent, solo lacte contentus, cui interdum farinam incoquebat, euasit, cum etiam pus excoerere. Balneū & ventrem vitetur. Fricen-

tur brachia, crura, & vincula interdum his iniice. Silentium his prodest, atque exigua respiratio. Lecto decumbat non tremulo, sed firmo: concussio epim malum emiserat. non nimum sit profundus accedens lectus, nam nimum calere non debet. sit sublimior decubitus, & supinus, at tamen omnis molestia absit. Alius quotidie faciat officium: sin minus, excutietur tamarindis, castiâ, sirupo rosato, ihabarbaro, myrobalanis, vel assumat terebinthinam mole nucis. Ante cenam & prandium assumat toto anno semunciam conferuæ rosarum veteris, & interdu addat parum terræ lemnis. Caput sæpè lauetur vespertino tempore, cum non amplius egredietur domum, ex decocto florum chamæmelorum, & agarici drachmæ: agaricum linteo innectatur, & postea exprime. Et caput aspergatur pulvere ex ladano, santalis, rosâ rubris, iride, gummi iuniperino, caryophyllis. Si periculum sit ne à catarrho sanguinem spuar, sumat in ore cum ingreditur lectum quantitatem ciceris ex bolorum præserui circa periculum: quamvis cum periculo curet. Nouas cicatrices, dicit Aretæus, solidabimus gestationibus, molibus frictionibus, peregrinationibus, animi oblectamentis, cibis variis atque vîtatîs. Igitur hoc modo hominem instaurare, carneque replere, & nouâ cicatrice solidare necesse est. Ad virtutis robur fiat conditum: accipe conferuæ rosarum antiquæ vncias duas: conferuæ radicem symphyti maioris vnciam: margaritarum splendida-rum, corallî rubri loti cum aqua rosarum & subtilissimè puluerisati, cuiusque drachmam: cum sirupo de symphyto fiat conditum. Sub noctem contineat hos trochiscos sub lingua. Accipe terræ sigillatæ semunciam: gummi Arabici, tragacanthi, amyli, cuiusque drachmam: macis scriptulum: spicæ nardi semiscriptulum: penidiorum vnciam, misce, & cum sirupo myrtino fiant trochisci in stil lupulorum. Electarium de styrace, Accipe pallasum exacinaratum, & cribro setaceo transmissarum vnciam: glycyrrhizæ rasæ & subtilissimè puluerisatæ drachmas sex: ligni aloës, nucis moscatæ, comini, cuiusque scriptulos duos, & grana quindecim: styracis calamitidis seiquidrachmam: boli Armeniæ præparati drachmas duas: sacchari in aqua

betonicæ dissoluti quod satis sit ut fiat electarium in tabulis. Excipe adstringentia melle, vel sirupo myrtino, vel sirupo papaueris. Si in potu exhibere quid velis, id misce cum succo portulacæ, granatorum, vel polygoni, vel cum lacte vitulato, aut cum aqua distillata limacum. Accipe aquæ ex limacibus distillatæ libram: coletur per manicam, cum conferuæ rosacæ & consolidæ vncias tribus, & santali citrini scriptulo: ac spicæ semiscriptulo. In initio ad gummos sanguinis soluendos sumat acetum cum aqua ita temperatum ut bibi possit, & adicce coagulum ciceris mole. Corallû torreatur, & in aceto extingatur. Accipe conferuæ rosacæ antiquæ vncias duas: conferuæ radicû lymphiti vnciam: pulueris diatragacanthi frigidi, & diapa-paueris, singulorum scriptulum: trochiscorum de terra sigillata, vel de carabe, aur de spodio semiscriptulum: sacchari rosati tabulati, quantum sufficit ut fiat tabulatu. Et superbibat aquam equiseti: velda dormituro drachmam trochiscorum de electo. validè sistit sanguinem. Succus viticæ bibitus quibusdam secretum remedium habetur. propinquant diebus sex succi illius vncias quatuor, & in fusclo pulli & yruccis incoquant ipsam viticam. Alij præbent succum centinodiz. Pulvis mororum siccatorem, thus cum succo millefolij. Ania-quus Empiricus Marcellus coquit sanguinem bubulum vel hœdionum cum aceto, vult ut per cochlear assidue gustetur. Succus cauliculorum rubi in sole ad melligenem redactus. Alitæ radicis decoctum, inquit Oribasius, & mentastri, ilico supprimunt sanguinem. Centaurei maioris ex aqua dantur drachmæ duæ si febricitant, aliqui ex vino. Græmos abigie thymus ex aceto, coctus. Decoctum radicis symphyti datur cum eiusdem radicis pulvere. Accipe myrrhæ drachmas tres: troci drachmam: opij drachmas duas: thuris drachmas duas cum dimidia: seminis hyoscyami albi drachmas duas: corticum radicis hyoscyami albi drachmas duas: Cortex tenuissimè per se cribretur, dein erorû, hyoscyami semen, myrrhæ tribus: quibus misce opium pridie aquâ maceratu subinde exiguum aquæ adiciatur: fiant equig trochisci, pondere duorum scriptulorum: dantur in noctem ex aqua cyathis tribus.

Marcellus

EMPI-  
RICA.

Electaria  
de styrace.

subscribit Aretæus. Vitetur aër fumosus, & ventosus, & nimium madens : nisi acris succus in vitio sit. Euaporatio fiat ex aceto in quo coxit Santalum, rosa, caphura. Consteratur solum pampinis, & salice, quercu. Sanguinei colores ne oculos seriant. Incurie morbo parca manu detur sorbitio : imò inedia est hic utilis. audet hic Cælius Aurelianus triduanam inediam præscribere. Sint alimenta frigida aëta & vi : nam calor sanguinem euocat. Vbi à rupto vase venit malum, vitetur pitana cum amylo, vel pomo cotoneo : lutea ouorum comedat, inquit Trallianus, & panarella veatur. Ab oleo & multo sale caueat. Farina oryæ ex decocto cytoniorū malorum & palmularum. si non iussit, cum aceto : nam, inquit Aretæus, per varia eundum. Fiat pulicula ex biscocto pane in puluerem tuso. Coque cibos cum omphacio. Si fament, edendi libidinem extinguant coctā lactucā cum aceto, & spinaciā, acetosā, portulacā. vita nitrosa. Post septimum diem pulli concedantur, vbi non amplius expuit sanguinem. nam istis, auctor Aretæus, minime ea quæ agrè concoquantur danda sunt. Pedes etiam suum, & de pisces saxatiles, aceto adiecto inter coquendum. Si lactū assuevit, inquit Trallianus, sumat id, modò non febricitet. Cotones & pyra concede. Pistacia & malum punicum reiciit Trallianus. Si summum periculū in metu est ob sanguinis effusionem, tunc, inquit Aretæus, iniuncundis ac agrè mitigabilibus etiam vitetur, modò salutem adferant. tunc gallā aridā triā cibi aspergantur. oua crassius cocta, cum malicorio aut gallā exhibe. & potus sit paucus. Hæc stringuat & refrigerant. Sin sanguinem & spiritum velis crassiorum efficere, lac, amyllum, & alica proderunt : & hæc misce cum lacte. sed hæc sorbitio non sit liquida : adde palmulas. Coquitur far in lacte, cum malicorio. Sed cautio sit, nam immoderatus siccantium vsus, tussi quibusdā venas lacerauit. Hic, ne quid nimis : nam infusa sunt hæc mala. Vbi ab erosionem provenit malum, vitet acris & acida, detur pitana, malua, amyllum. Et si non febricitet, utile erit lac, tragacanthum, & lactuca. His septimo die, nam turbant horum vires, gallinæ concedantur sine sale. Rarò euenit ut color his non obuiatur, nam acris

pletumque catarrhis in vitio est. vbi ab erosionem vitium est. Dentur astaci & pisces duri, pedes suilli, pomacei fructus cocti madentes, non stringentes, & passulæ, portulaca, eucurbia, plantago, vituli extrema, cuneuli, sed parè : cancri in lacte vel aqua hordei cocti, pyra, pruna acida & cerasa condita. sumat manè semen papaueris, & os riget diacodio, vel ore continet conseruam rosarum. Lac caprillum sanguinem crassiorum reddidit, & siccam interperiem castigat. Lac chalybeatum siccet madentes nimium pulmones, & vna absterget. Gallinæ assidat venier rebus adstringentibus infarcitur. Sed Orisarius cum provenit malum ex destillatione, vult ægrum ali solā sorbitione austeriorum fructuum. Acidum lac in quo coxerit lapilli fluuiatiles. oua ex aceto cocta. Pro ientaculo sumat puliculam saliam ex aqua rosis solis & ex farina auenæ. Vel fiat puls ex lacte cocto cum farina hordei & semine papaueris. Rases iubet vitibus obsoniorum & agrestium cibis miscemus, & interdum terram sigillatam. Portulaca confert. Mescit laudat leporem, oryza. Sorbet dormiurus pitana patinam cum conserua rosarum veteri : & manè sumat ouum cum succini drachma. Abstineat ab omnibus flatulentis, vt à leguminibus, à frixis in sartagine, ab acribus, à musto, pomis crudis, à carnibus antiquis sale conditis. Non comedat vbi cruditas restat. abstineat ab vsu petroselinī Macedonici, salamentis, & à castoreo veteri : hæc enim rupto vasi bellum indixere. Sin à rupta vena periclitatur, caueat à satietate, à crudis, & à vino meraco, à flatulentis, ab ira, nec leui pondera manus ventrem ne cohibeat, nec villas euacuationes solemnes. Si ab exercitio sanguinem expuit, caueat à clamore, & venet. Potus, inquit Aretæus, omnino parcissimus esto. Incoque ceruicis mastice. Accipe amyli, coralli rubri, gummi Arabici & tragacanthi, cuiusque drachmam : coque in libris decem aquæ chalybeatæ, ad tertiz partis consumptionem, & cola : pro potu. Ad sitim vitatur sirupo de rosis siccis, vel cotoneorum ex aqua chalybeata. Quidam, inquit Trallianus, toto anno à vino abstinent, solo lacte contentus, cui interdum farinam incoquebat, euasit, cum etiam pus excerneret. Balneū & ventrem vitet. Fricen-

Cibus.

Cautio.



tur brachia, crura, & vincula interdum his iniicere. Silentium his prodest, atque exigua respiratio. Lecto decumbat non tremulo, sed firmo: concussio enim malum emperat. non nimium sit profundus accedens lectus, nam nimium calere non debet. sit sublimior decubitus, & supinus, at tamen omnis molestia abest. Alius quotidie faciat officium: sin minus, excitetur tamarindis, cassiâ, sirupo rosato, rhabarbaro, myrobalanis, vel assumat terebinthinam mole nucis. Ante cenam & prandium assumat toto anno feruenciam conferuæ rosarum veteris, & interdum addat parum teræ leuiniæ. Caput sæpe lauius vesperino tempore, cum non amplius egredietur domum, ex decocto florum chamæmelorum, & agarici drachmæ: agaricum linteo ioneclatur, & postea exprime. Et caput aspergat puluere ex ladano, santalis, rosis rubris, iride, gummi iuniperino, caryophyllis. Si periculum sit ne à catarrho sanguinem spuat, sumat in ore cum ingreditur lectum quantitatem ciceris ex bolo: nam præferuat circa periculum: quamuis cum periculo caret. Nouas cicatrices, dicit Aretæus, solidabimus gestationibus, molibus frictionibus, peregrinationibus, animi oblectamentis, cibis variis atque vstitis. Igitur hoc modo hominem instaurare, carneque replere, & nouâ cicatrice solidare necesse est. Ad virum robur fiat conditum: accipe conferuæ rosarum antiquæ vncias duas: conferuæ radicum symphyti maioris vnciam: margaritarum splendidarum, coralli rubri loti cum aqua rosarum & subtilissimè puluerisati, cuiusque drachmam: cum sirupo de symphyto fiat conditum. Sub noctem contineat hos trochiscos sub lingua: Accipe teræ sigillatæ semunciam: gummi Arabici, tragacanthi, amyli, cuiusque drachmam: macis scriptulum: spicæ nardi semiscriptulum: pendiorum vnciam, misce & cum sirupo myrrino fiant trochisci instar lupulorum. Electarium de styrace. Accipe passularum exsiccatarum, & cribro sericeo transmissarum vnciam: glycyrrhizæ raze & subtilissimè puluerisatæ drachmas sex: ligni aloës, nucis moscatæ, cumini, cuiusque scriptulos duos, & grana quindécim: styracis calamitidis sesquidrachmam: boli Armeniæ præparati drachmas duas: sacchari in aqua

betonicæ dissoluti quod satis sit vt fiat electarium in tabulis. Excipe adstringentia melle, vel sirupo myrrino, vel sirupo papaueris. Si in potu exhibere quid velis, id misce cum succo portulacæ, granatorum, vel polygoni, vel cum lacte vitulato, aut cum aqua distillata limacum. Accipe aquæ ex limacibus distillatæ libram: coletur per manicam, cum conferuæ rosaræ & consolidæ vncis tribus, & fantalis citrini scriptulo: ac spicæ semiscriptulo. In initio ad grumos sanguinis soluendos sumat acetum cum aqua ita temperatum vt bibi possit, & adice coagulum ciceris mole. Corallū torreatur, & in aceto extingatur. Accipe conferuæ rosaræ antiquæ vncias duas: conferuæ radicū symphyti vnciam: pulueris diatrageanthi frigidī, & diapaucetis, singulorum scriptulum: trochiscorum de terra sigillata, vel de carabe, aut de spodio semiscriptulum: sacchari rosati tabulati, quantum sufficit vt fiat tabulati. Et superbibat aquam equiseti: vel da dormituro drachmam trochiscorum de electro. validè sistit sanguinem. Succus viticæ habitus quibusdam secretum remedium habebatur. propinant diebus sex succi illius vncias quatuor, & iusculo pulli & verucis incoquant ipsam viticam. Alij præbent succum centinodiz. Pulvis mororum siccatorem. thus cum succo millefolij. Antiquus Empiricus Marcellus coquit sanguinem bubulum vel hædinam cum aceto, vult vt per cochleare assidue gustetur. Succus cauliculorum rubi in sole ad mellisginem redactus. Althææ radicis decoctum, inquit Oribasius, & mentastri, ilico supprimunt sanguinem. Centauri maioris ex aqua dantur drachmæ duæ si febriatarint: alioqui ex vino. Grumos abigit thymus ex aceto coctus. Decoctum radicis symphyti datur cum eiusdem radicis puluere. Accipe myrrhæ drachmas tres: troci drachmam: opij drachmas duas: thorici drachmas duas cum dimidia: seminis hyoscyami albi drachmas duas: corticum radicis hyoscyami albi drachmas duas: Cortex tenuissimè per se cribretur, dein crocū, hyoscyami semen, myrrha, thus: quibus misce opium pridie aquâ maceratâ: subinde exiguum aquæ adicitur: fiant exigui trochisci, pondere duorum scriptulorum: dantur in noctem ex æquæ cyathis tribus.

Marsellus

EMPI-  
RICA.Electariū  
de styrace.

subſcribit Aretæus. Vitetur aer ſumofus, & ventofus, & nimium madens : niſi acris fuccus in vitio ſit. Euaporatio fiat ex aceto in quo coxit ſantalum, roſa, caphura. Conſtitinatur ſolum pampinis, ſalice, quercu. Sanguinei colores ne oculos ſeriant. In eunice morbo parca manu detur forbitio : imò inedia eſt hic vitilis. aude hic Cælius Aurelianus triidnam inediã præſcribere. Sint alimenta frigida aëu & vi : nam calor ſanguinem euocat. Vbi à rupto vaſe venit malum , vitetur priſana cum amylo, vel pomo cotoneo : luica ouorum comedat, inquit Trallianus, & panatella vitetur. Ab oleo & multo ſale caueat. Farina oryæ ex decocto cytoniorū malorum & palmularum. ſi non tuſit, cum aceto : nam, inquit Aretæus, per varia eundum. Fiat pulcicula ex biſcocto pane in puluerem tuſo. Coque cibos cum omphacio. Si ſament, edendi libidinem extinguant cocta lactuca cum aceto, & ſpinachia, acetosa, portulaca. vita niſi roſa. Poſt ſeptimum diem puli concedantur, vbi non amplius expuit ſanguinem. nam iſtis, auctore Aretæo, minimè ea quæ ægrè conſequentur danda ſunt. Pedes etiam ſuum, & piſces ſaxatiles, aceto adiecto inter coquendum. Si lacti aſſuevit, inquit Trallianus, ſumat id, modò non febricitet. Cotonæ & pyra concede. Piſſacia & malum panicum reiſcit Trallianus. Si ſummum periculū in metu eſt ob ſanguinis effuſionem, tunc, inquit Aretæus, iniucundis ac ægrè mitigabilibus etiam vitetur, modò ſalutem adferant. tunc galli arida trita cibi aſpergantur. oua craſſius cocta, cum malicorio aut galli exhibe. & potus ſit paucus. Hæc ſtinguat & refrigerant. Sin ſanguinem & ſpiritus velis craſſiorem efficeret, lac, amyllum, & alica proderunt : & hæc miſce cum lacte. ſed hæc forbitio non ſit liquida : adde palmulas. Coquitur ſar in lacte, cum malicorio. Sed cautio ſit, nam immoderatus ſiccantium vſus, ruſſi quibaldam venas lacerauit. Hæc, ne quid nimis : nam inſida ſunt hæc mala. Vbi ab eroſione prouenit malum, vitetur acria & acida, detur priſana, malua, amyllum : Et ſi non febricitat, vile erit lac, tragacanthum, & lactuca. His ſeptimo die, nam trabant horum vires, gallinæ concedantur ſine ſale. Raro euenit ut calor his non obuiatur, nam acris

plerumque catarrhus in vitio eſt, vbi ab eroſione vitium eſt. Dentur aſſaci & piſces duri, pedes ſuilli, pomacei fruſtus coſti madentes, non ſtringentes, & paſſulæ, portulaca, cucurbita, plantago, vituli extremita, cuniculi, ſed parçè : cancri in lacte vel aqua hordei coſti, pyra, pruna acida & cetera condita. ſumat manè ſemen papaueris & os riget diacodio, vel ore continet conſeruum roſarum. Lac capillum ſanguinem craſſiorem reddit, & ſiccã intemperiem caſtigat. Lac chalybeatum ſiccã madentes nimium pulmones, & vna abſterget. Gallinæ aſſandæ ventres adſtringentibus inſarciatur. Sed Oribasius cum prouenit malum ex deſtillatione, vult ægrum ali ſolâ forbitione auſteriorum fruſtum. Acidum lac in quo coxere lapilli fluuiatiles. oua ex aceto coſta. Pro ientaculo ſumat pulciculam ſadam ex aqua roſis ſolis & ex farina auenæ. Vel ſiat pulſ ex lacte coſto cum ſarina hordei & ſemine papaueris. Raſes iubet vtrius obſoniorum & agreſtam cibis miſceamur, & interdum terram ſigillatam. Portulaca conſert. Meſue laudat leporem, oryza. Sorbeat dormiturus priſane patinam cum conſerua roſarum veteri : & manè ſumat ouum cum ſuccini drachma. Abſtineat ab omnibus flatulentis, vt à leguminibus, à frixis in ſartagine, ab acris, à muſto, pomis crudis, à carnis antiquis ſale conditis. Non comedat vbi cruditas reſtat. abſtineat ab vſu petroſelini Macedonici, ſaſamentis, & à caſeo veteri : hæc enim rupto vaſi bellum indixere. Sin à rupta vena petriſcitur, caueat à ſatierare, à crudis, & à vino meraco, à flatulentis, ab ira, nec leuet pondera manus ventrem ne cohibeat, nec vllas euacuationes ſolemnes. Si ab exercitio ſanguinem expuit, caueat à clamore, & à venere. Potus, inquit Aretæus, omnino pauciſſimus eſto. Incoque ceruiſæ maſſicæ. Accipe amyli, coralli rubri, gummi Arabici & tragacanthi, cuiuſque drachmam : coque in libris decem aquæ chalybeatæ, ad tertiz partis conſumptionem, & cola : pro potu. Ad ſitim vitatur ſirupo de roſis ſiccis, vel cotoneorum ex aqua chalybeatæ. Quidam, inquit Trallianus, toto anno à vino abſtinuit, ſolo lacte contentus, cui interdum ſarinam incoquebat, euasit, cum etiam pus excerneret. Balneū & venter vitet. Fricen-

tur brachia, crura; & vincula interdum his iniici. Silentium his prodest, atque exigua respiratio. Lecto decumbat non remulo, sed firmo: concussio enim malum emperat, non nimium sit profundus accedens lectus, nam nimium calere non debet. sit sublimior decubitus, & supinus, at tamen omnis molestia absit. Alius quotidie faciat officium: sin minus, excutiet tamarindis, cassiâ, sirupo rosato, habarbaro, myrobalanis, vel assumat terebinthinam mole nucis. Ante cenam & prandium assumat toto anno semunciam conferuæ rosarum veteris, & interdum addat parum terræ lemniz. Caput sæpè lauetur vesperino tempore, cum non amplius egredietur domum, ex decocto florum chamæmelorum, & agarici drachmæ: agaricum lincioneatur, & postea exprime. Et caput aspergat pulvere ex ladano, santalis, rosis rubris, iride, gummi iuniperino, caryophyllis. Si periculum sit ne à catarrho sanguinem spuat, sumat in ore cum ingreditur lectum quantitatim ciceris ex bolo nam præservat citra periculum: quamvis cum periculo coret. Novas cicatrice, dicit Aretæus, solidabimus gestationibus, molibus frictionibus, peregrinationibus, animi oblectamentis, cibis, variis atque vstitatis. Igitur hoc modo hominem instaurare, carneque replere, & novâ cicatrice solidare necesse est. Ad virum robur fiat conditum: accipe conferuæ rosarum antiquæ vncias duas: conferuæ radicem symphyti majoris vnciam: margaritarum splendida-rum, coralli rubri loti cum aqua rosarum & subtilissimè pulverisati, cuiusque drachmam: cum sirupo de symphyto fiat conditum. Sub noctem contineat hos trochiscos sub lingua: Accipe terræ sigillatæ semunciam: gummi Arabici, tragacanthi, amyli, cuiusque drachmam: macis scriptulum: spicæ nardi semiscriptulum: penidiorum vnciam, misce, & cum sirupo myrtino fiant trochisci instar lupulorum. Electarium de styrace, Accipe pailulorum exacinaratum, & cribro setaceo transmissarum vnciam: glycyrrhizæ rasæ & subtilissimè pulverisatæ drachmas sex: ligni aloës, nucis moscæ, comini, cuiusque scriptulos duos, & grana quindecim: styracis calamitidis selquidrachmam; boli Armeniæ præparati drachmas duas: sacchari in aqua

betonicæ dissoluti quod satis sit ut fiat electarium in tabulis. Excipe adstringentia melle, vel sirupo myrtino, vel sirupo papaveris. Si in potu exhibere quid velis, id misce cum succo portulacæ, granatorum, vel polygoni, vel cum lacte vitulato, aut cum aqua distillata limacum. Accipe aquæ ex limacibus distillatæ libram: coletur per manicam, cum conferuæ rosacæ & consolidæ vncias tribus, & saniali citrini scriptulo: ac spicæ semiscriptulo. In initio ad grumos sanguinis solvendo sumas acetum cum aqua ita temperatum ut bibi possit, & adice coagulum ciceris mole. Corallū torreatur, & in aceto extingatur. Accipe conferuæ rosacæ antiquæ vncias duas: conferuæ radicē symphyti vnciam: pulvis diatrageanthi frigidī, & diapapaveris, singulorum scriptulum: trochiscorum de terra sigillatæ, vel de carabe, aut de spodio semiscriptulum: sacchari rosati tabulati, quantum sufficit ut fiat tabulatū. Et superbibat aquam equiseti: vel da dormituro drachmam trochiscorum de electo, validè sistit sanguinem. Succus viticæ bibitus quibusdam secretum remedium habetur. propinant diebus sex succi illius vncias quatuor; & iusculo pulli & verucis incoquant ipsam viticam. Alij præbent succum centinodiz. Pulvis mororum siccatiorum, thus cum succo millesolij. Antiquus Empiricus Marcellus coquit sanguinem bubulum vel hædinum cum aceto, vult ut per cochleare assidue gustetur, Succus cauliculorum rubi in sole ad mellaginem redactus. Aliæ radicis decoctum, inquit Oribasius, & mentastri, ilicò supprimunt sanguinem. Centauri maioris ex aqua dantur drachmæ duæ si febricitant, aliqui ex vino. Grumos abigit thymus ex aceto coctus. Decoctum radicis symphyti datur cum eiusdem radicis pulvere. Accipe myrrhæ drachmas tres: croci drachmam: opij drachmas duas: thuris drachmas duas cum dimidia: seminis hyoscyami albi drachmas duas: corticum radicis hyoscyami albi drachmas duas: Cortex tenuissimè per se cribretur, dein crocū, hyoscyami semen, myrrhæ, thus: quibus misce opium pridie aquâ macerata subinde exiguum aquæ adiciatur: fiant exigui trochisci, pondere duorum scriptulorum: dantur in noctem sexque cyathis tribus.

Marcellus

EMPI-  
RICA.Electarium  
de styrace.



Marcellus empiricus hoc laudat : Accipe acacie, hipocistidos, balustiorum, cuiusque drachmas duas : opij drachmā vnam. balustum cribratur ; cætera pridie maccrata in aqua miscentur diligenter, vt fiant trochisci ad pondus semidrachmæ : dantur ad pondus surgendo drachmæ, ex cyathis duobus aquæ. Succus ligustri propinatur per tridui. Succus vel puluis foliorum fabinæ, ex vino vetere picato, inquit Marcellus, sanat in vitæ discrimine constitutum. Succus basilici vulgaris dantur vnciæ duæ. Si calet admodum, da succum portulacæ vel plantaginis. Si sanguis fuerit coagulatus in pulmone vel ventriculo, dabis oxymelitis vnciam : cum coaguli leporis vel hœdi granis quinque : adde aquæ saccharatæ vncias duas. misce. Aqua chalybeata coquatur cum tragacantho asso & gummi Arabico. Refert doctissimus ac diligentissimus D. Io. Schenckius, hoc puluere quendam curam fuisse à Iulio Scaligero, quem descriperat ex Serapione, Accipit spodij, rosarum rubrarum, boli Armeniæ, terræ sigillatæ, haimatitidis, singulorum semunciam : coralli rubri, carabes, margaritarum non perforatarum, cuiusque drachmas duas cum semisse gummi, tragacanthi, singulorum drachmas duas : seminis papaueris, portulacæ, seminis malux, seminis rosarum rubrarū ; seminis arnoglossæ, cornu cerui combusti, amyli torrefacti, cuiusque drachmas tres : terra aurum, misceantur, fiat pulvis. Huius dosis drachmæ tres. datur cum aqua pluuiali. Bononiensis Medicus celeberrimus hoc in secretis habebat : accipiebat seminis hyoscyami albi, seminis papaueris albi cuiusque drachmas decem : terræ sigillatæ, corallorum rubrorum, singulorum drachmas quinque : sacchari rosati antiquissimi, quantum satis est vt fiat electarium. dosis huius est semidrachma manè & vespere. hinc crassior redditur sanguis. Io. Crato Medicus Cæsaris huic præsert vsus diurnum chamædryos. Accipe simi marini scriptulos duos, anisorum semidrachmam : fiat pulvis tenuis : sumat totum cum aqua plantaginis. Accipe testam oui crudi, abstrahæ internam membranam : calcina : da duas drachmas ex sirupo de totis succis ; vel ex semuncia sirupi de

portulaca aut de myrrillie. Mesue iubet vt manè sumat semen psyllij assum & conuassatum in aqua rosata, cum coriandro asso. eodem modo etiam semen portulacæ cum aqua rosarum. hæc incrassant sanguinem. Ita etiam semen terroridum papaueris concutitur cum aqua expressionis portulacæ, dum fiat mucaginosa. sic & semen hyoscyami. Bolus Armeniæ cum succo plantaginis. Decoctum cancorum & hordei cum sirupo de papauere. Aqua è floribus ligustri, vel ex foliis quercus, vel equiseti, datur ad vncias sex cum saccharo. Accipe carniū limacum cocturum in vino aultero, & in aqua plantaginis, nimirum libris duabus : conferuæ rosarum, & consolidæ maioris, cuiusque libram : fiat distillatio. accipe huius liquoris distillati libram : sacchari vncias duas : fantali flui scriptulum : trahice per manicam. Guttulæ aliquot olei sulphuris cum aqua burse pastoris vel plantaginis. Ad virum robur, accipe conferuæ cornorum, symphyti, rosarum, cuiusque vncias duas : specterū diarrhodonis abbatis, diatrageanti frigidi, trium santalorum, atomatici rosati, singulorū drachmam : cornu cerui, rosati puluerisati, cuiusque duas drachmas : trochiscorum de terra lemmia, & de spodio, & de succino, singulorum drachmam : seminis acetosæ, portulacæ, plantaginis, cuiusque sesquidrachmam : vini granatorum, sacci plantaginis, singulorum vncias quatuor : decocti duarum turturem & vnius perdicis libras quattuor : micam panis infusa vino granatorum, & cum carne vnius capri fiat distillatio : Illud ius trahice per manicam Hippocratis. Looch de portulaca cum philonio Persico. accipe theriacæ aut diacurcumæ drachmam : coaguli leporis scriptulum : cum aqua scabiosæ vel hyssopidis soluit grumos sanguinis. vel aqua nasciturij pota. Alexis laudat simum muris potum cum succo plantaginis & saccharo. Stringes, Accipe sirupi myrtillæ & papaueris, cuiusque vaciam : boli scriptulum. sumat noctu. Cinerem corticis suberis sumat ex aqua vel vino. Accipe mumiæ drachmam, fusti equiseti vnciam : aquæ equiseti sesquunciam : bibat frigidè. Hæstenus de spurto sanguinis.

Ad viros.

Serap. 1.  
traill. 35.

## CAPVT VII.

## DE PHTHISI, hoc est TABE.

Varia  
nomina  
significa-  
tio : nam  
tres tabis  
species.

**C**VM Tabes generaliter accepta, sit  
vientis corporis ex siccitate con-  
sumptio, tres eius species apud autores  
celebratæ fuere: quarum vna Atrophia di-  
citur, in qua totum corpus suo nutrimentu  
fraudatur, quamuis ab affectu tali interdū  
vel peculiaris aliqua pars gracilescat, cum  
ea sola suo fraudatur genio. Hæc nasci so-  
lebat à concepta intemperie valida, ut cum  
pulmo squalet & ardet : vel cum partis  
neruus resoluitur. Secunda eius species est,  
cum corpus prauis circumfluit succis, quos  
cum partes non in sui nutrimentum prole-  
stant, corpus arefcit. Hoc est quod dicit  
Hippocrates, qui ventres habent calidos,  
carnes habent frigidas. hoc est, quibus ca-  
choymia obstat, ut viscera, his nõ attra-  
hitur in sanguine à partibus corporis carnis:  
unde illæ frigide fiunt : nam tantum ha-  
bent partes caloris, quantum habent san-  
guinis. Tertia species Tabis est Phthisis,  
hoc est corruptio, ut interpretatur Cælius  
Aurelianus, quæ plerumque vlcus pulmo-  
nis consequitur, & per excellentiam Phthisis  
& Tabes dicitur : de qua nos hîc age-  
mus. Dicitur Aretæo *phthisis*, & *phthisis*,  
quando ab empyemate, vel illapso pure  
corroditur pulmo. Dicitur autem Phthisis  
*phthisis*, decrefcere. Athenienses pro-  
priè hoc malum *phthisis* dixere, hoc est, cor-  
ruptionem. appellatur etiam *phthisis*.  
Hippocrates recenset etiã tres species Ta-  
bis, vnam quæ fit à fluxu materie pituito-  
sæ à capite in pulmones: secundam à labo-  
re; tertiam à spinali medulla, ex qua luxu-  
riosis in primis laborant. Sed nos agamus  
de ea, quæ à pulmone exulcerato nascitur,  
cui consecraria est febris. quam ita defini-  
mus : Phthisis est totius corporis accisio,  
orta ab vlcere pulmonis. Dixi esse accisio-  
nem corporis totius: immutatur enim cor-  
pus in charactere & mole, nam affligitur  
pars princeps, cuius officio vita carere ue-  
quit. Hæc autem macilentia dum nondum  
officiat actionibus corporis, est symptoma  
in mutata qualitate. Consistit enim hoc  
qualitatis symptoma in mutata naturali

mole & charactere. Potest autem hæc ma-  
cilentia tandem in censum morborum ve-  
nire, cum ingrauescens eò peruenit, ut cor-  
poris actioni officiat. Sed dicit quis, Si  
macilentia hæc est symptoma, igitur vlcere  
remoto, cedere ea deberet, nam symptoma  
sequitur morbu vt imbra corpus. Respon-  
deo, non quoduis symptoma habet suum  
vltimu, & suam perennitatem à morbo,  
sæpe enim ab excluso morbo perseverat  
symptoma, ut euenit in ictero. Quare id  
potissimum locu habet in eo symptoma, quod  
immediatè refertur in morbum. At  
qualitas mutata non semper refertur qui-  
bus in morbum (quemadmodum tumor  
paruus) sed actio læsa semper eò refertur.  
Et hinc est quod morbus definitur per  
actionem. Ideo diximus hanc maciem non  
dependere ab vlcere pulmonis, sed inde or-  
tam. Et hoc discrimine distinguitur hæc  
phthisis ab ea tabe quæ nascitur ex senio,  
& ab intemperie frigida & sicca. Præterea  
in definitione diximus, Cum febre hectica.  
cum enim pulmo pure ac vlcere occupatus  
sit, cumque cor pulmonibus quasi inhabi-  
tet & vndique ab iis inuoluatur ac tegatur,  
fieri nequit quin plurimi vapores saniosi  
ac putridi cor seriant, ac solidas eius partes  
in squalorem ac calorem abripiant: quare  
spiritus vitales incendio confragantes, &  
corde in totum corpus emissi, id vnà in  
confusilem intemperiem abripiunt. Hinc  
nascitur funesta illa macies : cum partes  
corporis nectare ac ambrosia illa diuina,  
quam à corde temperato accipere solent,  
spoliantur. Indita partibus naturalibus vis  
tunc fatiscit: nam partes cunctæ exfluunt  
incendio, ita, vt non possit alimenta co-  
quere, sed potius euascat vi incendi in  
tenuis auras. Vltimo diximus in definitio-  
ne, Orta ab vlcere pulmonis : hoc enim  
obtinet rationem causæ consuetæ Tabis.  
huius autem causæ sunt, apertio, erosio, vel  
ruptio alicuius vasis pulmonum. Horum  
autem causæ sunt tum antecedentes, tum  
procatartice, quæ vim habent apriendi,  
rodendi, vel vlcerandi. Nascitur hæc vera  
phthisis ex vlcere pulmonum. Omne vlcus  
fit à causa mordente ac lacerante vniõnem  
partis, ac dederit quid suu illa acerrimã vi,  
ab ipsa parte, nam ita discriminetur à vul-  
nere. Hoc autem ei euenit à falsa acivæ  
materia : nam suavis piritu ac sanguis

Dulcius

Libro De  
internis  
pa/nomi-  
bus.

Definitio.  
Et eius  
applicatio.

C. A. V.

S. A. B.

. n. n.

sanguis  
abra-

abra Jere partem nequeunt, nisi pueredine  
contaminata fuerint. Putrescit autem sangui-  
nis, dum ex valis fusus, circa pulmones  
cunctatur. Nam etiam sanguis aceni-  
mus nonnunquam effunditur ex corde in  
pulmones: unde illi exeduntur, vel laxatis  
valis tibi congeitur, & in vomitum abit:  
que cum rumpitur, subito intereunt ho-  
mines. hic præcessit sanguinis expecto-  
ratio, & anima sævenda. Nulla enim pars  
corporis facilis pulmone putrescit, pro-  
pter madidam & excrementiosam mollem-  
que eius substantiam. Interdum dulcis pi-  
tura, quæ à capite illapsa fuit, ibi cun-  
ctando putrescit, vel ab angina aut pleuri-  
tude pus si thoraci innascat, post quadrage-  
simum diem pulmones abradit. Iteur ac  
hectica febris nonnunquam hoc etiam vi-  
tium protulit. Quin semen parentum ali-  
quando hanc calamitatem corpori inse-  
ruit, ut cum renellulâ carne pulmonum  
nascentur homines: & his quibus scapulæ  
alarum more prominēt, phthisis facile eue-  
nit. Vel aura venerata in cubiculis aut ex  
vestibus expirans hoc malum inest, non-  
nunquam variolæ & exanthemata intrò  
recurrentia sanguinem prauâ ac indidicibili  
qualitate contaminant, unde is inuicilis na-  
tioni redditur. Vidi ex fistula thoracis  
pulmonem summam ariditatem conera-  
xisse adeò, ut in exactum marasum exa-  
ruerit. Hoc euenit illustri virgini Franciscæ  
Egmondanæ Comiti, præcesserat sputum  
sædi peris paucum, cum ex quo sanguine,  
aut malis sputamenta appellat Aurelia-  
nus. Itaque Phthisin primigeniam effi-  
cientium causarum duo genera sunt: (omni-  
um est *phthisis variola*, & eam quæ congestaria  
est empyemati) vnum, catarrhi vis effera:  
alterum, venæ ruptio in pulmone. Has  
duas causas potissimum agnoscit Hippo-  
crates, hinc istud pronunciat septimo libro  
Aphorismorum, *ἡ ἀίματις πύματι, πύματι  
πύματι*, à sputo sanguinis, sputum puris:  
ubi Galenus author est, non omnem san-  
guinis expulsiōnem, pus edere, sed eam  
tantum quæ maligna est, qualis de pulmo-  
ne omnino est. nam dicit quinto libro  
Aphorismorum, *ἡ ἀίματις πύματι, πύματι  
πύματι*, hoc est, ad sputum puris, phthisis, &  
effluencia, nimirum alui aut capillorum.  
Propterea Hippocrates notam huius cau-  
sæ tabificæ posuit ætatem quæ definitur à

decimo octauo ad trigésimum quintum  
annum. Est enim hæc ætas potissimum  
ruptiois capax præter ætates, idque vel  
casu vel dixit. Altera causa erat, quæ ero-  
dendo facit vlcus, scilicet à feritate catarrhi  
in pulmones prolapsi. Est enim ferina dis-  
tillatio, statim malefica atque tabifica.  
Prior phthisis species est iuuenum succi  
plenotum, quibus hæmorrhagia suppri-  
mitur: altera vero hominum aliorum &  
angusti thoracis, idque semperstat austru-  
na, quam excipit aquilonaris. nam boieas  
si austrum exceperit, secundus in catar-  
rhos esse solet. Causa autem coniuncta  
Marcoris est humidi inopia: antecedentes  
sunt multæ, & æ autem ad duo capita re-  
uocantur, fluoris copiam, & distributionis  
inopiam. Qui appulsu ferini catarrhi  
phthisici euadunt, vnguibus vincinati euadunt  
& emaciantur, lam ad signa venio. Pri-  
mò frigit admodum iussus, & expecto-  
rant absque dolore sanguinea, mox fordi-  
da, deinde emaciatius corpus, & hectica fe-  
bre occupatur: tandem citius respuunt,  
sitisque crescit, ac faciem cadaueriosam in-  
duunt. Est itaque phthisis, quia pulmones  
exulcerantur. Hoc autem vlcus necessitate  
quodam secum rapit, ob vicinitatem cor-  
dis, hecticam febrem, (quamvis hectica fe-  
bris sine vlcere possit esse: at hoc non eue-  
nit sine hectica) & totius corporis maciem  
consumptione sanguinis, & infectione ta-  
bifica aëris quem spirando ducimus. Macies  
sanè magnam documentum est phthi-  
seos, quam facit à *phthisi*, per vlceris edacita-  
tem, febris corruptionem, & spirationem  
tabificam, hæc enim vberissimum corporis  
habitum extenuant. Causa autem quam-  
obrem vlcus pulmonis extremam adferat  
faciem, hæc est, quia pulmones plus san-  
guinis & succi exhauriunt, & alimenti ca-  
pescunt, quam à corde suppeditari possit.  
Scribit, vi antea dixi, Hippocrates, hæc  
potissimum euenire à decimo octauo ad  
trigésimum quintum annum. Id ita acci-  
piendum, ut plerumque ita eueniat, ob suf-  
focæ deque habitum viduus rationem: nam  
apud hos incautum & intemperatissimum vi-  
uendi genus viget. Quin plethora & effe-  
rescens sanguis circumfluit in iuuenibus  
atque violentissimæ exercitationes, unde  
duriora iuuenum vasa facile lacerantur:  
unde tandem phthisis quæ non à ferina  
nascitur

Pulmo  
facit  
putrescit.

Phthisis.

Aph. 15.

Aph. 9.

Sicula.

Aph. 9.

nascitur diffillatione. Attamen hæc ætas temeraria à crapula congerit facundam catarrhorum sobolem, unde serena diffillatio valorumque partium spirabilium excessio. Pectorum vasa non ita facile impuntur, nam mollicula illa cedunt: ac facilius abraduntur quàm in iuuenibus. Naturâ ad phthisin nuiant, quibus scapulæ in dorso alarum more prominent: nam tales sunt pectore angusto, colloque longo: nam hi obnoxii sunt cunctis diffillationibus. Cum pulmo obfusus est vlcere, excluditur sine dolore pus, quod aquæ iniectum sedit, ac quasratum facile solanur. Nam sæpe putrida pueritæ videra fallit puris imagine, hoc pus non est semper eruentum, solet anhelitus ipsi ægro, iussis adest doloris expers. Præcessit causæ quæ potere vlcus facere, ut sanguinis expectoratum. Sed hic distinctione est opus, ut notes num ille sanguis ex pulmone veniat, nam quidam illico, postquam conspiciunt sanguinem ore reddi, existimant hunc ex pulmone venire. Quia recte dicitur, expectoratur sanguis spumofus, ergo proficiscitur à pulmone: non tamen ex aduerso: ut si dicas, Non est spumofus, ergo non profuit ex pulmone, nam ex vase rupto in pulmone sanguis plurimus spumæ expers fundi potest. Spumofus vero prodit ex substantia pulmonis. Pulsus est parvus & languidus, nam cadit naturæ vis ab vlcere pulmonis. Hæcicorum pulsus adest, nisi quoddâ aliquantulû mollior sit. Adnoiauit ad huius mali diagnosis Aretæus, illi adeste assiduam febrem, quæ nunquam intermittere videtur: interdum tamen latere eam sudore ac corporis frigore, sed in noctem emicat calor: ac interdum rursus in visceribus delitescit. angor, imbecillitas, & colliquatio horum patet. Nam si per diem, inquit Aretæus, corpus febrem euaderet, cur non fieret robustius & morbi tolerantius? ut enim recessit, grauius magis intenduntur, arteriarum motiones paræ & imbecilles fiunt, vigilat, languet calor, & alia omnia patiuntur quæ febricitantes comitari solent. Profectò febris cotidiana se huic malo consociat. Vespertina adest extremorum frigiditas, & matutina caliditas, sudor vsque ad pectus caliditate inest. Hoc est quod dicit Aurelianus, vbi ait, Sequitur ægrotautes febricula latens, quæ sæpe initium

sumit declinante die, atque veniente luce leuigatur, attestante tussicula plurima initio noctis atque sine, cum spitus saniosis. Sequitur oculos exoletus aspectus, & corporis tenuitas, quæ nudatis membris proditur magis, quam ex aspectu vultus. Vox raucescit, ceruix non nihil tortuosa est & à siccitate intenta. Digni tenues, & digitorum ventres laui, nam pitæ macie rotunditatem amittunt. Hinc vngues adunci sunt, depaisto eorum sulcimine, caui oculi, ac facies cadauerosâ. *Offa tegit macies, nec iuuas crastinus.* Iam videamus quibus nam documentis varias huius mali ideas discernimus. Est in hoc morbo valida macies, ita ut nonnunquam non solum symptomata, verum etiam morbi rationem subeat. Nam vi huius mali, solidæ partes corporis totius arescunt, quarum propria humiditas semel effusa, reuocari nequit. Hæc aredo si sola fuerit, atrophia dici potest. Si verò calori coniungatur, rectorida tabes dicitur vel marasmus *παρασπυγæ* vel amburens: si verò frigori, ex morbo scenuis appellatur: non aliter enim ac senes squalēt & algeant. Variæ autem huius solitarij ac primi squaloris sunt differentie. fit enim in exhausto ex vasis sanguine plurimo, ut fit per inediaam ac per valida exercitia. secundò, vbi ros nutritius, quo rigatæ partes madent, absuntur, ut euenit per diuturnas febres. tertio, vbi ex eisdem causis adeps & caro consumitur. quarto, vbi ipsæ solidæ partes affliguntur. Tres priores hæc ideas in tabem referri nequeunt: sola tertia species triplici tabis genere affligitur, ut propius à succulenta ad solidam partem venit arescens. Sed nos agimus de ea quæ venit ex vlcere pulmonis. Hoc autem vlcus confedit in substantia pulmonis, vel in eius membranis, vel in bronchiis, hoc est in ramis asperæ arteriæ, quæ disseminatur per substantiam pulmonis. Si vlcus pulmonis confederit in eius venis vel arteriis, copiosè effundetur sanguis, non ita cum in bronchiis vel in carne pulmonis vlcus confederit. Itaque fieri poterit ut sanies in vlcere pulmonis expectoretur, sine aliquo præambulone sanguine. Quare accessit ad tabe puris, expectoratione marcescentem hominem, qui negat se sanguinem in expectorato vidisse, pronunciat pulmonis carnem vlcere occupatam esse, attamen

cuncte vlcere, tandem venæ abraduntur, & sanguinem fundunt. Discernitur autem causa efficiens hoc modo: Nascentur hoc vlceris ab acerrima materia, quæ vel ratione putredinis conceptæ in vitio est, vt cum dulcis pituita à capite in pulmones delapsa, ibi cunctando putrescit: vel si falsa pituita abradat vasa: Illa, insipida erat cum à capite in os ac pulmones laberetur: hæc, falsa & acris. Si tabes ab exedente materia primordia duxerit, plerumque cruenta præcedunt expectorata. Si verò à parentum semine illata sit mollities pulmōni, hi plerumque citra cruentam expectorata è vita migrant. Puris autem formæ infinitæ ferè sunt: est id atrum, luidum, sincerum, pallido alboque, aut albo & viridi mixtum: laurum, roium, durum, glutinosum, diffusum: odore carens, fetidum. Interdum putrida pituita mentitur pus, & aquæ immixtum calidæ, fundum petit: hic bacillo opus est, quæstia enim non dissilit, quod puri familiare. Ita si remixtum fuerit pus pituitæ, illud subsidit: hæc natat. Attamen Aretæus maximè credit aspectui, qui igne aut aqua, ait, humiditates diuidant, hi mihi agnoscere non videntur phthosin: nam visio quolibet sensu certior est. Fit frequenter antecedente sanguinis fluore: aliquando etiam ex longi temporis tussicula siue catarrho, quo thoracis intimæ partes lacerantur, & primò leuius. Est autem phthisis mixtum ac complicatum malum: adest enim vlceris & febris hæctica, partiumque consumptio. Ad mortem fatali calamitate excurret. Contagiosum fatali à nimia putredine euadit. Per essentiam hic morbus partem affligit, iam, deprehensâ naturâ huius affectus, ponamus Indicationes, quæ indicent quid hic maximè sit agendum, quò debelleiur. Duplex hic nascitur Indicatio, quarum vna sumitur ab vlcere pulmonis: alia, ab iis vitiiis quæ se consociant huic vlceri: vt est hæctica febris, & macies totius corporis. Adest hic in pulmone soluta vinitas ac parvis eius abrasio: itaque iunctione ac restau-  
ratione opus est. Verùm id fieri nequit, nisi primò vlceris fuerit mundum. Nam, auctore Galeno, in vlcere necessariò duo excrementa nascuntur, tenue, & crassum. Tenue siccandum, quod crassum detergendum: & ratione abrasæ partis, nu-

triuendum, ac lacte muliebri redintegrandum: ita diutius viuunt. Sed partì non licet itè subsidia adferre, nisi prius prouiso habita fuerit totius corporis. Primò itaque, inquit Melues, vlceris abstergetur, secundò, auertatur influxus ab vlcere. tertio, expectoretur materia, & pulmones siccentur. quarto, procuretur consolidatio. quinto, accidenus mitigentur. Hæc itaque Indicationes curatiuæ spectant ad vlceris pulmonis. Sunt et alie Indicationes curatiuæ in hoc affectu ratione consociatarum affectionum. A capite enim ferè catarrhus illabitur in pectus, vbi exulceratus est pulmo: nam is intemperie tactus tanquam cucurbitula quædam in se vndique madores prolestat. Quare illabens aliunde in pectus materia, indicat purgatione opus esse, & vt Diapermato, vbi talibus remediis sistatur infusio, vtque caput siccius euadat, minusque focundum in madores, propterea ceratam ex thapsia illi admouit Gale-nus. humor etiam diuina temperandus: plurimum enim prodest proba victus ratio. Ratione verò hæctica febris est refrigerandum & humectandus: & ratione maciei nutriendum. Hæctica si primum siccitatis ambitum non excessit, interdum curatur, attamen ni vlceris pulmonum auferatur, non poterit amoueri hæctica: quo ablato, hæctica interdum sedari poterit: quod tunc fiet, cum nondum ad summum vigorem se extulit. Quæ lenta excrementa pectore concepta sunt, educantur euentuantibus, incidentibus, & abstergentibus. sed, dicit Auicenna ex Galeno, libro De attenuante victus ratione, circa finem, Hæc non tantum incidenda sunt ac falcicienda, quæ expectoranda veniunt, sed etiam moderatè humectanda, ne siccata sputa ac lentescencia tussis excitent, vnde was rum-patur. hæc ibi Galenus. Iam videamus num ad has metas arte deuenire liceat. Adest febris hæctica ab vlcere pulmonis, quæ, nisi consocietur, vlceri curari nequit. Sed quo modo consociabitur vlceris? nam necessariò omne vlceris duplici excremento circumfluit: ac hoc à pulmōnibus viz eximitur, nisi tussiendo expectoretur: ac tussis alas pulmonum vibrat ac lacerat. Quare agrè curatur vlceris pulmonis: nam vniōne opus est. Hic verò de vera vniōne nulla spes est: etenim nec pulmonis caro

P. v.

INDICA-  
TIONES  
curatiuæ.3. Me-  
thod. 1.

Notanda.

Pregressi.

4. loc. aff.  
9. & 9.  
Meth. 2.

erato ciúsve venæ & arteriæ reponi possunt, Quare doctissimus Medicus I. Montanus dice solet, Vbi vnum curavi, centum serè mortui. & Q. Horatianus ait, Hos plena fûg desperatione non vt medelis, sed magis folatio vifitamus. In sicca tamen corporis constitutione admittit calum, (nam siccat vlcus, & quasi callo obdurat) modò exiguum fuerit vlcus: idqûe solum in principio. Attamen etiã vlcus maximum fuerit, cum puris vberissimo prouentu, non deferemus miserum ægrum: sed vt purum vlcus seruetur operam dabimus: ita enim diutius viuet homo. Ad alio vlcere coeuenti nequit (id putida spûta significant,) hæcque causa est febris hecicæ in hoc malo. Notatum fuit phthisicos restaurante victus ratione interdum ad vicissimũ annum perseuerasse: nam non æquè prava est omnis purulenta: his nec alius nec capilli fluunt. Sæpe falsa phthisis species, pro vera se nobis offert: qua depulsa, de per alia triubus celebratur. Quidam enim ex vlcere thoracis in phthisim abeunt, & pectus facillè fert hæc vlcera, non eius substantia non æquè mollicula sit vt pulmò, nec ita prona in putrilagine: nec anfractibus spongiosis bibit pus quò ægrè id excutiat: nec ita fluxionibus pectus expositum est, & non ita æstusio à sanguine nutrit, nec amplius venis rigatur. Quæ verò vlcera profunda pulmones inuadunt, ægrè curantur. Morrem in limine esse hæc tria denonant, si conuerrent, expectoratum foetidum, diarrhœa, capillorum defluuiũ. Si hæreditarium ac à semine parentũ immoissum sit malum, sanationis erit expers. Si alius iam emaciatius perturbetur, æstus. Anginæ succedanea, est calamitosa. Cùm tabidi à pure tandem sanguinem expectorant, ad vltima ventum est. Senes in hoc malum non incident facillè: sed minime, cùm eo derenti sunt, eaduent: (quòd etiã asserit Aretæus:) quamvis diu in tabe viuant, inquit Mesue. Et iuuenes à sanguinis spûto hoc dilapsi non facillè sanescunt, at pueri assidua tussi vsque ad phthisim diuerxati, facillè redeunt. Quæ à retentis mennis huius vlcere vlcere, ægrè redeunt. Quibus ab alui solutione prurit corpus, non bonũ est. Graciles & delicati in hoc vitium propi sunt, quibus scapulæ alarum more pro-

minent, oblongo præditi collo, albidî. Re-  
 giones frigidæ atque humidæ, huicmodi  
 affectiones pariunt. Phthisici, inquit Hip-  
 pocrates, quibus ad ignem spiritum olei  
 grauitur, & si vni capilli fluunt è capite,  
 moriuntur. Vtigitur odoris spiriti pericu-  
 lum fiat, igni supersufum, vel in vitro vel  
 pelui admotum, siue spiritum sit pus, siue  
 pituita falsa & puris. Cur exploradî odor-  
 is causa vult expectoratum in ignem im-  
 poni? Quia cum odor sit corporum mixto-  
 rum & madidorum, non autem ἀνιστηται ὁ  
 ἀρχὸς, quæ nullam edunt anathymiasin  
 per quam fit odor; inde adde accidit cor-  
 pora mixta & fœcida, ram δὲ δὴν quodam  
 κρυψάδα, si fortè nimis coacta fuerint, vel  
 alieno humore perfusa, πρὸς δὲ τὸν πυρὸς  
 αἶθερ μολυπτοί, ὃ δὲ κρυψὸν ἀνιστημένον  
 πρὸς αἶθερ ἀναθυμιάσειν, δὲ ἢ γίνεται ὁ ὀσμὴ.  
 hoc est, molli flammâ indignant, quæ cal-  
 ficientis sensim, vaporè excitabit, per quem  
 fit odor. Sed cam anathymiasin odorifera-  
 rum, eorum corporum succidorum quæ  
 intra se abdium habent odorem, non so-  
 lum igne blando & lento, sed etiam sereno  
 excitari docuit Hippocrates; vt in radici-  
 bus: sic in spuro gradinofo τὸ φέρον: quod  
 scribit antrum digitis, expiratæ vius fœdi  
 odoris. Ergo spiritus humorem perfusum  
 dissipando, & diducendo meatus subsieci  
 corporis, anathymiasin excitat odoriferâ.  
 Pro desperatis itaque habendi sunt, quo-  
 rum exulceratio posita est in vitio inemen-  
 dabilissimæ partis, cuius vitale offi-  
 cium est atque viuificum: ipsa vult corru-  
 pta, putri halitu vitalè excedit calorem sus-  
 focat, tum vlcis edacitate extinguit, cum  
 spiratione ipsa tabifica. Aquæ marinæ im-  
 missum pus si fidat, mortale: est enim à τῇ  
 πρὸς τὸν πνεύμονος. nam est fœtidum, amur-  
 colum, cœnosum, & tale pus cunctando  
 & incalescendo fit durum & graue. tale  
 pus ad citam mortem fatale est, pericunte  
 vitali pulmonis officio: tunc enim cumu-  
 latè colligitur, nec facilem habet exitum,  
 & pestifera aura cordis calorem disperdit.  
 Dein ab oppressione puris in thoiacæ fit  
 asthma, & in gutture orthopnoea: atque  
 ira phthisici vitam finiunt suffocati. Qua-  
 re si iam expectoratum non procedit, ac  
 mens errare inceperit, serè quadriduo huic  
 mors veniet. peritque æger à cœnciaria al-  
 uo, ipso loquent: quare anceps hic mor-

ius tempus est. Hæreditariâ à phthisi in-  
græ familiæ interdum occupantur, idque  
variâ idæ: nam quidam pus expuunt post  
sanguinis exclusionem: quidam humo-  
rem diu aquosum ac sublauescentem, tan-  
demq. pus cruentum edunt: alij sine expe-  
ctatio contabescunt prauo, ob tenellulos  
pulmones. Pus si eliditur, nec tamen he-  
thica adhuc adfuit febris extenuatioque quæ  
oculis cōspiciua sit, curari poterit: nam sic-  
care tunc incipit, ac putredinem coëtere  
ira, vt callus inducatur. Quare hic sac lo-  
cum non habebit: nam nulla hic indicatio  
renutriendi & humectandi, sed potius Ta-  
bias mutendi, hoc est siccandi. Phthisis  
empyricorum nō sanatur: nec hic vanâ spe  
lactandus æger, ne subeat suspicionem oc-  
cisi quem fors ipsius peremit. En plerum-  
que calamitosa rabes cum à ruptione ve-  
næ arteriosæ, tum à catarrho serino è ca-  
pite, sed periculosissimè ab empyemate.  
nam anastomosis rarò adducit exulcera-  
tionem: sed catarrhus *phlegmonis* author  
est. Si itaque aliqua spes curationis fuerit,  
succurratur. Galenus optimè prosequitur  
curationem quatenus phthisis adhuc sanabi-  
lis est: hoc est, dum adhuc cruentum vlcus  
nullam phlegmonem sentit: tūc enim  
id reuulsionibus & adstringentibus curat.  
Nam, ni fallor, tūc nondum aliam faciem  
sumsit, quàm ruptis vasculis pulmonis: Dicit  
enim hoc sanabile esse, si primo, secundo,  
tertiòve die adhibita medela fuerit. Sin ad  
phlegmonem & pus venerit, non omnino  
esse sanabile, sed callo obduci posse, quò  
longior cueniat vita. Sed nulla sperabilis  
curatio: nā die iugum atteritur illa cicatrix.  
Hoc autem sit siccantibus, vt theriacâ, sul-  
phure, vitrioli vel sulphuris oleo, & tali-  
bus: & his quæ arceant phlegmonem, vt dia-  
spermate, quod etiâ aciem obtundit mate-  
riam. Quare profectò non video ego quid  
possit illa remediòrum farrago, siruporum,  
conseruariū, eclegmatum, opiatarū, potio-  
num. Hæc enim emolliunt pulmones, &  
esseram vim vlcis promouent. quia po-  
tius omnia sanare siccandū. Propterea, post  
prouisionem habitam totius corporis, illicò  
danda erit theriaca recens: quò cohibeatur  
in pulmones influxio, vt quæ phlegmones  
dolor ac attractio cedat. Dein præbe the-  
riacam cum floribus sulphuris, & decoctū  
guaiacū cum auricula muris, farza, saxifras,

radicibus Chinæ & caryophyllatæ, ab hu-  
meantibus abstine. Hæc ita fiant, dum  
nondum febris à destituta ea vigente, con-  
clamatum erit, auctore Galeno. Nam tūc  
corpus erit madefaciendū, vnde altius ser-  
pet phthoe & in therioma abibit. Hoc est  
quod clamant Celsus & Paulus, Illicò cu-  
teatur. Sed ne prædictū ordinem violemus,  
breuiter de remedijs dicamus quæ totū re-  
spiciunt. Nullus est phlebotomizans locus vbi  
adest hectica febris & macies. nec hic san-  
guinis copia adest: quæ etiam si adesset,  
vena tamen pertundi non deberet. Vbi ve-  
rò Galenus videtur phlebotomiam propo-  
nere, rectè eius sententiâ accipi debet. Non  
enim ibi agit de vlcere, sed de violata vni-  
one pulmonis & eius vasorum, quin ibi ad-  
monet illicò succurrendū esse summo au-  
xilio, antequam sese consociari phlegmo-  
ne vlceri: nam vniōis solutio coniuncta  
inflammationi, non sanabile malum est.  
Gloriatur Galenus se plerofque curasse: sed  
hi non erant phthisici, sed eò propende-  
bant, erat violata vniō & fractio venarum.

Tabidi longa die emaciati quandoque  
pleurítico dolore fatigantur à flatibus, qui  
pulmones eorum lateri agglutinatior à  
membrana cohsis intertexi diuellunt. reme-  
dio his est socus ex decocto anethi, melilo-  
ti, chamæmeli, cumini. vel hæc sacculo ex-  
cepta ac vino madente imponuntur. hic  
phlebotomia est calamitosa: nam à lenta  
piuita inuiscati pulmones cohsis hærent.  
Cucurbitæ supra & infra scapulas admo-  
ueri poterunt. Cum à cerebro præcipitatur  
materia ad pulmones quæ ad vlcis incre-  
mentum facit, quid tunc agendum? Dici-  
mus, si tale vlcus foret in quo spes esset vt  
callus induci possit, præclarè ad salutem  
faceret cauterium futuræ coronali impressum.  
Id enim ibi nullum dolorem concita-  
ret, nihil quæ periculi adfert. quare rei illa  
extra trepidationem sit. Propterea itaque  
hoc cauteriū inferimus, quò callus gigna-  
tur firmior, qui alioqui per distillationes  
minimè solidus foret, ac facillè incurfu ca-  
tarthi abraderetur, vnde maius etiam vl-  
cus euaderet. Cum autem nulla calli ef-  
ficiendi spes affulget, non sine prædictione  
cauterium inuri debet. Dicemus enim  
hominem sanari non posse, sed à cauterio  
S. Dei beneficio vitâ protrahi posse, eam-  
que iucundiorē futuram, nam vlcus  
mundius

CVRA.  
TIO.  
1. Af-  
thodis 8.  
11. 12.  
14.

Cels. 9.  
lib. 20.  
Paul. 10.  
lib. 12.

Chur-  
gica re-  
media.  
S. Met. 8.

Obserua-  
tio.

Cauter-  
ia.  
CAVTE-  
RIA.

*Causa.* mundius euadet. Cautere tamen ne cauteria inuratis cum non longè abest mors. Si sub summa desperatione, inquit Q. Horatianus, iam eos obfederit naturæ fragilitas, cauteria paribus thoracis infigo: si foris patefactis vulneris meatibus, eorum digestionibus releuatur. Sed hoc agendum succulento adhuc corpore, alioqui gangrænam inferes à cauterio. Vesicatorius viumur in metacarpo & malleolis, sub poplite, scapulis & mento. Accipe cantharidum sine capibus & pedibus drachmam: vnam caricam, & fermenti parum, cum aceto scilicet fiat pasta: manè, amotis capillis admove coramali: dimittatur per horas octo ubi vesicam dedit, acu foretur: vnge butyro, & rege folio brallæ super cineres calefacto. Iam dicamus aliquid de pharmacia. Hoc in morbo potius lenientibus remediis utendum, quàm valide soluentibus: clysmi maximè probantur, quia turò illorum inuitur vsus. Quidam existimauerunt clystere corpus nutiri posse. non puto. nam si id ita esset, non opus esset vt cibi ad nutriticatum in ventriculo mingarentur, vt asseruit Galenus. & extrema venarum cum desinant in cutem, corpus totò si vino immergeretur, eo nutiri possit: quod falsum est. Quin asseruit Galenus intestina non esse dicata concoctioni, vt nec venas sanguificationi. Emollitur aluus mannâ, cassiâ, sirupo ac melle rosato solutiuo, melle mercurialato. Accipe passularum vncias tres: iuiubarum vncias duas: medullæ seminis carthami semunciam: coque in iussulo pulli, adde mannæ vnam vnciam. Ineunte morbo, dum vires vigent, Accipe thabarbari, & rhaponitici, cuiusque drachmam: (sit hæc summa dosi) cassiæ drachmas sex: fiant boli: vel infunde illa sero lactis, & expressioni adde mannæ vel extractæ cassiæ vnciam. His vtendum maximè si catarrhus mollescit sit (nam ratione causæ interdum conuenit purgatio, non ratione rabis), tunc etiam tales pilulæ viles erunt, Accipe aloës rosatæ drachmas tres: rhabarbari, agarici, cuiusque drachmam: seminis carthami scriptulos duos: myrrhæ scriptulum: zinziberis & cinnamomi, singulorum grana octo: beniooini, semiscriptulum. Fiat pilulæ: cum melle rosato fiat massa mollis: ex huius drachma formetur septem vel octo pilulæ, quas sumat

in diluculo. Si vlceri pulmonis iungatur capitis repletio, ac inde distillatio, veniemus ad vsum carthami & agarici: absterge ammoniâ, colocyinthidis, & turbitis. Si vero à catarrhis periculù futuræ phthisis imminet, præparanda erit materia ad exclusionem, studendumque vt lenta, viscida ac crassa materia incidatur, attenuetur, & abstergeatur. Quare emollit prius aluo cassiâ, per biduum sumar mellis rosati & oxy-melitis, cuiusque vnciam: mox purga pilulis coctis, vel diacatharam. Sin tenuior ac acrior fuerit materia, quæ à capite precipitatur, vel quæ toto à corpore in pectus influit, hoc ea modo paretur. Accipe radicem siccatam ireos drachmas sex: ficuum pinguium sex: passularum corinthiacarum vncias duas: iuiubarum, sebens cuiusque octo: florum violarum pugillos duos: glycyrrhizæ rasæ semunciam: seminis melonum drachmas sex: seminis althææ & vnicæ, singulorum drachmam: fiat decoctio ex aqua hordei, ad librâ: colaturæ adde sirupi violati & capillorum veneris cuiusque vncias duas: fiat apozema. bibat bis die cyathum magnum. Deinde purgetur rhubarbaro, agarico, carthamo, & pilulis aureis. Initio absterge vlcus lacte asinino vel caprillo, cū modico melle crudo. Lac bubulū est crassum, muliebres est mediocre, camelinum gausum est tenuissimum, ouillum est medium, caprillum tenue, equinum & asininum mediocre. Scribit ita Rases, In colliuatione à tussi quæ à diuturno morbo aut post crebra cruenta spura, aut multas puris reiectiones patitur, porriges lac asinum potandum vtiliter, hinc caprinum cū pauco saccharo paucoque pane. Est enim lac vtile vlceri pulmonis, maciei, & heclicæ febris. Quare in hæc verba tandem erumpit Razes, quin si huiusmodi lactis genere capiat, etiam id aque loco, quoties sitit propinabis. Sed non viatur lacte ubi borborygmi ventris adsunt ac pendula hypochondria: nec sitibudis præbeat, aut cui caput dolet, cuique ructus prauis adsunt: nec vnquā impuro ventriculo exhibetur. Quare antea porgetur aluina regio quàm ad vsum lactis veniat: id fiat decoctio galli veteris cum manna. Sed si accesserit putrida febris, abstineat à lacte, eiusque loco pisanum viatur: eaque febre deuictâ, ad vsum lactis redeat. Lacti non superdormiat, nec id aliis

*Fraperâ.  
sic quan-  
da hoc lo-  
cum ha-  
beant.*

*Vlcus ab-  
stergetur  
& pur-  
sum*

*Lacti na-  
tura.*

*Abster-  
get &  
sintendi.*

*Cautio in  
vfu lactis.*



id aliis cibis misceat. Si ad sit viscerum obstructio, auctor est Mesue ut tunc lacti incoquatur polyposidum: si venter fluir, inilice fumachium vel balaustia, vel hypocistidem. quodvis stomachi molesta sit, adice tragacanthum. si stomachus imbellis est, adde diarrhodon. Mesue ita vult lac coqui, ut adiciatur quinta pars aquæ, & lapilli fluuiales igniti in eo extinguantur sine fumo, dum aquosa pars fuerit consumpta. Febricitantibus, nam est Mesue, præbeatur lac acetosum; inquit Mesue, expers. Vel sumat aquam coctam cum cancris fluuialibus, misce sirupum myrtilinum vel papaueris. In usu lactis, primo die sumat vncias tres, postredie adice vnciam, dum sensum ad libram vel sesquilibram veniatur. Lac etiam coquitur cum saccharo rosato. Absterget etiam vlcus hydromel; accipe aquæ libram, mellis sciscunciam: radices sicce ieros drachmam, glycyrrhizæ drachmas duas: coque. Vel vitem secundo decocto scenugræci, cum octava parte sacchari: vel si hyems, cum paucis melle. Accipe mellis libram vnam: succi caulium semilibram: coque in formam eclegmatis: da semunciam ex mulsis in qua nux resinosa pini coxit, cum passio, & glycyrrhiza. Vel ex buyro, melle, & terebinthina fiat eclegma. Accipe looch de farsara drachmas tres, de pulmone vulpis, & de pino, cuiusque drachmam, conferva buyros semunciam: misce cum sirupo capillorum veneris, ut fiat eclegma. Aliud, accipe pulueris pulmonis vulpis, succi glycyrrhizæ cuiusque drachmas duas: sirupi capillorum veneris, & de farsara, sirupi sacchari candidi, cuiusque semunciam: olei fœniculi grana quinque: fiat lindus. Præparatur pulmo scissus in partes, & lotus vino albo, dein bulliat in aqua rosata cum paucis bacca myrti crasse contusis: semel ebulliat, & abstergeatur aqua rosata & vino: dein siccetur & ventur in puluerem. Philoniũ Persicum, est vltimum, nam mundificat & siccatur putrida, consolidatque vlcera, sistit catarrhũ & rursus sedat: datur eius drachma cum aqua rosata & vino puro. sed non recensetur: nam fermentari debet antequam vsum eius in eas, per menses tres. Potiones sunt ex capillo veneris, marrubio, hyssopo, iride, botryde, glycyrrhiza, passulis. Hoc mihi sæpe in via scilicet

fuit. Accipe brassicam rubram conssissam: inde poculo, & diu in balneo coque: manẽ eo liquore viatur. sed hic succus alternis diebus recentari debet, nam facillimẽ putrescit. Si materia sit admodum viscida, valida quædam exigua copiã remiscibimus minoribus, ut drachmam vnam looch de scilla, vel diaphulphuris, aut diaireos, cum vncia sirupi de farsara vel capillorum veneris, vel liquiritiæ, aut violarum. Commendatur admodum puluis Haly ad tabem, teneat pilulas bechicas ore. hic vitemur hordeato cum melle. Absterfum vlcus siccandum est, & callus ei impoendus. Lac absterget & glutinat. accipe lactis libram vnam: aquæ rosatæ vncias tres: bulliant simul cum rosis siccis, & chalybe candente ab igne tingatur. Fiat conferva ex foliis pilosellæ vel ex auricula muris: hanc edas manẽ, resperi, & post cibum. eo modo etiam viatur conferva rosarum, cui interdum additur aliquod boli, vel sanguinis draconis. Magno successũ quidam vtebatur in potu & omni cibo cõserua rosarum rubrarum: solaque ea visitabat nonnunquam, adeo ut Venetorum pharmacothecas omnes eã inanierit. Accipe myrrhæ vel galbani, styracis calamitæ, cuiusque drachmas: dissolue in sirupo myrtilino, & exhibeatur. accipe sulphuris semidrachmam; sorbeatur ex ovo. Accipe myrrhæ drachmam: mellis semunciam: sumat alternis diebus lambendo. ita etiam galbanum: id purgat pulmones. Siccat & confortat pulmones, auctore Mesue, sirupus vel rob myrti cum puluere de pulmone vulpis, addo parum olei fœniculi. Vltima verò ad siccandum, inquit Mesue, sunt sulphur & arsenicum, ut diximus vbi De empyemate. Vrantur cochleis, cancris, testudinibus. Accipe sanguinem suillum, cochleas purgatas, ranas, cum germi nibus rubi, fiat distillatio in balneo: potent hanc aquam donec iterum eualescant. Fit etiam distillatio ex foliis aristolochiæ, consolidæ, lichenis, rubi, rosæ, bolo. Sumat etiam omni manẽ decoctum chelarum & caudamarum cancorum ex aqua hordei, cum saccharo. trochiscide caphura etiam laudantur. Testat cancorũ in fictili vase cremaræ miscantur cum looch de papauere & sirupo capillorum vel botryos, cum aliquot guttis olei sulphuris. Mesue commendat con-

*Succentia vnam, æ glutinam- tiæ & calium induc- tia.*

*Quod- dam de scribis Mesue, in suis capi- tu De Phleg.*

*Præpa- ratio pul- monis vulpis.*

Hysteria.

feruam rosarum recentem non vnus anni, nam magis absterget quàm vetus: in omni cibo, inquit, ea vitatur, purgato tamen antea vlcere, alioqui laederet: dici nequit quot ex ea cōualuerint, auctore Mesue. Quot, inquit Mesues, eam do ex lacte calido non febricitanti: febricitanti verò, ex aqua hordei in qua cancri fluuiales coxere. quodsi inde stringi videatur pectus, dabis hyslopi sirupum. Quædam, inquit Areulanus, comedit quadringentas libras sacchari rosati, & curata fuit. Accipe marubij vel scabiosæ, vel hyslopi aut botryos, coque ad dimidias in sex libris aquæ: adde libram vnâ mellis: coque ad consistentiâ mellis, adde puluerem pulmonis vulpis: terget & siccet. Looch de pulmone vulpis cum aliquo guttis olei sulphuris. Accipe radicum consolide vnciam: succi plantaginis cōdensati semunciam: pulmonis vulpis drachmam: sacchari rosati antiqui vncias duas: cum sirupo capillorum veneris fiat lambiturum. Hoc assiduò hæreat in ore, nam valide purgat citam sordes. Accipe ferulæ semilibrâ, huic infunde rosas, ac dio per noctem expone, mox cola, ac adijce sacchari rosati semunciam: boli drachmam: adde mel vel sirupum rosatum aut myrtinum. vel cancri potcrunt primum ferro incoqui. quin ex aqua hordei hæc propinari poterunt. Sumat manè guttas sex acidissimi liquoris sulphuris ex cereuisia. Potet ex hoc decocto, accipe radicū Chinæ vncias tres: aquæ libras sex: coque ad dimidias: potet manè cyathum magnum, & iterū à meridie hora quarta: & in prandio duos inde hauriat scyphos: nam quæ sudores & vrinas mouent, profunt pectori: nā materia ex venis in pectus venit. Et manè sumat ouum cum puluere Haly. Accipe sirupi violati: olei sulphuris guttas decem: sumat cum decocto auriculæ muris: est hoc excellens remedium. Manè sumat ex cochleari mellis horū aliquid: balastiorū in puluerem redactorum vel hypocistidos, aut terræ lemniz, pulmonis vulpis, carabæ, cancerorum vstorum, seminis portulacæ, coralli, tragacanthi, succi rescicati scæniculi, trochilorum Andronij, adde guttulam olei sulphuris. In istis rebus Occani hie paræ admodum cochleæ inueniuntur, Rondeletius eas turbinas tuberosos vocat, nos appellamus *klein kinkhoornkens*, has

calcinabis & miscebis cum melle vel cum sirupo de faisata, admittit illico vssim prauam, quam vocamus de *kinkhoorn*. Solatio sunt etiam mithridatium, theriaca, ambrosia, aphanasia. Tandem pectus vis roboretur: accipe diatrageanthi frigidi recenter parati drachmas tres: speciei diarcos simplicis sesquidrachmam: aromati ci rosati, diamargariti frigidi, cuiusq. scriptulos duos: boli armeni præparati drachmam: pinearum mundatarum, amygdalorum dulcium excoctatorum, singulas semuncias: seminum melonum recentium excoctatorum: seminis papaueris albi, cuiusque drachmam: sacchari rosati tabulati, sacchari crystallini, singulorum semunciam: sacchari penidiati vnciam: musci boni grana octo: pulueriscentur omnia puluerisanda vt decet, & cum infusione gummi fiat massa: teneat partem ore. Aliud: Accipe diatrageanthi frigidi, diapenidij sine aromatis, cuiusque drachmas tres: pulueris pulmonis vulpis sesquidrachmam: succi liquiritiæ & capillorum veneris, singulorum scriptulos duos: pulueriscentur polucrisanda, & cum sirupo myrtino fiat electuarium: de quo sæpe sumat. Aliud, accipe pinearum mundatarum vnciam: infunde aquæ calidæ, deinde excentur pannolino: amygdalorum dulcium semunciam: seminum quatuor frigidorum maiorum mundatarum, cuiusque drachmā: specierum diatrageanthi frigidi sesquidrachmam: diarcos simplicis scriptulos quatuor: pistachiorum vnciam: sirupi capillorū veneris quod satis sit vt fiat looch. Curatio breuiter ita institui interdum poterit: Potus loco vti poterit hoc decocto: accipe hordei mundati pugillum: glycyrrhizæ recentis semunciam: daſtylos quinque: sacchari vncias tres: aquæ libras septem: coque ad hordei crepaturam vsque: deinde iniice pauca frusta cinnamomi: quò tenue quoddam aroma inde proleſcet potio. Lac muliebri sumat manè hora sexta vel septima: tepide immalgatur vasculo natanti in tepida aqua. nec postea dormiar, nec etiam valide se exerceat. Interdum loco lactis sumat vitellū recentis oui sorbilem, cui admisce scriptulum florum sulphuris & sacchari crystallini: nonnō quā hisa fundat tria vel quatuor cochlica

Curatio  
tandem.Curatio  
an anac  
phalagis.Lib 2.  
De testicu  
culis.

ria aquæ roris solis, aut decoctum adiciat  
cancrorum cum vino bastardico. aliquan-  
do victur ex ovo pulvere Haly. Ex floribus  
sulphuris cum pulvere Haly inscripto ad-  
uersus tabem, fiant trochisci cum sirupo de  
sarfara: lectum ingressurus accipiat vnum,  
ac ore teneat. Accipe carnum testudinum  
nemoralium libras duas: adde consolidæ  
radices confusas, & iria santalæ: distilletur  
cum aqua scabiosæ. Quidam viebatur pro  
cibo solâ piscinâ veterum, & bibeat aquâ  
saccharatam, & manè sumebat decoctum  
chelarum ac caudarum cancrorû ex aqua  
hordei, cum drachmis duabus sacchari. hac  
arte euasit. Coque pugillum hordei mon-  
dati ex aqua, ad horas duodecim: misce ei  
simplex saccharum rosarum: vtatur eo in  
ultima parie cænz. interdum adicé con-  
fusa amygdala vel pineos nucleos aut pi-  
stachia. Os irrigetur sæpè sirupo nicotia-  
næ, cuiusvis sulphuris flos vel puluis Haly  
contra tabem, vel pulvis pulmonis vulpis.  
Decoctum cassias cum pilulis, dactylis,  
& conferuâ violarum, ac capillorum vene-  
ris. Teneant pilulas bechicas in ore. Acci-  
petheriæ drachmam vnam: confusæ  
rosarum drachmas duas: sumat semel sep-  
timo diè manè. Commendantur etiam pi-  
lulæ de styrace. Si verò macilennia hec-  
tica à curatione perseuerat, hoc modo ei suc-  
curratur. Accipe lactis recentis quartarios  
duos: distilla inde libras tres, (origano id  
fieri rhodostigmatis) & absterge, subinde  
sublato operculo, pinguedinem: dulcor ad-  
datur ex saccharo perlatro. Huic aquæ al-  
giosæ iam affunde quassata duo albumi-  
na ouorum recentium, ac misce transfu-  
sione frequenti. Singulis huius aquæ libris  
adicé margaritarum solutarum semiscer-  
ptulum. & accuratè misce. vtatur hac po-  
tione frigida cum valde sitit: & in prandio  
& in cæna si adlubescit. Accipe aquæ pim-  
pinellæ, aquæ roris solis, cuiusque vncias  
quatuor: aquæ ex floribus rosamarinis vn-  
ciâ: liquoris tartari rectificati vncias duas:  
margaritarum solutarum vnciam: sirupi  
violarum, sirupi fragorû, singulorum vn-  
cias duas: sirupi papaueris rubri vnciam:  
misce. Sumat manè ieiuno stomacho, & à  
prædio hora quarta vncias quatuor. & ho-  
ram abstineat à cibo & potu. Accipe da-  
ctylorû quibus cortex & membrana in-  
terior abluenda sit: vuarum passiarum ab-

ductis acinis, singulorum vncias duas: dia-  
coroniti, confusæ rosarum damascena-  
rum & rubrarum, violarum, & veronica-  
tilis rubræ, cuiusque vncias: radicum sa-  
tyrionum conditarû, vncias duas: radicem  
eryngij conditarum vnciam vnam: in mar-  
more contunde in massam: sumat semun-  
ciâ cum somno se dabis. Aliud, Accipe la-  
ctis caprini quartarios duos: cinnamomi  
contuli, dactylorum dempsis calculis, cui-  
usque vncias quatuor: agrimoniz mani-  
pulum: fiat distillatio: sumat manè & ves-  
peri cum saccharo. Aliud, accipe capum  
succiplenum ritè paratum: hordei munda-  
ti, passularum Corinthiacarum, singulo-  
rum manipulum, ventri ignescantur: af-  
funde vini Gallici rubri quartarios duos:  
adicé parum cinnamomi: bulliant dum  
exossetur: dein in mortario capus teratur:  
postea per saccum Hippocraticum coletur:  
sumat tepidû manè, meridie, vesperi, cum  
tritum ouorum recentium vitellis. Aliud,  
accipe seui carnis bubulæ, ouillæ, vitulinæ,  
cuiusque libram: dactylorum semilibram:  
passularum Corinthiacarum vncias quat-  
tuor: vini palli, quodiam Bastard vocant,  
quartarios duos: misce, & lento igne di-  
stilla. In tabe foris etiam quædam admo-  
uentur. Nonus, antiquis medicus, pectus  
inungit buryto, oleo laurino, & terebin-  
thinâ, vel oleo rutaceo: tandem mnafero  
emplastro vtatur. Accipe vnguenti resum-  
ptiui recentis vncias duas: vnguenti de al-  
thæa vnciam vnam: olei amygdalini dul-  
cis, violacei, lilini, cuiusque sescunciam: iros  
Florentiæ exactè puluerisatæ drachmas  
duas: styracis calam. drachmâ: croci grana  
quinque: mosci grana sex: cum medico  
cerâ fiat vnguentum: vnge eo pectus ma-  
nè & vesperi. Accipe sacculû ex milli octo  
partibus, & salis torrefacti vna parte: in bis  
vel ter calidè capiti manè applicetur. Iam  
de victus ratione aliquid adferamus. Aëtis  
maximè ratio habenda: hic enim perpetuò  
pulmones ferit. vbi pus expectoratur, cor-  
pore non extenuato, sit siccissimus aër: at-  
tamen non frigidus. à nebulis & pluuiis  
caueat, viuet paludes & flumina. Si ferant  
vires, præstare ei in mari viuere, nam  
inde siccanitur vlcera, dicit Aretæus. Mar-  
cellus empiricus laudat vt cômorentur vbi  
pus conficitur: ibique cochlearum et rne  
cum vino excocta assiduè resci. Cibi modò  
abster-

Macilen-  
nia ele-  
gans re-  
medum.

Foris.

Videtur  
III.

abstergeant, modò agglutinent. Istitio, dum mundandum, vicinior prorsus, & iure ciceri. postea, quo glutinis, da fercula ex oriza & alica: hæc coquantur cum pedibus viulinis, vel cum radicibus consolidæ. In hoc morbo facultas nutritæ admodum profertur; quare ea erigatur, quod optimè fieri ab usu lactis. Hoc enim assumptum suave est, poru facillimum, nutritu solidum, & quicquid escæ a puerina familiarius est; colore delectabile, guttur læuigat, facilem spiritum reddit expectorando, aluum mollem facit, vlcibus blandum subsidium & quolibet alio benignius. Si quis multum lactis potest, inquit Aretæus, nullo alio eget alimento; nam nationes lacte vescientes frumentum non edunt. Propterea Rases ita scripsit, Lactis si delectatur æger, illud loco aquæ, quoties sitit, propinabis. Sed si à lactis potui in febrem æger rapiatur, prorsus loco lactis veniat: vel potest paruam ceruissiam cum sirupo de myrtis vel de granatis. Sed febre quiescente, ad lac redeundum. Si autem denud lac fatigabit, eius usus fugiendus: sed ea molestia iterum propulsa, lactis usus repetitur. Hæc quadam vicissitudine fiant, dum necessitas viget. In lactis usu abist capitis dolor, nec iam amplius effundat se humor in pectus, nec lac facile in putredinem abripitur in ventriculo: nam his nocet lac. Initio solum vncias tres capiat, cum paucis melle rosato, quinque horas ante cibum id bibat. Indies accessio huic molli fiat, dum ex eo ventriculum affligi ea quasi pondere premi testetur æger, vel dum acidus edat ructus. Hoc auxilio ritatur quadraginta diebus: interimque remediis abstergentibus & siccantibus indulgeat. Sin per hæc præsidia etiam contabescat æger, scito nullam amplius sperabilem esse salutem. Sed interim in usu lactis summo studio cauendum ne alius lubrica fluat: nam plus colliquefcit à partibus solidis, quam possit ab ingestis refarciri. Non sint etiam hi qui lactis usum inuent, tumentibus hypochondriis ab obstructione præditi, nec siuculosi: nec etiam tunc haimorrhoidibus tententur. Potest ex vasculo factæ ex bolo, & potui immittat solia myrti, vel radices consolidæ maioris, aut cornicem medium caraxini, aut radicem caryophyllatæ. Carnes vitulinæ ratione maciei commendantur: nam celeriter nu-

trunt, nec mole opprimunt ventriculum, quia celeriter excernuntur. Razes laudat etiam auium & hædorum carnes, eas, sate pulmo. Fiat maza panis ex pineis cum palfulis. Hoc ego vici in valida macie, Accipio caponem hunc purgatam, vt decet, iubeo scindi in tenues laminas, ossa etiam fracta adici, dein eodem modo duas libras carnis musculosæ ac succulentæ ex vertice, addi curo: vino albo vel vici iubeo, ac vt ollâ vel poculo oblongo excipiant, nullumque liquorem affundant, ac vt coquant horis viginti quatuor. Dein puro panno exprimant. Quantum ad aluum atineret, diligenter præcauere debet æger ne illa fluat torbentur. & inquit Razes, si fuerit soluta, hoc puluere stringatur: accipe gummi Arabici, spodi, boli, seminis myrti, omnium æquales partes, & redigantur in puluerem: accipiat vno die diachmas tres, cum sirupo albi papaueris & myrti succo cocto. Hic iussim vno stringi. Cura graues ab animo absint, nam, vt accini Pectoris arbitet,

*Sed vultui labes tacitis concepta medullis.*

*Intra membra furens, curis laurantiis*  
*errat.*

Si, inquit Mesue, vigilæ vexant, accedemus usum papaueris: idq. prudenter agendum, ne spiritus via constingatur. dicitur emulsiõ papaueris cum sirupo papaueris: vel scriptulum philonis Persici. Balnea si vires non resolueant, vicia elenti. Addo iam quædam Empirica. accipe hordei de glutinati vncias sex: cancriorum funiatum crasso modo contusorum, abscissis pedibus, benè lotorum cum aqua fursuracea, & dein cum aqua calida, numero duodecim: capillorum veneris contusorum manipulos tres: seminis papaueris albi semunciam: patieratæ, verbenæ, hyssopi, enulæ, soliorum viticæ, farsaræ, cuiusque manipulum: passolarum vncias tres: carnis testudinis lotæ in vino vncias tres: coque exactè ex aqua: huiusque aquæ accipe libras tres: sacchari albi libras duas: fiat sirupus. accipe huius sirupi vncias tres: quæ limacum, capillorū veneris, maluarū, cuiusq. vnciæ: misce: sumat bis die, stomacho vacuo. Quidam, inquit Razes, lacte caprino curati fuerit, saccharum rosatum cum lacte calido, in mundo vlcere salutariter datur. Montanus cuidam præscripsit vt non alio

cibo vesceretur præterquam saccharo rosato, ita conualuit. Accipe boli drachmas duas: specierum diatrageathi frigidi drachmam vnam: cum saccharo dissoluto in aqua capillorum venenis fiat tabulatur; sumat sæpe drachmas duas. Canceri fluuiales crudi triti vel etiam cocti & cum lacte potati maxime conferunt, dicit Aëtius. Cardanus optima sibi comperta remedia describit in sua Methodo medendi, capite lxxv. Hamech filius Zezar, inquit Mesur, hoc mundificat vlcera pulmonis & ea consolidabat, Accipe iniubus quinquaginta: passulorum enucleatorum drachmas triginta: feminis maluz semunciam: canerorum fluuialium drachmas viginti, capillorum veneris manipulos duos: coque ex libris tribus aquæ, ad libram vnam: adde sirupi papaueris, sacchari, sæpe, cuiusque vncias sex: decoquantur ad mellis spissitudinem: dein adde feminis cucurbitæ exconicati vnciam vnam: gummi Arabici, tragacantæ, seminum cytoniorum, amyli, feminis portulacæ, amygdalorum dulcium, singulorum drachmas decem: papaueris albi drachmas quinque: hæc optime attrita remisceantur reliquis; da manè & serò drachmas quinque, vtuntur quidam felici successu carnibus testudinum: nam earum vrus commodus est his qui ob ignem totius feruorem, vnde valida alimenti exhaustio, tabescunt: aliis verò hecicis minime conueniunt, quia sunt cocti difficiles. Hi tamen vti poterunt iusculo ex testudine, hoc modo parato: accipe sanguinem ex iugularis testudinibus: mox abiectis coriis in siccis secentur, & ex aqua coquantur: bis hoc fiat; cum secundo decocto, coque quasi in cremorè adueone, sanguinem remisce. & coque: licet partem gallinæ adiacere. Hocius propina. Hoc madescit ac algosum est, & cocti facile, carnes verò abiciendæ. Conueniunt etiam trochisci de caphura cum sirupo de papauere vel cum aqua pimpinellæ. Quidam ex vfu folius decocti guaiaci sanati suere, de quibus iam conelamatum erat. nos ei adiciamus aliquid olei sulphuris. Bibitur per duos vel tres menses: purgato primum cacoehymo corpore clysmo, manna, sirupo rosato soluturo. Addere huic decocto soleo alchymillam, faniculam, pyrolam, quinquefolium, veronicam. caueat a salis & acris:

parum vini concedo. Contunde simul radices conditas symphyti, & conferam florum hyperici: adde species diatrageanthi frigidi, lemen papaueris, corallum, cornu cerui: hæc sanguinem sistunt etiam. Accipe conferuæ vel sacchari rosati veteris vncias tres: succini drachmas tres: philonij Romani drachmas duas: misce. sumat manè & vesperi drachmas duas cum aqua pimpinellæ. Comedat olus ex pulmonaria. Accipe pulueris ex pulmone vulpis drachmam: sumat ex vitello oui. Vfus etiam frequens terebinthinæ prodest. Memoriam lubet hic refricare summi mei amici, virique summi, D. Foresti, ac vtilem ex scriptis suis historiam narrare. Monacha quædam phibifica pro deplorata à medicis relicta, vt Romæ nobis relatum est, sequenti remedio intra duos menses sanata fuisse dicitur. Ventri pulli mundati inferebat vncias tres sacchari rosati, lentoque igne ex aqua coquebat, benè cooperit ollâ. Ex illo decocto supra cineres macerato, ac manè confuso pullo coque diluto, in lecho sumebat, & super dormiebat. euasit. Alius monachus, qui omnino emaciatus erat, duo oua recentia igne aduerso assabat ita, vt albumina vix coalescerent, albuminibus reiectis vitellos parinâ excipiebat, ac illis addebat sulphuris vtri ad fabæ molæ, saccharoque crystallino aspergebat eadem mensura, cum salis momento: hæc sumebat horâ vnâ ante cæteros cibos, & superbibebat vini dulcis cyathum vnum. interdum iungebat aquam rosæ solis his vitellis. Pro tussi vtebatur eleganter ex sirupo glycyrrhizæ, violarum, & ex speciebus diatrageanthi frigidi. Idè distillabat limaces teneros ante ortum solis in vinetis collectos: cuius cochlear enâ interdum capiebat eum vitellis ouorū. ta ille emaciatus tante paucos menses euasit pinguis, & præter medicorū expectationem euasit. Ibi etiâ describit puluerem Haly contra tabem. Si tanta fuerit fordis copia, inquit Aurelianus, vt & putrida euadat, vicemur polline erui ex melle decocto. Mundo iam vlcere, vt ait aqua distillata ex hederâ terrestrî, cum saccharo rosato veteri: id agat per dies quatuordecim. Aliud: accipe succi hederæ terrestris semilibræ,

Fol. 98.  
Mesur  
cap. De  
Phibifi

Testudinum  
sarc  
Ad mæ  
rie in la  
Qua n.

Forestus  
lib. 1. 6.  
18.

2. Lib.  
Tard. 34.

bram : sacchari vncias quatuor : fiat sirupus : sumat cum conferva rosata. vel loco succi hederæ accipe succum veronicæ. Accipe pulueris pulmonis vulpis drachmas duas : sumat cum sirupo myrrino vel cum aqua veronicæ. bolum commendat Serapio. Pulmonaria non vulgaris ad dimidium decocta cum saccharo. Ros folis auxilio est in pituita putrida, nam siccat. Accipe olei sulphuris semiscriptulum, remisce cum Isolabio violato. Laudatur cocta herba, *Ingraffia di porci dicta litalis* : ex illa paratur sirupus, conferva, puluis : quin in cibo præbetur. Gummi cedri cum melle, adiecto exiguo galbano. Sumat thus, malligen, & agaricum trochiscatum ex cocta rebinthina : fiant inde pilulæ. Accipe marubij odorati manipulum, incoque aquæ hbris quatuor : donec ad tertiam partem redeat : colaturæ adde mellis boni libram : & rursus decoque donec ad suam redeat consistentiam : misce radicem ireos drachmas duas. Aliud ex Dioscoride, accipe butyrum recens, rebinthinam & mel : vnâ coque, & sumat manè cochlearium. Sextus ait, equi spumam vel salivam si bibebint phthisici, & qui malè iussunt, sani euadunt, equus morietur. Et Marcellus, ad phthisicos, inquit, remedium & præfens & maximum est, nam etiam vitæ dubios sanat, & quibus superesse spes nulla videatur, equi salivam vel spumam cum aqua calida bibendam per triduum dabis : etiam quem tussi intoleranda & diutina laborare videris, hoc remedio liberabis : agrum quidem sine cunctatione sanabis, sed equum mors subita consequitur. Scribonius cerui pulmones cum suis gurgulionibus virgulis tensos, in sumo donec arefiant suspendit : ac puluerem ex melle præbet. Si phthisis sit ex animi dolore vel ex splenis vitio, vnâ cum difficili tussi, Accipe vtricarum paruarum siue Græcarum magnam copiam : exundatur ex his succus, & fortiter exprimitur : bibat manè & vespere hoc succo vncias duas bis die, manè vespere horâ somni. Si atrophia adsit, accipe vini Rhenensis libras duas, ollæ infunde, adde auri optimi partes aliquot : benè obturatâ ollâ bulliat dum tertia pars vini exhauritur : cum refrixit adime aurum, & tinge paucis aromate : sumat manè cochlearium vnum aut alterum. Pectus verò hoc

illinatur, Accipe medullæ cæru, vituli, butyri, axungie porci & gallinæ recentis, cuiusque drachmas duas : iragancanthi & gummi Arabici infusi in oleo nenupharis & violarum, cuiusque drachmam : ceræ albæ parum, vt fiat vnguentum molle. Accidetur quædam non minimi momenti huic malo superuenire solent, quibus ita remediandum. Febris si virget, Accipe aquæ violacæ, portulacæ, cuiusque vncias quatuor : sirupi violati vel granatorû dulcium vncias duas. Tunc etiam vitilis erit sirupus de iuiubis cum decocto psyllij, & seminis cydoniorum, cum trochiscis de caphura : deinde redeat ad vsum sacchari rosati recentis simplicis. detur pituita, & pharmaceuicibus excludatur parauis humor. Catarhus sedetur pilulis de styrace, diapapauere, & sirupo de papauere. Ad ventris fluxum, Sumat ius restans coctum cum malis cotoneis, symphyto, sumachio, & aqua rosarum. Ex vino inde cotonea. Rases hoc vitur : accipe gummi Arabici, spodi, boli, seminis myrti, singulorû drachmam : da cotidie drachmas tres ex sirupo myrtino vel papaueris. Aliud, accipe confervatiû rosarum cû bolo, adde sirupum myrtinû. Lac acidum coquat cum biscocto. Accipe aquæ radicem alihæz & petroselinæ, cuiusque semilibram : gummi Arabici, iragancanthi, cuiusque drachmam : amyli sesquidrachmâ, glycyrrhizæ drachmas duas : coque : colaturæ adde sacchari vncias duas : sumat bis die. Accipe ladani drachmas duas : mastiches drachmam : olei absinthij semunciâ : misce : vngat stomachi regionem. Ad sputum sanguinis, accipe sacchari rosati semunciâ : diatragacanti frigidi drachmas duas : radicem conditarum consolidæ vnciam : lapidis haimatitidis præparati drachmas tres : boli, succini, teræ Lemniæ, sanguinis draconis veri, singulorum drachmam : cum sirupo myrrillorum fiat electarium : sumat sæpe drachmam. Sed præstat venienti occurrere morbo : quare robora pulmones & sicca. Vtere pulmone vulpis siccat, cum succo glycyrrhizæ, capillis veneris, semine sceniculi, cum sirupo myrrino & oleo sulphuris. Confectio dicta ambrosia, aphanasia : sirupus nicotianæ auxilio sunt. Venus grauis absit : vnge nates dormiturus rebus calidis & siccis, vt vnguento spicato, oleo caryophyllorum. Si

Ad acci-  
dentia  
que se  
iungunt  
labi,  
Ad sa-  
brem.

Catar-  
rhus.  
Ad fluxum alui.

Ad fluxum sanguinis.

Trasfr.  
natis.

Nutriçti  
morfellis  
de scribit  
Arcula  
mors folio  
425.

acrior succus incurrit pulmones, accipies sirupi de succo portulacæ vncias duas: decocti portulacæ vncias quatuor: misce: viatur diebus sex: dein purgetur mannâ ex decocto capillorum veneris & violarum. duodecimo die accipiat pilularum de hiera cum agarico, & aurearum, cuiusque scriptulum: fiant pilulæ sex. Si sanguis emittendus, id fiat in Maio; abstrahantur vnciæ quatuor: & postidie id repeit. deinde toto Maio bibat lac recens multum, adice parum sacchari: sensim copia lactis veniat ad vncias decem: nec somnum aut exercitium illud à lacte ineat. Æstate fermentatione, viatur manê & sero conferuæ rosatæ semuncia: & superbibat aquæ portulacæ vncias quinq. Cæna sit parca, cum ingreditur lectum comedat hordeatū cum simplici saccharo rosato. Laudatur etiam conferua foliorum auticulæ maris.

## CAPVT VIII.

## DE Palpitatione Cordis.

Nominat

**A**FFECTVS Πάλαις τ' καρδίας qui dicitur Græcis, plerumque à nostris Palpitatio cordis vocatur, ab Auicenna appellatur Tremor cordis, Marcellus empiricus Cordis pulsus & Satisfactionem nuncupauit. Cor itaque in hoc affectu intermit & palpitat. Improprie tamen dicitur hic affectus cordis palpitatio: nā, auctore Galeno, vnicā palpitatio agnoscit causam, nimirum frigus, & flatulentum spiritum; estque palpitatio proprie vitii partium nō organicarum, sed carnis. Et hoc est quod scripsit Auenzoar, tremores cordis non esse eiusdem speciei cum aliarum partiū tremore: nam, inquit, à vaporibus & fuliginibus fit ille tremor in aliis partibus, vt musculis & cute: cordis verò tremor euenit à repletionē cordis. Nec etiam proprie tremor dici potest: nam in tremore fultus & deorsum tota pars fertur, sine dilatatione. Nos recepto nomine vtetur Palpitationis cordis. Est sanē Cor nobilissimum totius humani corporis membrum: quo intacto, potis non est vt homo moriatur: hoc verò labefactato, cunctæ partes in cōsensionem abreptæ faiscunt. Est enim cor princeps vitæ radix, calidi natui ac vitalis fons. Id, si Peripateticis fides, ita se in hu-

mano corpore habet, sicut in orbe Intelligenti prima, & est velut microcosmi rex nobilior, solidamento suo ceteros vitales spiritus; nam igneus est illi vigor. Hoc diuinum viscus plurimis expulsum est iniuriis, quibus eximulari interdum salum edit, quem Palpitationē vocamus. Est autem palpitatio cordis, deprauatus motus systoles & diastoles cordis, ab excretionē cordis vi excitatus, quo expellatur id quod cordi molestum est. Diximus in hac definitione, Palpitationem cordis, esse deprauatum motum systoles & diastoles cordis: Nam cor alto & forti pulsū quasi saltat in hoc affectu: dum enim nititur se ex more suæ naturæ extendere ac cōstringere, neutrum benè peragitur: nam ad verumque motum festinat, ac tremulum quasi anhelat. Hæc autem maximè conspicua sunt in carotidibus arteriis, quæ per cervicem repūt. Dixi ab excretionē vi cordis excitatus. nam tremulo illo motu excutere nititur vaporem. Rarò autem in paroxysmo hunc se erigit cor, nā extra exercitationem rerumque calidarum vsus intermit plerumque. Quare hæc est momentanea, non vera palpitatio. grauis tamen est hic affectus, magnoque Dei beneficio factus, Cor non sensu prædium fuisse: nam quod principium est, ipsum citra noxam vitū esse debet, ne illo vitiatō conuaneat cætera. Est autem Palpitationis natura quid toto genere præter naturam. Quamvis enim conuulsio, palpitatio, rigor eo conueniant quòd genus commune agnoscant Motum deprauatum, qui est præter naturam: quædā tamen sunt opera solius Naturæ coactæ: quædam verò solius morbi: quædam tum morbi tum naturæ. Inter illa opera quæ soli morbo ascribuntur sunt vera palpitatio & conuulsio. est hæc palpitatio symptoma, quod est actio læsa facultatis vitalis. Iam ad causas venio, scribit Galenus, omnes hoc morbo tentatos euasisse vena pertusa, vel attenuante viciu. Quare existimauit vel ex copia, vel ex crassitie succorum horticidium vasci, copia enim pressu motum intercipit. Crassities verò succorum infarcit ita ora venæ arteriosæ, vt sanguini liber exitus negetur. Interdum per malignas febres euenit hæc palpitatio: vt illi qui in Melibœa iacebat: huic palpitatio cordis aderat ab initio vsque ad diem mortis.

*Definitio.  
Et eius  
explicatio.*

*Libro De  
palpitatio  
ne.*

*De la-  
cu aff.*

*Lib. De  
Palpitatio-  
ne cap.  
4.  
Causa.*

*Epil. 3.*

Paul.

§. lib. 34.

Paulus Ægineta subscribere videtur: Galeni sententia: scribit enim hunc affectum fieri ex copia vel ex effluencia sanguinis corde concepti. Quicquid cordis venas, arterias, vel ventriculos nimium grauatur, hinc passionem adferre potest. Talia sunt plurima excrementa à vena arteriosa pulmonibus infusa, ac cordi per arteriam venosam illata; nam pulmo non videtur eguissè tanta vena, quanta arteriosa est, ad sui nutritionem. & à multo sanguine cor obstruitur. Galenus hunc affectum referre videtur in interperiem frigida: nam dicit omnem palpitationem esse effectum frigoris vincentis. Sanè intelligit ille medici tam & remota palpitationis causam: nam id quod citò fit & citò perit non potest immediatè in interperiem referri. Quare sæpe fit à vapidà materia, quæ citò excuti potest. Galenus dicit in hoc affectu connexum partium violari: & eo nomine ad malam cõformationem vel situm prauum reuocari possit. Auicennæ tamen videtur tot à frigore, tum à calore hunc affectum subnasci posse. quin ipse Galenus à cordis inflammatione palpitationi similem motum in corde gigni ait: quare dicendum videtur à calore etiam hoc malum nasci. Respondendum, id potius referendum esse ad validum cordis pulsus, qui nonnunquam alius sese effert, necessitate euentrationis anxio pressoque corde. Ita Aræteus dicit à stomacho hunc affectum fieri posse: nam is, inquit, vicinus cordi bona & noxia illi imperitur. Profecto si vera palpitiatio à calore & siccitate nasceretur, in hecisti perpetuò illa saugaret. Quare frigus mediata causa efficiens palpitationis cordis esse videtur. Hoc autem vel ipsum cor occupauit, vel alias partes, vnde tandem cor affligitur. Nam vicinæ partes, vt pericardium & pulmones algiosam interperiem cordi inferre possunt, non aliter ac lien hepatis. Ita cum aquosa substantia, quæ in pericardio circumfluit, frigidiore fuerit, vel quis tumor frigidus occupet vicinas cordi partes, refrigeratur cor, & aque hinc flatus generatur, ex quo tandem palpitiatio surgit. & ex observationibus languidum reliditur cor, inde flatus nascuntur. Noui nobilem mulierem quæ ex nimio sanguinis profluvio ex viro sæpe in palpitationem cordis incidit: ita

vt non solum cor, sed omnes totius corporis arteriæ validissimè palpitarent: tandem longis annis ad atrophiam lapsa. Hæc nullam ferebat alium subducentia: nam ab his ilicò totius generis arteriosi palpitationem incurrerat. Importantur interdum vapores in cor, vt ab hypochondriis, viro, ventre, per arterias, faciliè ex liene id fit cum per arteriam expirat flatulentiam auram, vnde in angustum cogitur cor. Externæ causæ sunt cræpala, flatulenta edulia, exercitatio, ingrauidatio, potus aquæ algidissimæ, ac ab extincta candela insectus, venenû, ira, timor. Est sanè hic affectus vehemens; nam cor, pars cuius officio vita care nequit, afficitur. Est malum peracutum, contagij expert; dies in multis excurrit, nam interperies frigida nō citò placatur. est malum intermittens. Differt palpitiatio à palpitatione, ratione maioris & minoris: nam interdum ab instantibus exauditur sonitus, ac pectoris regumenta quatuntur. Nonnunquam exigua est palpitiatio: quædam sæpius recurrit, alia raro fatigat. Interdum magna prostratio virium adest, polyædalaque pulsuum varietas. est periodica, est quædam non periodica sed vaga. Dignoscitur palpitiatio iactu, quo in imo pectore sentire manu eā solemus tandem & raram, nam intermittit. Si hac ideâ non sentitur, non erit vera palpitiatio, sed erit pulsus arteriæ. Si id vitium à timore aquoso pericardij fuerit, erit cor ita affectu vt quasi in aqua natare videatur, ac suffocari. Si ex pulmonibus fuerit, præcessit maxima pulsus inæqualitas, quam excipit ægra respiratio. Si labes hæc aliunde à remotis partibus importatur, illinc symbola affectarum partium elucebunt. Quiescente corpore plerumque intermittit hoc malum: exercitio, vino, venere, balneo, irâ recrudescit. A flatibus quoque fit, non ita diu pereannat; nec ira vehementer affligit: remittit à discutientibus flatibus. Vbi à sanguinis copia est, quo opprimit cor, varius runc editur pulsus, iam magnus iam parvus, tardus iterumque velox: & videbitur cor suffocari ac stringi. Perspectus affectus huius naturâ, ad sanationem pergamus. Causa in primis abscindatur: quare flatus fit in vitio fuerit, is amolendus erit. Sed flatus vel geniti sunt, vel generantur. si geniti, vel iam actu in corde concepti sunt

Externa  
causa.

Differe-  
ntia.

Signa.

4. Aph.  
65.

5. De  
causis  
mor. 1. 1.

Historia.

Indicatio-  
nes cura-  
tione.

&c.



& id premunt: hic Indicatio nascitur liberandi cor à flatibus, quare discutiendum. Si à flatuum incurfu ac cor inuadatur metus fuerit, erit reuellendum: quatenus verò generari possint, cum noui status, qui irrepit in cor, metus adsit, ne is gignatur prohibebimus, in temperiem frigidam, status auctorem, castigando: quare calfaciemus. Vt breuiter dicam, spiritus halituosi generationem impediemus, materiamque crassam attenuabimus vnde illa surgit, & à corde flatum arcebitur. Id fiet subducendo materiam ex qua subnascitur: & cor, ne facile spiritum halituosum admittat, robore afflabimus. Tolleitur materia vi bonæ dietæ, extenuantibus & vacuantibus remediis. Si fuerit à plethora, vnde succrescit sæpè aquæ copia in pericardio, imò metus inde ne in phlegmone trahatur cor, secanda erit vena dextra quam basilicam vocamus. Si à spiritu halituoso qui à liene, seca sinistram. In præcipui casu, vnde metus syncopes, aucte potenter friczione, cucurbita, vinctulis, suppositoriis, clysmis. Si partis alterius à communione irrepit malum, hanc vacua, aucte, robora. Si venenum in vitio sit, id euomatur, ac pinguis rebus obtundatur: & bezoar cum theriaca propinetur. Sed positis his scopis, videamus num illos attingere possimus: & num facile vel ægrè: nam sine prædicatione sæpè non sine rubore agitur sanatio. Ex frigore cordis si euenerit, est lethalis: nam cor redditur imbellis ac secundum in flatu. Si diu perennat, occidit repente: nam curari nequit quæ iam inueterauit. Quibus longis spatiis redit, ante senectutem iis fatalis est, nam ex syncope vel causo moriuntur. Si euenerit ratione pericardij vel pulmonum, non æquè est calamitosa, ac si peridiopathiam euenerit: frequens hypochondriaci malum: nec in iis desperandum. Quæ à frigore sit, plerumque per syncopem in mortem abit: Quæ à calore, vt in plethora, per causum occidit: vel in aeurisima abit. Iam ad curationem pergo. Antiquus medicus Nonus hic præter sanguinis emissionem non agnoscit aliud remedium. & Galenus scribit omnes ex venæ sectione opem sensisse. Si his euenerit qui ex ephæbis euadunt, vel mulieribus quibus non respondent menses, vel his qui se liberalius carne & vino inuitant, vel

talibus quibus hæmorrhoides obstruæ sunt, hoc est, quibus in icore totoque corpore copiosus sanguis conceptus fuerit, his, inquam, venæ sectio necessaria: præscribitur: ita etiam his quibus ob has causas, copiosa aqua in pericardio circumfluit. Sed quænam vena est aperienda? Razes secat venam axillarem dextram, vbi sese confociat febris cum pulsu veloci. Si à sinistro hypochondrio venit malum, feriatur vena sinistra brachij. Si à mensium inceptu fuerit, pedis vel poplitis vena recludenda. Sed qua copia effundendus sanguis? Audet Ioannes Arculanus extrahere octodecim vncias, imò ad syncopen vsque, dum metus adest phlegmone, vel suffocationis repentinz & mortis: raptà subitò materià in cor, quo cor subito opprimatur. Attamen, ait prudenter, inducias dare malo, præstareque partim illa fieri: & tales euacuationes fiant extra parosysmum. Nam, dicit, in parosysmo potius reuulsioni studendum. mox subdit, si phlegmone metus adsit, fiat phlebotomia reuulsoria: attamen omittatur si potis sit: similiter, dicit, ventris solutio: ne forte materia agitata amplius, influat in cor, vnde suffocatio & mors, vel forte syncope ex resoluta facultate: tempore autem quietis securus hæc fient. Viden vt trepidet in hoc negotio Arculanus? nec sanè immeritò, quamuis Auenzoar scribat maximam copiam sanguinis esse extrahendam: nam hic non agnoscit aliam causam palpitationis cordis, quàm plethora cordis. Auenenna tamen admonet ne vnica vice extrahatur magna sanguinis copia, ob vires. Quare auctor sum ne quis ad animi deliquium prouchat sanguinis effluuium: nam consilium est vt à corde abducamus: a deliquiù animi in cor rapit sanguinem. Vere commodè fit. Quare nota bene num hæc morbifica materia sit remixa cum sanguine, vel num sit sanguinis experta, & num hæreat in pectore materia frigida: nam scribit Galenus phlebotomiam interdum profuisse, interdum non. Vincula tempore parosysmi & fricctiones cum lintheis odoratis admouentur. Cucurbitæ tubis admouentur: nam dolorem ita inferet. Umbilico impone magnam cucurbitam: sed habeat in apice foramen: quo, cum lubet aperto, illic cadat. Imò ad causam

Quæ vi-  
na.

Copia.

Pregre-

Curatio:  
& pri-  
mum de  
Clitru-  
gia.  
Phlebot-  
omia.Lib. Da  
remet.Cucur-  
bitæ.

stica veni; tibiis ac carpo impone phœnigmos. Cautio in his sit, ne vras nervos & arterias, quare caue à radicibus ranunculi, nam præcū cum indicibili quadam malignitate vrunt, sæuōque dolores concitāt. vita etiam capita & fines musculorum: tanta potius his partes carnosas. quare medix parti muscoli brachialis hæc impone. Fiat etiam reuulsio clysmis & glādibus. Iam ad Pharmaciū venio. Præparatio & purgatio fiat rebus naturæ ferè consocialibus. Vt per vis veteris galli, cuius venter melissā, buglosiā, caryophyllis, cinnamomo, persulis aquā rosatā impleatur: bibat id ius manē & serō horis quattuor ante cibum: & cūm purgare vis, macera in co iure epithymum, agaricum, senam, & coque in co polypodium, semen carthami. Si necessitas vrget à symptomatica translatione, etiam ante præparatum vsūm purgetur. Præparetur materia frigida oxymelite simplici vel composito, sirupo byzantino, sirupo de cortice citreorum, de fumaris, de duabus & quinque radicibus, prassij, liquitiz, melle rosato, de hyssopo, de epithymo, de pomis, & de lupulis. Adde aquam melissæ, sceniculi, enulæ, rorismarini, scabiosæ, prassij, betonicæ, anisi, galangæ, vel decoctum caryophyllorum, & sceniculi. Accipe summaturum calendulæ, melissæ, cuiusque manipulum: calaminthæ, rorismarini, betonicæ, cuiusque semimanipulum: scordij pugillum; cinnamomi semunciam: passularum Corinthiacarum vnciam: macera hæc in vino Rhēnēsi, & coque in balneo: sumat in aurora per quattuor dies, & deinde purgetur. Si aqua in pericardio fuerit concepta, viatur decocto ligni guaiaci, cum betonica, boragine, adianto, vrtice, enula, roremarino, radice sicca ireos, aqua florum sambuci. Deinde purgetur. Sint purgantia mediocria: vita scammoniata. Sumat fescunciam sirupii rosati laxatiui cum sena, ex decocto melissæ. detur etiam magna & cassia: electarium de psyllio: electarium lenitiuum cum decocto florum & fructuum cordialium: in quo decoxit semuncia tamarindorum. Viatur diluto agerici recenter trochiscati: pilulis de hiera cum agarico, alephanginis, masticinis, aggregatiuis, sine quibus: vel purgetur solus senæ & epithymo, ex sero lactis maceratis. Semper adde quid vini vel

aquæ cordialis. Purgato corpore studendum erit vt corroboretur. Hæc sint semper moderata calore & frigore, ne cor alterent: caleant ita vt cinnamomum, vel mace, & vt borago, melissa, & calendula. Radix buglosiæ saccharo condita. Vitemur dulcibus, odoratis, modestè calfacientibus, vitales spiritus roborantibus, ac à fumosis spiritibus eos vindicantibus, vt melissā, vino Hippocratico, ex libra vini & semuncia cinnamomi. Narcotica etiam his non malè iunguntur, ne vis eorum quæ cordi student, cūm sint tenuia aromata, illicò euanescat: hæc causa fuit quod veteres opium cardiaci importarent: sed his non vtendū ante tertium à mixtione mensem. Aromatum calor dometur sirupo boraginis vel de pomis. Sini semper grata remedia. Margaritæ his commendantur. Accipe florum cordialium, singulorum pugillum: florum caryophyllorum semimanipulum: coque leuiter in aqua buglosiæ & melissæ libris duabus: adde vini albi vncias quattuor: caryophyllorum drachmas duas, cardamomi semidrachmam: croci scriptulum: ambræ semiscriptulum: cinnamomi drachmas tres: dulcoretur saccharo: sumat manē. Si quid caloris subesse suspicio fuerit, remiscemus rosam, violam, nymphaeam, fantala, capuram, acemum, omphaciū, berberim, cerasa acida, pruna acidula, acetosam, mala granata, citia, aurantia, persica, caraben, coriandrum, cydonia mala, pyra, poma, lac acidum, diarrhodon abbatiss, diamargariton frigidum, triumfantalum, corallum, margaritas, cornua, hyacinthum, boraginem, bezoar lapidem. Calorem delet sirupus violatus, endiuiz, acetosæ, de ribes, oxyfacccharum, citriorum sirupus: cum aqua rosata, lactuca, vel radicum plantaginis. Diabuglossatum, diaboraginarum. Hoc præclarum remedium est: Accipe margaritarum, seminis basilici caryophyllati, seminis citreorum, cardui benedicti, cuiusque drachmas decem: caryophyllorum, cinnamomi, singulorum drachmas duas: macis drachmam: croci semidrachmam: ambræ scriptulum: singula in pollinem vertantur: dein misce cum aqua rosata, & tere in lapide marmoreo cum auri lamina, coque dum auri color eluceat in his pulueribus: adde ad pondus omniū cortices citreorum,

pp

conditos,

conditos, cum aqua rosata & cum sirupo conseruationis nucis myrsiticæ fiat opiata: sumat quotidie manè semunciam. Vtemur etiam aromatico rosato, diacymino, dialcalaminto, dianiso, theriac, mithridato, plures archana, compositione de hyacintho, alkermes. Accipe specierum diarrhodonis abbas, diamargarini frigidi, cuiusque drachmam: trochiscorum de caphura scriptulum: pulueris diambrae semidrachmam: conserue rosarum drachmas duas: sacchari in aqua rosata soluti, quod satis sit vt fiat electarium solidum: sumat tres drachmas, & superbibat cyathum aque boraginis. Accipe margaritarum preparatarum, coralli rubri, unicornu, auri optimi, cuiusque drachmam: cum lulapio rosato fiat puluis subtilis: sumat scriptulum ex aqua cordi dicata. Aliud præstans: accipe macis semunciam: cinnamomi, caryophyllorum, cuiusque vnciam: rosarum persicarum manipulos decem: vini maluatici quartarium: digerantur diebus quattuordecim: destilla per balneum: destillatæ aque immitte mosci drachmas duas. est hæc aqua gustu suauissima. si plures tales velis, consule caput de syncop. Accipe vini optimi libras duas: adde dictamni, hyssopi, thymi, calaminthæ, rosamarin, calendulæ, melissæ, menthæ, cuiusque pugillum: caryophyllorum, cinnamomi, seminis basilici, granorum paradisi, cuiusque drachmam: croci scriptulum. expone solis æstiuo: accipiat ex illo vino quotidie manè vnciam, potest addi parum lapidis bezoar singulis dosibus. ante pastum potest inde bibi haustus. Accipe succi buglossæ depurati ad ignem vncias duas: sacchari drachmas duas: bibat in lecti ingressu per dies decem. Accipe succi depurati boraginis, acetosæ, endiuicæ, cuiusque vncias tres: sacchari semilibram: fiat sirupus. Conserua melissæ cum grano musci. Coque cardiacam ex vino. Accipe musci semigranum: croci scriptulum: vini albi calidi semicyathum: soluat muscus paucus in aqua vitæ. Immacera aque vitæ summitates melissæ & calendulæ, & cinnamomum: da guttulas paucas cum vino, initio mensæ. Crocum infunde aque vitæ, dum albescat crocum: id calcina, & fermenta cum prædicta aqua: & inclina: da granum eius ex iusculo vel vino: reuocat id vitales spiritus. idem fiat

in caphura. Semper quod reliquum est calcina: & redde cineribus liquorem, ita fundent salia. Accipe theriacæ semidrachmam: croci grana octo: mosci granum: propina cum decocto melissæ ex vino, vel ex vino in quo coxit cinnamomi semidrachma, & macis scriptulus: sumat tertio die semel. Accipe margaritarum drachmas duas: succini albi drachmas tres: rasuræ eboris drachmas duas: coralli, hyacinthi, santalorum, cuiusque drachmam: caphuræ semidrachmam: musci, ambrae singulorum grana octo: lapidis bezoar scriptulum, conserue violarum, nenupharis, cuiusque vnciam: cum sirupo violato fiat electarium. Accipe conserue buglossæ, vncias duas: corticum citreorum conditorum vnciam: aromatici rosati, diambrae, cuiusque drachmam: cum sirupo nucis moscatæ fiat conditum. Accipe pulueris aromatici rosati, & caryophyllari, cuiusque drachmam: pulueris diambrae semidrachmā: seminis ocymi scriptulum, rasuræ eboris scriptulos duos: santali albi & rubri, succini, ligni aloës, singulorum drachmā: cum conserua corticum citreorum, & florum boraginis & melissæ, fiat electarium. Accipe florum cordialium, radicum buglossæ, singulorum vncias quattuor: croci drachmam: mureæ cydoniorum vncias tres, vini albi optimi libras duas: pistentur, & misceantur simul: macera in balneo dies quattuordecim: dein distillantur bis per alembicum: sumat vnciam. Radix helenij condita, & cortex citri, angelica. Si æstus vger, accipe aque rosatæ, succi acetosæ depurati, succi aranciorum, partes æquas: cum saccharo fiat sirupus. Rases exhibet pastillos ex mosco, quorum compositionem hoc capite describit, & ait hos etiam syncopi dicatos. Rases, vbi consociat se febribus, & vbi pulsus est velox, à vena secta, dat trochiscorum ex caphura drachmam, cum croci granis tribus, ex succi granatorum vncijs tribus. quattuordecim diebus continuis hoc agit. Sed, inquit, si hæc præsidia motbo cesserint, lac acidum potui præbeto. & hoc capite describit hos trochiscos. Et hoc eodem loco tradidit Electarium ex mosco, quod valde commendat: & coctici languentii conserui, ventriculoque frigido, & fastidio. Quæ valde calentur ex aqua rosata. Accipe conserue viola-

violarum, rosarum, buglossæ, cuiusque vnciam: trium santalorum, feminis basilici, xyloaloes, caryophyllorum, cuiusque semidrachmam: nucis moscatæ conditæ diachmas tres: cinnamomi drachmas duas: feminis anisi, fœniculi, carui, singulorum scriptulū: mulci grana octo: croci scriptulum: feminis papaueris albi semidrachmam, facchari pellati cum aqua rosata soluti quantum sufficit: ut fiat opiatæ forma. addi possunt enula condita, fuccinum, semen citri, terra lemnia, cotinodrum, cornu cerui, bezoar, spodium, rhabarbarum, caphura: fermentantur cum iulapio ex fucco granatorum. Iam venio ad ea quæ foris admoventur. Epithemata: Accipe aquæ melissæ, boraginis, cuiusque vncias quinque: his immacera melissam, basilicum, crocum, lignum santalum & aloës, diambram, cinnaomum, vel caryophyllos, rosas rubras, corallum, laucendulam, vel rosmarinum, folia lauri, maces, cortices citrij: aliqua horum iolice: colaturæ adde quid vini aromatici, vel aceri, vel aquæ rosatæ. Accipe aquæ melissæ, scabiosæ, boraginis, cuiusque vncias quatuor: trochiscorum Rasæ de caphura semiscriptulum: santalorum omnium drachmam: fiat epithema. Accipe aromatici rosati, pulueris lætificantis Galeni, singulorum drachmam: croci semiscriptulū: aquæ buglossæ vncias octo: aquæ melissæ, vini albi, cuiusque vncias quatuor: fiat epithema: addi poterit etiam aqua rosata, & acetum. Accipe aquæ rosarum vncias tres: aceti rosati vnciam: vini maluatice semunciam: beniouini, caryophyllorum, cinnamomi, santalorum, balsami Americani, radicum cyperi, singulorum semidrachmam: mosci, ambre, cuiusque grana sex: fiat pulvis, & misce cum liquorebus, & inde ampullæ angustis oris, pergameno petulo operculetur: insperge faciei vibrando. Accipe basilici folia, melissæ, cardiacæ, rosarum rubrarum, seruescant in aqua menthæ, & applica cordis regioni. Sacculi: Accipe foliorum melissæ manipulum: rosarum rubrarum, anthos, florum boraginis, cuiusque pugillum: foliorum lauri, quatuor: feminis basilici, caryophyllorum, macis, corticum citrij, cinnamomi, cuiusque drachmam: ambre, mosci, singulorum grana quatuor: fiat sacculus: qui rigetur aqua rosata & vino odo-

rato. Accipe pulueris caryophyllorum, nucis moscatæ, cinnamomi, singulorum semidrachmam: pulueris rosarum, diambræ, cuiusque drachmam: florum boraginis semunciam: fiat sacculus: ex vino applica. Accipe florum rosmarini, rosarum, cuiusque pugillū: citrij sicci, macis, ligni aloës, santalorum omnium, feminis basilici, singulorum drachmam, spice Celticæ & laucendulæ, foliorum lauri, cuiusque semidrachmam: fiat pulvis & sacculus: aspergatur vino albo & aqua melissæ vel boraginis: adde quid radicum cyperi, vel pulueris diamarganti frigidī. Crusta panis madefacta in aceto & vino, ut fusi pillicula: sed primum intteri crusta debet: adde pulueri caryophyllorum, diamargarum frigidī, diambræ, vel aromati rosati, vel lætificantis Rasæ. Linimenta: Accipe vnguenti rosati semunciam: olei cinnamomi scriptulū: mosci, ambre, cuiusque grana sex, misce. Si æstu incandescant viscera, accipe vnguenti rosati, & santalini, cuiusque semunciam: olei nymphææ, drachmas sex: coralli, margaritarum, cuiusque scriptulum: caphuræ semiscriptulum: misce. Abluat, biduo vel triduo, se vino ab vnguentis. Accipe theziacæ semidrachmam: fucci limonis diachmas duas: croci semiscriptulum: margaritarum, coralli rubri, cuiusque scriptulum: caphuræ grana duo: misce cum paucis guttis vini albi, ut fiat linimentum: syndone exceptum, calidè cordi admove. Si pueris à vermibus cor tremit, accipe aloës, myrrhæ, singulorum drachmas duas: croci semiscriptulum: fucci citrij drachmas duas: vini albi fortis drachmā: applica cordi super petiam. & vmbilico hoc, Accipe farinæ lupinorum amarorum, aloës, singulorum drachmas tres: fucci abinthii drachmas duas: misce cum oleo nigellæ, & super petiam admove vmbilico. Si æstuat cor, Accipe olei nymphææ vnciam: santalorum drachmam: rosarum rubrarum scriptulum: caphuræ grana duo: ceræ parum, ut fiat vnguentum pro regione cordis. Fiat vnguentum ex essentia cum oleo myristicæ nucis. Iam ut videretur: haberi homo in visu debeat expendamur. Quicquid vitæ spiritus exhaurit, cauendum. Aëris æstus & frigus validum nocet: aër sit purus & odoratus. Si æstuat pectus, castigetur aqua rosata, aceto, salice, pampinis,

Foris admo-  
uenda.

Epithemata.

Sacculi.

Linimenta.

Forma.

ut videretur.

Cec.

Cibus.

Potui.

Adm.

pinis, floribus nymphaeae, rosarum, violarum, sanctalis, caphura, pomis cydonijs. Si nimis aer perfrigit, temperetur croco, musco, ladanis, caryophyllis, iunipero. Componatur pomum ex musco, ambra, styraee, caryophyllis, cum ladanis. Cibus in copia sit mediocrius: est enim morbus diuturnus. Qualitate sit attenuatus, calfaciens moderate. Condiatur cinnamomo, croco, caryophyllis, mace, pipere, hyssopo, serpillio, rosmarino, melissa, menta, salvia, boragine, feniculo. Columbæ, vel capo cum mace coquantur: ita perdecies, cuniculi, auiculæ, vitulinae caryophyllis sparsim repleta. Olius ex boragine, melissa, foliis feniculi. Abstineat à rapis, castaneis, leguminibus, & à fructibus crudis. Pullus coctus cum ciceribus rubris, melissa, pimpinella, boragine, & aromatibus: in sculo ex his vitatur. Si febris adfuerit, inquit Rases, lac acidum potet, & pullus vel caro vitulina aceto & agrestia condiantur, cum citreorum succo: vel cum herdeo mundato coquantur, lactuca, acetosa, potulaca. Si flatus fatigant, à cibo sumat puluerem ex rosis rubris, cinnamomo, glycyrrhiza, semine coriandri, anisi, ameos. Scribit Rases, carnem accipitris torā substantiā hic conferre. Potet ceruissim & vinum antiquum. sit vinum tenue, suauis odore, vitet potentia vina, nam vinum imperu quodam cor inuadit, indeque fit vt augeat obstructionem cordis. Potui immitte calendulam, melissam, pimpinellam, buglossæ flores. Fiat hippocraticum ex aqua hordei & pauco vino, cum cinnamomo, dulcoretur iulapio rosato. Vinum diluatur aqua rosata & boraginis, ita vt aqua boraginis parum rosata vim redoleat. Vinum absinthites commendatur. Sirupus acetosus, & iulep violatum & rosatum ( si febris adsit ) cum aqua hordei, & rosata pauca. Exercitii hic non confert. Caveat ab omnibus animi affectibus, irā, vigiliis, venere. Alius quotidie officium suum faciat: accipe absinthij, cardui benedicti, singulorū manipulum: chamædrys, rosmarini, cuiusque semimanipulum: radicem recentium polypodij vncias tres: foliorum senæ vncias tres: radicem mechoacan vncias duas: macis, caryophyllorum, singulorum semunciam: hæc infunde vasculo vini: & post decimum quartum diem bibat quotidie cyathum

ante cibum: quod alius naturæ respondeat. Potet saphyrum vel hyacinthum in regione cordis, auro inclusum. Non stringat admodum thoracem veste. Et tegat pectus veteri linteo, quod madiuit in aqua lauendula, quodque iam siccum est, & semper caleat id. Iam breuiter ex nostro more Empirica subnectam. Accipe pulueris crassius nuci moscatae, caryophyllorum, massici, singulorum drachmas duas: cinnamomi drachmas tres: ligni rosei in taleolas scissi semunciam: croci scriptulum: balsami Americani drachmæ semissim: syndone excipe, & infunde scissilibus aquæ rosatae: coque ad exhaustionem tertie partis: colaturæ adde sacchari libram, coque ad sirupi consistentiam: adde parum musci optimi. Hic sirupus recreat algentem ventriculum & cerebrum, cordi dicatus est, asthma etiam remedio est. Accipe aquæ boraginis, & floribus curiose distillatæ vncias sex: sirupi de succo boraginis drachmas decem: iulapij rosati, aquæ cinnamomi, cuiusque semunciam: margaritarum solutarum drachmas duas: auri dissoluti drachmam misce: sumat cochlearium. Si æstus sit molestus, potet succium cum aqua acetosa: si non æstuat, cum aqua melissæ id potetur. Marcellus Empiricus iubet vt succum viciū immitantur in aqua: seruentem, & illic esse patiamur: atque inde per triduum laborati singulos cyathos tepescentes demus bibendos. Succus cardiace manet sumatur cum saccharo, vel aqua ocimi cum scriptulo diambæ. Accipe philonij Romani scriptulum: croci grana octo: caphuræ grana quatuor: musci grana duo: dentur cum vino vel cum aqua rosata. Accipe cordium porci numero duo: corda cerui vel bouis tria: coque ex aqua vt tenerescant: dein confice caryophyllis, galanga: adde seminis basilici drachmas tres, & tantundem macis: florum buglossæ, boraginis, cuiusque manipulum: florum rosmarini semimanipulum: temperentur in vino Madrico per noctem, & distillentur omnia in alembico. Accipe huius aquæ vncias quatuor: sacchari parum: si calet homo, adde aquam rosatam. accipe huius aquæ semunciam: quom remisce cum vini hippocratici viciis duabus. Caphura syndone excepta collo suspenditor. Sape vitatur biera picra. Sumat alternis diebus

Empirica  
remedia  
da.

diebus per horam ante cibum pilulā vnam  
aut alteram de hiera, vel alephanginas. Ac-  
cipe florum cordialium, melissæ, cuiusque  
manipulos tres: radicū buglossæ vncias  
quatuor: croci drachmam: mizæ cydonio-  
rum vncias tres: cinnamomi semunciam:  
assande aquæ vitæ optimæ libras duas:  
macera frigide, dein distilla: vel inclina.  
Accipe capburæ tritzæ & croci partes æqua-  
les: cum oleo rosato fiat vnguentum: vn-  
ge cordis regionem. Tere melissam cum  
boragine, & calefac in patella terrea cum  
aqua rosata & aceto: & regioni cordis ad-  
moue.

## CAPVT IX.

## DE SYNCOPÆ.

Nomen:  
de mor-  
bi vi.

\*Inter-  
cipere  
vires:

Definitio,  
et eius  
causæ.

**S**YNCOPÆ, quam Q. Horatianus ap-  
pellare videtur *αἰσθησις*,  
& totius corporis & vitium plenam reso-  
lutionem, dicitur *αἰσθησις*, &  
*αἰσθησις*: quā, inquit Aretæus, nihil ma-  
ius, nihil celerius. quid corde ad mortem  
vitæque potentius? Alexander lapsum vi-  
rium vocat. Est enim syncopæ vinculorum  
facultatis vitæ solventis dissolutio: nam  
auctore Aretæo, est cordis & vitæ ægritu-  
do. Quam ita definimus, Syncopæ est præ-  
ceptæ vehementer iactura cunctorum vi-  
rium, maximeque vitalium. Dixi esse ia-  
cturam cunctorum viriū: quia non ita ene-  
atur spiritus, vt & *αἰσθησις* & *δύναμις* si-  
mul tollat: nam id mors esset. Dixi præter-  
ea esse iacturam vehementem & præci-  
pitam: quod abeat à lipothymia: quæ est re-  
nui quædam spirituum iactura. Adiunxi  
cunctorum viriū adesse iacturam: nam  
prosteruntur in terram, ac omnibus ex-  
ternis sensibus spoliantur. Tandem addi-  
di, Maxime vitalium: etenim pulsus vix mi-  
eat, ac omnes cordis affectus sopiuntur,  
spes, ira, timor. Quin aliæ facultates ab  
hac vitali hinc trahuntur: proptereaque in  
cor refertur hoc symptoma. Rectè itaque  
Aretæus scribit Syncopen cordis morbum  
esse. hic reprehendit quosdam qui asseue-  
rant stomachi affectum syncopen esse:  
quod in nonnullis vires refectæ sint cibo,  
vino, & frigida ægritudo sublata. iidem  
inquit, mihi videntur opinari Phrenitum  
capillorum capitis & cutis affectum esse,

quod capillorum detensione & cutis irri-  
gatione Phrenitici releuantur. Verum cor-  
di vicinus stomachus perniciosus est, vnde  
in cor tam noxia quàm vitia deriuantur.  
At stomachus vitæ neque principium ne-  
que sedes est, sed tamen noxa per stoma-  
chum, vt à cibis malis, infigi cordi potest;  
nam inde cor palpiat, linguitur, vertigi-  
nes, sudor inuictus, resolutio corporis to-  
tius: hæc à stomacho. Quare Q. Horati-  
anus scribit sibi nunquā claruisse indicium  
manifestum quo tentari in aliquo naturā  
cordis intelligeret. Certum est ex frigidis  
ventriculi succis cor alterari. Hoc autem  
cordis horrendum symptoma vi debellari  
possit, primum exploratum nobis esse de  
vnde originem principiaque ducat: *causa.*  
hoc est, cuiusnam morbi umbra sit & effe-  
ctus. Curato enim morbo, auferetur vñ  
symptoma, quod hic syncopæ est. Morbi sa-  
nè cuncti referuntur vel in intemperiem cor-  
poris, eiusve partis, vel ad harum malam  
cōformationem, aut hærent in praua ma-  
gitudine, numero, vel situ: vel referuntur  
ad continui solutionem. Syncopæ effectus  
malæ temperiei esse dequit: si enim tenuis  
quædam intemperies cor occuparet, pul-  
sum solum cordis affigeret; at si valida ea  
intemperies perennaret, mortem adferret;  
vel subitò, aut pedetentim. Si pedetentim,  
sanè non ex syncopæ, verum ex intemperie  
mors veniret: quod si confertim intempe-  
ries cor percellat, enecabitur confectario  
huic ab affectu, vt à phlegmone. Quare  
syncopæ sui auctorem agnoscat morbum  
in mala compositione, nam inuadit subitò  
& confertim: Quare intemperies imme-  
diatè non erit causā syncopes. Nec conti-  
nui solutio syncopes causā erit: nam vulnus  
si sinus cordis penetraruit, sanguinis expro-  
fluio opprimentur homines. Sin vulnus  
non penetrarit, mox aderit vñ phlegmo-  
ne, dein syncopæ, quæ syncopæ morbus  
erit in mala conformatione. nimirum  
a cordis dilatactione vel strictione, (substā-  
tiæ enim mobili, qualis est spirituiū, quies,  
mors est) cordis penè extinguuntur spiri-  
tus. Hi itaque morbi sunt vnde syncopæ  
nascitur. Fit igitur à mala conformatione  
hæc passio, nam fit dum ad peripheriam  
dissipantur spiritus, vel dum ad centrum  
vi coguntur. Hæc eueniunt dum meatus  
cordis non ex lege naturæ compositi sunt.

sed cum nimis dilantatur vel contrahitur: fit enim id non solet, spiritus vitales exhauriuntur, nec opprimerentur. Quare dum data via à duobus parentibus, à centro in peripheriâ feruntur, fit maxima spirituum dissolutio. Exhauriuntur autem spiritus, quia rariore evadunt: vel rara corporis textura, spiritus tenues finit fluere in auras. acricum cum viuit calore corpus, patulum redditur: vel validus animi motus spiritus dissipat, vel excretio immoderata: aut doloris acerbitas (vt in vulneribus musculorum temporaliū, & in tendinibus vulneratis) morbi magnitudo, inedia, aneurisma, vel ruptio abscissus subitanea, in parte cui arteriæ plurimæ intextuntur: vel si nervosa pars affligatur, quæ vasorum societate cum corde iungitur, vt euenit in fractura calcis: nam hæc non frangitur sine valida consusione vicinarum partium, inter quas etiam sunt arteriæ. labor longus spiritus cordis etiam exhaurit: hoc etiam facit officium ventriculi si inflammetur, vel si ab acerrimo succo incuratur, vel si frigida à materia fatigetur. Nam magna sympathia iungitur officium stomachi cordi: quia magna illa arteria quam aortam vocamus, ex imo corde oritur, & descendit illa vna cum œsophago, cui membranis iungitur ad os ventriculi, vel id euenit ab hysterico aliōve veneno. Quare, vt breuiter dicam, sex videntur esse causæ corruptelæ spirituum, nimirum suffocatio caloris patui, alienæ materiæ commixtio, alimenti defectus (vt in bouilmo) dissipatio spirituum, (vt fit ex dolore, labore, vigiliis, gaudio) vel quia non mouentur, vel quia alterantur, vt à veneno. Graue ac perniciosum hoc symptoma facit, (nam longè extra naturæ limitem trahitur homo, nam cor affligitur) vt prolixius præterque meum morem in causarum eius vestigationem incumbam: quare iterum, bona venia, hoc ago. Syncope, vt antea demonstrauimus, nascitur ex dilata-tione vel constrictione præter naturam ductum cordis. Hoc autem fit ex spirituum vitio. Spiritus autem vitales vitium agnoscunt in motu, vel quod illis remisceatur quid vade contaminetur. Si motu in vitio sunt, id erit ex vitio interno vel externo. ex interno vitio, vt ex dolore. Dolebit autem pars quæ prope abest à corde, vt os ventriculi: vel quæ longius à corde recessit. Si non

processit longè à corde pars dolori implecti, ex cordis constrictione syncope erit: si pars doluerit longè à corde posita, erit syncope à resolutione. Externæ causæ sunt, vigiliæ, gaudium effusum, quale, Sophocli & Dyonytio euenit, & Diagonæ: & etiam tristitia. Si quid remixtum fuerit spiritibus vnde illi saniscunt, illud hærebit vel in eorū substantia, vel erit ex eorum qualitate vel copia. Substantia eorum vitium habet ex nimia crassitie, ad eam se se expandere nequeant, sed stipant aditus & exitus, & vna quasi in sede sese colligunt: vel nimia tenuitate & raritate præditi, cuncta circa cor pandunt, vel raro in corpore exhauriuntur. Copia spirituum molesta est, quia circumfluunt vberius, vel quod nimis accisa sit eorum quantitas, copiosi nascuntur ex vberissimo sanguine: inopia verò illorum est ab exhaustu: vt ex vigiliis, validis animi commotionibus, ac ex corporis fatigatione nimia. Præuitas qualitatibus interdum iungitur spiritibus: & hinc cordis vasa subsidunt, hoc contagium vel foris infertur, aut intus gignitur. si intus, nascitur vel ex materia corpore concepta, vel ex solidis cordis particulis. Si non solum præua qualitas, sed materia illud vitium faciat, illa erit vel mole corporea prædita, vel tenuis & rapida. Crassamento corporeo illa prædita est, quæ in pestiferis sribus cordis succos fecda pernicie inquinat, vnde spiritus cordis premuntur. Vapida illa aura prodit à toto corpore vel à peculiari aliqua parte: à toto, vt in febribus mali moris: hoc est, cum putrida aora, non tantum veneno delibuta, in putredinem rapit cordis succos. A parte interdum surgit, vt ventriculo, hepate, vtero, liene, & à pede. Quod si à solida cordis parte ortum traxerit, id fiet, quod in eo fit conceptum vel eryspelas vel inflammatio. Inter externas causas est aer, pestilentibus miasmatis inquinatus, & cibi quidam, vt fungi venenati, & animalium & plantarum toxica. Acutissimum itaque hoc vitium est, & mali moris: nam vires promptissime deiciit. Constant autem vires in solidorum corporum substantia, temperamento, & spiritibus. Resolutio solidorum fit non nisi in longissimis morbis, extenuato iam corpore, vel per acutissimas febres quæ corpus liquant. temperies autem substantiæ mutatur, cum immodicè corpora calcant,

*Spiritus  
ex rebus  
sua corrumpuntur.*

lesunt, vel refrigerantur, aut madesunt, aut sicantur. spiritus alterantur ab aere vel ab humoribus: & ab his quæ venenum euaculantur: subitantiæ vel essentiam eorum corrumpunt affectiones & morus vehementes animi, corporisque labores immodici. Plerumque tamen evenit syncope à flatu qui cor distendit: argumento est incurtus subitarius, qui mox soluitur, aurium sibilus, palpitatio in aliqua parte; & virgines non menstruatæ, & ingrauidatæ feminae, istheci, splenici, melancholici hoc affectum maximè tentantur: quin & ea quæ recreant hos maximè talia sunt quæ flatus distolunt. Subscribere huic sententiæ videtur Aretæus; ubi ait, Huius morbi est tenoris naturæ destructio, auctore frigido & humido, quippe hoc oppressi inius & in cute frigescent, non solum: frigidum spirant. Et Oribasius scribit, ab humore frigido crudoque os ventriculi occupante syncopen nasci. Per febres autem ardenentes etiam evenit syncope, maximeque per paroxysmos, ut cum opprimitur in augmento calidum cordis, vel ubi in flatu paroxysmorum delirantes homines se iactant vehementius, id sanè evenit à vi ardoris, ut rectè scripsit Q. Horatianus, ubi ait, per Causos flammare interiora ardoris: ac iuuenibus dicit frequentem hanc esse passionem: ac sexio die febris Causi evenire, maximè, inquit, cum æstare calor incanduit. Doctissimus medicus Salius Dinerfus syncopes illius quam Hippocrates Libro quarto De morbis acutis describit, à conrescente sanguine huc non temerè rettulit: ut cuius sanguinis culpa spiritus vitalis auditu prohibetur à cerebro, obstructis carotidibus arteriis, ac venis iugularibus. nos eam Apoplexiæ ascriptimus. Vidi sanè coralli more in vasis concreuisse sanguinem in quodam cadauere, maximeque in sinistro sinu cordis ac in arteria aortæ: quod cadauer, ut causam moris videremus, à doctissimo meo collega D. D. P. Pawio anatomico exercitatissimo ac celeberrimo apertum fuit. Aretæus maximè illam syncopen describit quæ nascitur à valida causa febre, & vocat talem Syncopen tenoris naturæ destructionem. Et per illam vltiorum febrem in qua syncope hominem fatigat, quid miri evenire scribit Aretæus, propriæque syncopes à

corde profectæ signa ita recenset; sensus, in tali febre, aciem exactiorem habent, ut videant & exaudiant plus quàm antea, mente etiam sunt firmiore & animo puriore. Proinde non tantum præsentia declarant, verum etiam futura verissimè diuinatione prædicunt. Hæc à corde sunt (nō à stomacho, ut quidam putarunt,) ubi & anima & eius natura inhabitat, ad quod & virium ibi sitarum calamitas perit. Hæc etiam discretius idem auctor explicat capite quarto De causis acutorum morborum. Arteria, inquit Aretæus, in his tremula est; exiguis motibus & crebris: imò pulsus formicæ, extrema algent. flos faciei deformatur in colore, charactere & mole. sudor, inquit Q. Horatianus, viscosus & frigidus perseverat interemptis viribus: nam tempora, cervicæ, pectus gelido sudore madet. totum corpus friget, propterea quæ algere sudor, nam per frigidam cutem erumpit: ac eo sudore maximè tentatur caput, ob summam cognitionem quæ illi est cum capite. Acutius vocavit talem sudorem syncopitum. fit ille sudor resolvi facilius reteritricæ, quæ alimentarem succum præ imbecillitate continere nequit. Quare longè abicit hic sudor ab aliis sudoribus excrementitiis. A lipothymia abicit maiori vi: nā sudor algere magis in Syncopis: in Lipothymia enim reperit. obmutescit syncope prostratus: in lipothymia loquuntur, audient, vident, at omnia illa ægrè. Ab Apoplexia differt; nam in apoplexia pulsus non languet, nec ita pallore deformatur facies: imò sæpè rubent hi. Ut iam perniciosum malum averti possit, signis peculiaribus quælibet eius causa internoſci debet, quò aptè illa excindi possit. Quare cum ita prostratus homo iaceret, accuratè perpendimus num ab exhaustu vel ab oppresseione æger laboret. Causæ quæ ægro exhaustiæ plerumque aperte sunt, ut immoderata aliqua exercitio, dolor, motus, lætitia, incidia, vigilie, æstus. Si ab illis manifestæ causæ, id malum evenire putabimus ex succis corporis tenuioribus, & quia corpus raro retexturā in vitio est. quare perlustretur corporis ægri fabrica. si à raritate corporis nascatur syncope, facies cadauerosa aderit. Æstus & febris hominem soluit facili: propterea etiam Aretæus hoc malum causo potissimum ascriptum. Sed si à succorū co-

Murm.

Pag. 12.

Signa  
Differen-  
tiam.

Libro De  
morbo  
Capit.  
Caralli  
more con-  
glutiatum  
sanguis.

Siema.  
2. Lib.  
De caus.  
Act. 1.  
Pag. 11.

piz



pra opprimantur vires, pulsum maxima aderit inaequalitas, vel ab eorum cruditate frigidis succis languent aegri: his erūt pulsi parui, interdum vnus ictus in pulsu negligitur inter trigefimum & quadregesimum: & nausea & pallor corporis tunc aderunt. Si fuerit à crudis succis quibus opprimitur os ventriculi, his hypochondria flauibus suspensa videntur, ac totum corpus à flatu turget, non sine liuore. Si sit à prauis succis ac acerbis, sentient morde-ri sibi os ventris, eoque vellicari. Quare cum à ventriculo est, is sua mala aperiet. Si, inquit Aurelianus, deflectione fuerit stomachus affectus, humor sequitur salu-uarum, & humecta aquositas, & nausea vel vomitus liquidorum atque cibi, frigus etiam articulorum. initio enim nunc frigore nunc calore afficiuntur. In cardiacis verò nec dolor, neque post cibum graue-do, neque vomitus esse perspicitur, & torpor frigidus perseverat. Dehinc sudor aliquando cardiacis crassus excluditur, & ma-lè redolens, vt fanem simulet: his verò qui stomacho patiuntur, tenuis atque aquatus sudor inuenitur. Item animi defectio sto-macho patiente, magis accessione fit; car-diacis verò recedente. Scripsit Asclepiades, cardiacos atque eos qui stomachi im-becillitate laborant ita internosci, quòd in cardiacis omnibus pulsus sit parvissimus atque imbecillus, cordis verò saltus maior & vehemens, cum grauedine thoracis, at-que spiratione praefocabili. In his verò qui stomacho patiente deficiunt, validus in as-teris pulsus, saltus verò cordis imbecillus inuenitur. Rescè Paulus, calefactum cor, magnam & densam edit respirationem: at tandem refrigeratum, raram & paruam. Si status in causa fuerit, subito inuadet, ac illicò desinet: asthma tunc fatigabit, & mo-tus genarū tremulus aderit vel alia in par-te, sibilus aurium. Quales autem in corpo-re circumfluunt succi, crassi vel tenues, tales etiam spiritus. A praua febre etiam interdum contaminantur spiritus. Quod si quæ peruersa qualitas ex aliqua pecu-liar parte aspiretur spiritibus, id inde colli-ges, quòd diu ante ea pars negotium fecit aegro, vt videris à suppressis mensibus. ita ab hepate, liene, mezentorio, intestinis hoc euenire poterit. Iam vā *λεχθιστον συγχο-φικησάντων* dicimus, duplici à causa ple-

rumque nasci syncopen, scilicet à tenuibus succis, & à crassis. Tenues, acres & biliosi succi cum stomachum fatigant, trahunt vñà cor in synimoriam, nam dissipantur inde eius spiritus. Hi cadauerosam faciem pra se ferunt. Talis idea etiam euenit his, qui tenuibus succis cum sint praediti, rara corporis textura fruuntur: nam his euane-scunt faciliè spiritus ab inedia, vigiliis, la-bore, euacuatione, dolore. A crassis si fue-rit succis, totum corpus erudate turget, ac liuore deformatur, hypochondria sus-pensa videntur. Deprehensio oculis, iam ad Indicationes curatiuas deuenimus. Si vi doloris abripiantur spiritus, nascetur in-dicatio mitigandi dolorem. quod etiam narcoticis agemus ad tempus. Quod si à nimia animi vel corporis iactatione re-he-mentiùs spiritus moueantur, proferetur indicatio sistendi illos motus. Si verò à spirituum crassitie pronascatur syncope, hi & materia vnde surgunt erunt attenuan-di: sin tenuiora illa, ad crassamentū red-ucantur. Copia spirituum si in vitio fuerit, ad mediocritatem ea reuocetur. Qualitas si noxam intulerit spiritibus, ea tempe-ratur: quod si ea elui nequeat, excludatur. Pars si vitium fecerit, ab ea fiat auersio. Paroxysmo praesente oritur indicatio pro-hibendi spirituum euacuationem: quod fit aqua rosata inspersa. Deinde studendum vt spiritus incrementa ducat, & vt cor fir-metur, quod fit vino, ouis, aqua carnis. re-uellendi illic vapores ad peripheriam cor-poris, quod fit frictione, & sternutatione. Itaque prima hic indicatio est, vt aeger ex-citetur, & vt spirituum sistatur euacuatio, ac vt exhausti illi reuocentur. A paroxys-mo statim causa remotissima amouetur. Dolor spiritus si soluit, illicò mitigetur: de-in causa eius auferatur. si humor doloris causa sit, amouetur. Dolor placatur foris lenientium remediis: vt si pars dolens foueatur remediis repentibus à primo ca-loris gradu & laxantibus: vel etiam vitum stupefacientibus, si materia fuerit acris & æstuans. Torumque studium cò vitetur, vt, dum extra paroxysmum est, spiritus re-dintegrentur. Iam ad Praesagia abeamus. Praeclare admonet Aretæus, sedulo hic providentiæ operam nauandam: futura enim si prospexerimus pericula, ipsa anie-quam inuadant propulsabimus. Ex spiri-

Indica-  
tiones mo-  
ratum.

Progre-  
ssu.

tuum inopia oborta syncope longè est periculosior quàm ea quæ sit ex eorum copia: nam facilius est demere quid è corpore, quàm ei addere. A dolore illiaco oborta, est lethalis, ut etiam ea quæ euenit per febres malignas, nam ea syncope aboleri nequit dum febris illa viget. Syncope quæ propriè cardiaca dicitur, est lethalis stomachica verò est curabilis, vi si bile fangeretur, vel aurâ iniquâ feriat, vel prauo succo obfideatur, à iecoris magna inflammatione, est lethalis. Hoc dicere videtur Paulus, ubi ait, Si fortis fuerit, auxilium non admittit: si verò vires aliquo adhuc modo consistant, aliquando auxilium sentit. A nimio feruore in causis, inquit idem author, obnascitur, quod cor primaria laboret inflammatione vel eysipelate, etiam mortem adfert. Si ob tenues humores, inquit Oribasius, in syncopen abripiantur, & si his iecur vel ventriculus inflammetur fractis iam viribus, leuari non poterunt. Si caput in humeros vel thoracem delabatur, pulsus & respiratio abolitis, liuida vel viridi facie, nec à remediis sternuret, mors adest. Quæ consecutaria est nausæ, tussior est, nam à stomacho est. Sed si sine hac à cordis palpitatione incidit, periculi plena est: hæc enim à corde est. Non illico salutem nunciabis eum quis à syncope sibi redidit, nam si pulsus non redit nec color viuus, & si algiosus æger semper permanferit, illico relabuntur. Si ær quem expirant frigidus fuerit, est calamitosum. Aër quem spirando trahimus cor ingreditur: quare venenosa aura calamitosam præbet syncopen solet. Quæ est à vulnerato corde, lethalis: vnde Ouidius,

*Afferat ipse licet sacras Epidaurius herbas,  
Sanabit nullâ vulnera cordis opa.*

Iam de curatione agam. Si iam iam inuasura sit, amoue eas causas quæ succundæ in Syncopen sunt: ut si æstus fatigat, refocilletur: si haimorrhagia affligit, sistatur. Sin in paroxysmis febrium labitur in syncopem ob corporis tenuiorem texturâ, antequam paroxysmus inuadat nutriatur. ita etiam transigendum in his qui illico recidunt cum iam iam coasere: his detur nouus aër, cibis offeratur, & auerte per frictions, vincula, & per cucurbitulas.

Tempore paroxysmi aspergantur aqua rosarum frigida, cum pauco vino odori-

fero, & caryophyllis, fantalis, cum granis 4. caphuræ. nisi malum sit ab alui erupione, vel à frigore. & partes extremas his foue. Si fuerit ab exhaustu spirituum, præbebis acerositatem eiccori, cum aqua rosata vel acetosâ, cum grano musci: & abstineat à frictionibus & vinculis, det se ocio, & propina illi vinum, ac grati odores adserât. Accipe aquæ carnis viciam: miux cydoniorum malorum viciam: musci grana duo: nisi fuerit præfocacioni ab vtero obnoxia. Cum prostiatus iacer, clama, concute, frica faciem, tempora, annularem digitum, & pedes, ac sale madente à vino frica pedes, aperi os, ac saltem illi inde. Cordi admove odorifera & naribus, modò non sit hysterica. sternuat. lingua fricetur theriacâ, lupini iaceant. auribus infusurâ quædam murmura, & frica aures. Excitati odorantur maluatium, acetum, micam panis tostam, ex vino vel aceto cum caryophyllis, & frica ventrem manu inuncta oleo macis, nam ita spiritus in corde collectos reuocabis, maxime si à ventre origo sit syncopes. sternutatio promoueat, naribus indito pulvere nigellæ & pauco acoro. Sudor nimis per cauum si fluat, foue faciem aqua myrti cum vino stipitico: & corpus frica leuiter oleo rosato cum pulvere rosarum & menthe. Detur decoctum pulli cui basilicum incoxit, id enim maxime probatur: adde quid vini, & parum croci & ambrae. Sed est hæc vena pertundenda in syncope? Sanè si analogia esse debet inter morbos & remedia, hic profectò valido remedio vtendum. Sed Thales. cautione opus est ea, vt adsint coindicantia, vt ætas & virium robur. Si enim ab exhaustu laborat æger ex syncope, à phlebotomia vtendum erit. Phlebotomia, inquit Aurelianus, nihil à iugulatione differt: quippe cum hæc faciat, quæ ipsa nittitur passio, mentem disicere & corpus in mortem per sudores soluere, ac ad cor affectum sanguinem reuocare, atque casum virium augere. Quare existimo doctum Medicum non debere collinere ad fractas vires, sed ad causam fractarum virium. Propterea doctissimus Aræteus inquit, nisi fractus fuerit pulsus, frigusque extremas partes occupauit, aut cause nisi aliquæ corpus exhaustere, vt vigilia, motiores, aut sensibus compertæ euacuationes, aut ha-

*Galenus  
s. loc.  
aff. 2.*

*Curatio.*

*Tempore  
paroxysmi  
quid  
agendum.*

*Aræti  
iam a  
syncope.*

*Thales.  
10ma.*

*Aræti  
18.*

buros, ætas, anni tempus, hominis timiditas impediunt, vena cædenda est. Loquitur ibi Aretæus de ea Syncope cui iungitur Causus: quod si, inquit, multa prohibeant, vt poteliqua aspera & sicca, & nigra, in omnibus facultas perpendenda est: nisi prius morbo, inedia, laboribus labefacta sit; nam & defectu & strangulato etiã prosteritur. At vbi præ multitudine Syncope fit, ac inflammatio aliqua ingignis fuerit in præcordiis autiecoie, nequaquã procraftinare expedit. Etenim quamuis euanidi sint spiritus, modò solidæ partes valeant, vires constare poterunt. Quare in Athletarum habilitissima cõstitutione, actu existente in syncope vena erit secanda: etenim solida membra sunt infracta, quamuis spiritus sint labefacti. Propterea Auicenna dicebat, Si fuerit à sanguine, proderit phlebotomia. Attamen non plena manu hauriendus hic sanguis, nam cor spiritusque laborant. Subita & copiosa euacuatio, inquit Aretæus, naturam vitiat: nã vel minimus error in syncope ad perniciem ducit, & protinus, dicit, alimentum detur, nam natura priorem repulsa, & nouorum adiectione lætatur. At quænam vena erit ferenda? Feriatur, inquit Aretæus, vena cubiti, eaque dextri vel sinistri lateris, hoc est, eius lateris quod sæpius in quiescã venit. At quando est vena pertundenda? iam tum cum syncope affligit. etenim tunc id nostro calori euenit quod igni, cui si imponantur copiosa ligna viridia, proculdubiois extinguetur ex lignorum copia: quam nisi abieceris, suffocatur: ita initio suffocationis caloris vena erit pertundenda, nec cunctandum dum suffocatio fiat.

In crudi-  
tate nam  
vena se-  
canda:

Quod si syncope, inquit Oribasius, ex copia crudorum succorum circum præcordia stabulantiu enata fuerit, sanguis emitti non debet, sed sola frictione contenti sint: quæ fiat à cruribus & brachiis, tandemque tota spina fricetur: id fiat toto die. Nam vacuatione quadam opus est, & nec phlebotomia nec pharmacia ferunt. deinde incalcescentibus artubus à frictione, oleo laxante iunge, & hyeme oleo chamæmelino. Et quia succus is plerumque crassus est, attenuantibus viatur, vt thymo, origano, hyssopo. Sed cur Galenus in syncope ab exhaustu vitur vinculis ac frictionibus? Id agit non ratione talis syncopes,

sed eius causæ, hoc est inopportuna euacuatio, vt eam sistat. & propterea hæc admouet oppositi patibus. Rusticus quidam Patauii supinabar ægrum ex colico dolore in syncope prostratum, & digitum minimum immittēbat eius vmbilico, ac volebat bis aut ter ægrum, quod digitus penitus inuaderet vmbilicalem foliam, mox magna vi digitum extrahebat, ita vt plurimus aer vnã elideretur: atque ita ille ægros subito reuocabat. In pharmacia hic prudenter transigendum: nam, auctore Aureliano, perniciosissimum est in cardiacis, fastidio præsentē, ventris fluorem etiã clystere commouere. Pro cautione, ne incidat in syncope, si materia fluuat in ventriculo, vomat. imò etiã premente iam syncope id agendum cum ventriculus impletus est. Propina cereuisiam tepidam cum oxymelite & succo raphani, si materia sit lenta. A butyro & oleo abstinere, premente adhuc syncope: nam loquor de ventriculo pituita obfesso, cuius robur illa laxarent ac prosternerent. Sin acris tenuisque materia ventriculum fatigat, accipimus decoctum tamarindorum cum manna & situpo rosato laxatiuum: nam ita vnã robori studebis ventriculi, & pugnabis cum materia morifica. Mel meicurialium confert vbi pituita ventriculum occupat. Sed cautio adit, ne hæc propinentur dum syncope in procinctu est, sed antè: alioqui pressio à materię copia ventriculo, afflictio accederet ab adiecto remedio. Alia ratio est vomitorii, nam pluma oxymelite delibuta faciliè promouetur, ac citò suam histotiam agendi absoluit. Leuibus potiùs clysmis vel supposititijs vendidit adu premente syncope. Clysmis iunge vncias 4. vini maluatici, quod fortè est veterum Arusi- num vinum. Attamen si omnia euacuatio- ne illata est syncope, quiescat, ac faciem vino irroret. Præparantia remedia in præseruatione locum tantum habent. In causa calida viemur sirupo ex citre malis, ex succo granatorum, de ponir, oxyfacccharo, sirupo de succo acetosæ, de limonibus, de persicis. valdè commendatur citoniorum malorum sirupus, vt etiam limonum, violarum, rosarum, codiuræ: cum aqua buglossæ, violarum, cardui benedicti, acetosæ, nec non rosarum, nymphae, de myrto. Vel horum siruporum detur interdum co-

Histerio.

Pharma-  
cia.  
a. acut. 19

Lenitiua.

Cautio.

Prepa-  
rantia.

A calida  
causa.

Pulvis.

chlear sine aqua, nā eam labefactatus ventriculus non bene fert. Quin pulvis etiam præsenbi potest. Accipe feminis & corticis mali citrii, feminis acetosæ, singulorū scriptulos duos: rasuræ eboris, margaritarum splendidarum, cuiusq. semidrachmā: vnicorū grana octo; fragmentorū saphyri & smaragdi, cuiusque semiscriptulum: fiat pulvis subtilis; conserue rosarū semunciā: detur per intervalla cum sirupo de acedine citreorū: vel da cum ex vino in quo surum extinctum est. Accipe succi acetosæ, de cerasis rubris, pomorum odoniferorū, boraginis, endiuicæ, citriorum, limonū, singulorum vncias tres vel quatuor: cum saccharo violaceo, rosaceo, vel penidiato fiat sirupus. Vel ad pondus omnium iam dictorū succorum adde aquā rosarū: detur hic sirupus per intervalla. Ribes etiam est utilis, & rubi Idææ conserua, & diaberberis. In causa frigida vitmur melle Hispano, cum caryophyllis, cinnamomo, & granis paradisi, etiam præscribimus sirupum de hyssopo, de calamintha, de corticibus citreorū: tum aqua mellisæ, cardiacæ, boraginis, calendulæ. Pulvis etiam his præscribi potest. Accipe cinnamomi scriptulum: nucis moscatæ, cardamomi, corticis citreorum, granorum paradisi: singulorum grana octo: remisce duplicem partem sacchari: vel fiant ex co trochisci pondere drachmæ vnius: da drachmā ex vino. Præparata materia pharmaco excludatur tempore provisionis. Attamen cautē hic agendum: vbi enim à crudis circa os ventriculi succis nascitur febris & syncopē, nō erit purgandum: sed leni clysteri, si mediocres vires, alvus ducatur. Præterea sola mulla vranitur cum hyssopo, idque triduo, & deinde fricentur. Si alvus ex præcipit in fluxum, sit mulla magis cocta, vel detur pisanæ cremor. Si, inquit Aërius, ob tenues humores laborant, sensim euacuati debent: nam validam non ferunt euacuationem. Quare purgatio hic quidem utilis est & necessaria fore, sed viriū infirmitas hanc nō admittit. Et pharmaca redolent aliquid virulenti, vnde viscera ac spiritus affligūt, attamen socidis abductis succis, spiritus splendidiorez euadunt. Quare hic laudo vt extracto vramur rhabarbari, epithymi, agarici, myrobalanorū. Accipe Rhabarbari optimi drachmas duas: agarici recenter trochiscati

In causa frigida.

Purgantia.

ex Oris.

4. Actus.  
11.

drachmā: vel Epithymū aut senā, si melancholia in vitio fuerit; insunde hęc in vino albo & aqua boraginis, (in parua copia capiatur aqua,) adde cinnamomi scriptulū, & zingiberis semiscriptulū: macera tota nocte: & manē ebulliat, & fiat sortis expressio: & in hac expressione solue mānā electæ semunciā: callix recēte extracta vnciā: sirupi rosati laxativi vncias tres. Sumat alternis diebus cochlearia duo, ante cibū per horā. Si nihil effecerit, adde loco stimuli drachmam electari de succo rosarū singulis viciibus. Tamarindi & pilulæ alephanginx etia vitiles sunt. Si in purgationē vel sicco à purgatione irruat syncopē, accipies theriacæ optimæ scriptulos duos: philonij Romani grana octo: aquæ cinnamomi semunciā: aquæ cardui benedicti vncias duas: calidē bibat. Vel accipiat terræ sigillatæ drachmā ex vino, & micā panis ex vino sumat. Cor roborantia remedia sunt ea quæ spiritus re-  
creant ac nutriunt, vt vinū & oua, vel quæ illustant spiritus, vt margaritæ: nā Auenzoar primā laudem ascribit margaritis, vbi ab acris succis fatigatur stomachus, vel quæ cogunt ita spiritus ne euanescant, vt carabe, terra sigillata, corallū: vel quia cordi orificioque ventriculi suavia sunt, qualia sunt aromata dulcia: vel quia temperie sua blandiūtur, vt borago, aurum: aut abstergent à spiritibus & sanguine melancholiam, vt myrobalani, melissa: vel proprietate robur addunt cordi, vt hyacinthus, femina citrii, buglossa, calendula. Hęc omnia aliena sunt à summo calore & frigore. propterea vbi refrigerari remediis cor debet, remisce semper aliquid aromatis: nam frigida claudūt vias, & tutez sunt spiritui calidoque nativo. Inter cardiaca hęc sunt, tormentilla, pentaphyllum, didamnus, carduus benedictus, angelica, myrtus, stœchas, maiorana, pimpinella, aromata, zedoaria, cortices citriorum, muscus, ambrā, mace, saccharum, mel, vinum. Acetosæ, rosa, ribes, caphura, acetum, santala, nympha. Conserua boraginis, & rosarum, electarium de gemmis, diambra, diamoscum, electarium de pomis Mesues, aromaticum muscatum Mesues, pleres archon Nicolai, confectio Xyloalocis Mesues, diarrhodon Nicolai, lœtificans Mesues, electarium de citreo, oleum basilici, persica condita, the-  
riaca,

riaca, potio muscata Nicolai. mithridati-  
am, Meobani pulvis, confectio acetosæ,  
poma condita, sirupus de pomis & de pru-  
nis, conferva vuarum, rob de citonius &  
de pyris, trochiscus de ligno aloës. Oleum  
cinnamomi. Conferva violarum, iulep ro-  
satum cum speciebus trium santalorum.  
Vbi vires flaccescunt cum febre, Accipe  
hordei exorticati pugillos duos: coque ex  
aqua: & primæ ebullitionis aquam abice,  
& affunde aliam tepentem: coque dum  
hordeum carpat. colaturæ libræ vii infun-  
de melissæ, calendulæ, pimpinellæ, aceto-  
sæ, endiuivæ, singulorum semimanipulum:  
macerentur calidè horas sex: colaturæ ad-  
de succi de ribes uncias duas: sirupi de aced-  
dine citreorum fescunciâ: cinnamomi se-  
munciam: macera: ac dein traice per ma-  
nicam albam: vt fiat claretum: adde sac-  
chari perlati uncias duas, vtatur pro potu:  
adice ad penetrationè quid spiritus vitrio-  
li. Si non astitit febris, Accipe vini libram:  
huic immitte uncias tres panis recentis &  
assati: colaturæ adde cinnamomi drach-  
mas duas: postea adice libram aquæ: sac-  
chari uncias tres: coque, & in fine adde  
rosarum rubrarum pugillos duos: colatu-  
ram eius misce cum præscripto vino, & di-  
stilletur per manicâ albam. Aquæ linguæ  
cervinæ immacrata ocimum & melissam,  
cum summiratibus calendulæ: dosibus sin-  
gulis colatis adde croci grana quattuor, &  
ambre granum vnum. Accipe mithridatii  
scriptulos duos: theriacæ scriptulū vnū: si-  
rupi de corticibus citreorum semunciam:  
aquæ melissæ, cardui benedicti, angelicæ,  
cuiusq. unciam vnâ: fiat haustus. detur  
manè. Hoc medicamentum à purgatione  
detur: valet etiam plurimum in venci su-  
spicione. Immacera vino tenui summitates  
calendulæ & melissæ, cum flauedine  
citreorum: adde granum croci & musci.  
Acetpe specierum diarrhodonis abbas, con-  
fectio nis alkermes, aromatici rosati,  
singulorum semidrachmam: macis, cinna-  
momi, cuiusque semiscriptulum: conferuæ  
violatæ drachmas tres: sacchari in aqua  
cinnamomi dissoluti uncias quattuor: fiat  
confectio in tabulis: sumat manè semun-  
ciam. Theriaca confert omni Syncopi: at-  
amen si ea nara fuerit calore, non exhi-  
benda, ni accesserit frigidorum remediōrū  
miscella: nā temperie prædita cuncta amat

hoc genus mali. Si Syncope sit à spirituum  
evanida vi, Accipe succorum densatorum  
rosarum rubrarum, acetosæ, & radicū pen-  
taphylli, cuiusque semunciam: caphuræ  
scriptulum: feminis acetosæ & citreorum  
cuiusque semiscriptulum: conferuæ rosa-  
rum & acetosæ singularum vnciam: cum  
sirupo de granatis hac electarium: detur ad  
semunciam essentia asphyri, cum iula-  
pio violato & vino. Os ex corde cerui cal-  
cinetur, & extrahatur eius essentia cū aqua  
vitæ, citra calcinationem ita etiam extra-  
hitur potissimū robur ex cornu cerui, mo-  
nocerotis, ex musco & croco. Si ob igneas  
inflammationes in syncopen trahatur, vi-  
de quo modo haberi debeant apud Alexan-  
dram libri duodecimi Capite tertio. Si di-  
cit Auicenna in libro De viribus cordis,  
imbecillitas cordis ortum ducit ex aquosis  
succis, propinabimus vrinaria & sudorifi-  
ca remedia: at si ex succis crassius, abstinen-  
dum: nam ab horum usu magis crassescen-  
tent. Foris etiam imponenda sunt peccori  
remedia sub sinistra mamma, nam ibi est  
locus cordis. Sed audi quid cautionis in his  
notet Aëtius, In crudorum & crassorum  
succorum copia, ait, nec cataplasmata nec  
persusiones admovebimus, donec multi-  
tudo euacuetur partim, & partim conco-  
quatur. qui enim hæc in talibus affectibus  
adhibent, ipsi, inflammationes, per ea quæ  
faciunt efficiūt, non animaduertentes præ-  
cordia inde lædi. Sed in crudis succis frice-  
tur corpus oleo chamæmelino, vel anethi-  
no. In tenuibus succis illinatur corpus oleo  
myrrino, rosaceo, vel cidoniorum malorū,  
& his pulvis rosarum inspergatur. A nimio  
sudore si soluantur vires, frigida admove  
membris externis, ac epithemata frigida  
cordis regioni applica: ex aqua rosata &  
nymphææ, fanialis, aceto, aqua acetosæ,  
scabiosæ, speciebus diamaragati frigidi,  
trochiscis de caphura. Accipe olei citonio-  
rum vnciam vnâ, caphuræ grana duo:  
unge pectus. ita vitrum vnguento & oleo  
rosato, & myrti. Calida quæ hic foris cō-  
modè admoventur, hæc sunt: oleum cin-  
namomi & caryophyllorum, Crocum,  
muscus. Accipe caryophyllorum, cinna-  
momi, cuiusque scriptulos duos: corticum  
citreorum, ligni aloës, singulorum drach-  
mam: rosarum rubrarum pugillum: spe-  
cierum trium santalorum drachmam: cro-  
ci,

Cum fr-  
bre.

A semu-  
tatis sibi  
ritum ac  
corpora  
tara à  
tenuia.

Cum in-  
flamma-  
tione.

Pagina  
3. 6. D.

Centia.

Foris.

ci, musci, singulorum grana tria: vini odor-  
is vncias sex: aque mellissæ, cardui bene-  
dicti, maioranæ, buglossæ, cuiusque va-  
rias quatuor: misce, fiat maceratio horis  
duodecim: fiat expressio: & materia quæ  
expressa est in facculum consocietur, qui  
madescat ab infuso calido: & tepidè cordis  
regioni imponatur. Fiant sacculi ex flori-  
bus nymphææ, boraginis, rosiferini, ro-  
sarum, melissæ, serpilli, fantalis, corallo,  
musci granis, & vino generoso irrorentur.  
Accipe micam panis retortidam: hanc ma-  
cera in vino maluitico; adde pulverem  
caryophyllorum, cinnamomi, granorum  
paradisi, mentæ siccæ: fiat cataplasma,  
quod admoue pulsibus manuum, & hy-  
pochondrio. In vitus ratione aëri prima  
ca debetur, ob spiritus, qui languent in  
hoc affectu. Si ob tenues humores in Syn-  
copen cadunt, vel à dissipatis spiritibus, cu-  
tem stringere oportet: sit aër itaque frigi-  
dus: olfaciat acetum cum aqua rosata, &  
pectus à vestibus liberum sit, admoue na-  
ribus rosas conspersas aceto: & miuam ci-  
toniorum malorum solutam vino rubro,  
ori instilla. In hoc malo premente semper  
debet capari aër frigidus, non aliter ac in  
asthmate, quò pressum æstu cor retractur:  
sed dum non viget paroxysmus, medio-  
cri temperie præditus aër eligendus venit.  
Odoretur aquam laucundæ, olfaciat to-  
stum panem, madentem ex vino aromati-  
co cum caryophyllis: si caler, adde acetum,  
fantala, capthuram: nisi hysterica fuerit  
mulier. Cum à dissipatis spiritibus nasci-  
tur syncope, ea quæ coeuvocant sint strin-  
gendi: quadam potentia prædita, ut myr-  
rus, cidonia mala, rosæ. Si sit à crudorum  
humorum copia, abstinere à cibo, meli-  
crato victit: cum origano vel pulegio,  
hyssopo, cinnamomo: id agant ad quartum  
vique diem, si pulsus ex lege naturæ  
feratur, at in paroxysmo vitatur vino cum  
calida aqua hyeme: ratione symptomatis  
id permittit. Deinde fumat ius puli costi  
cum cicicibus, hinc vitellos ouorum, dein  
alas auim. Si cruditas sit ex talibus succis  
qui in alimentum verti possunt, tenuissi-  
mè habeantur ægri, & frictionibus indul-  
geant. Atque ex tenuibus humoribus in  
syncopen abipiuntur, maximè sunt nu-  
triendi, inquit Oribasius: tunc vsui sunt fru-  
ctus adstringentes, pyra, poma, pistachia,  
qua cum vino, crebretur porci. Si adit ca-

cochymia quæ non ita reuocari in nutri-  
catum potest, exhibeatur panis ex vino;  
nam si ab exhausto spirituum laboratur,  
potius potandum vinum esset, quàm alen-  
dus cibo: nã potu facilius reficimur quàm  
cibo. Et etiam in cacochymia ex crudis  
succis ac crassis, si neque ventriculus neq-  
uecur, inquit Oribasius, inflammatione oc-  
cupentur, (nam si in tali cruditate infla-  
mmatio incidit, desperatus æger erit) tunc  
enim loco mulsæ oxymel commendatur,  
panis, inquam, vino tinctus facilius nutri-  
catum promouebit: nam agitantur illi  
succis ex mero vino: igitur hi pro condi-  
mento habeant vinum. In causa calida de-  
tur restaurans succus cum succo granato-  
rum, vel citriorum, vel cum aqua rosarum:  
vel ius puli cum agresta, & poma odora-  
ta. In frigida causa vinum conficit, sed non  
ita detur ut unico impetu cor feriat. Sed di-  
ces, Galenus tamen in Methodo mendedi  
asserit cunctis à syncope laborantibus vinū  
tenue, flauum & calidum esse propinan-  
dum: cum tamen libro ad Glauconem, in-  
terdum excludat vsum vini: rursus modò  
tenue vinum & aquosum, modò crassum  
commendat. Auenenna propinat vinū cras-  
sum & nigrum, austerum: nam Galenus  
talibus fructibus iubet indulgere eos. Paul-  
lus tamè vino oligophoro vitur. Respon-  
deo, cunctos hos non malè id præscribere,  
modò loco & iure præscribantur singula.  
Etenim interdum solius symptomatis ra-  
tione propinamus vinū tenue & calidum:  
ut cum iam actu hominem desitit synco-  
pe: aliter transigendum dum ea abest, cum  
scilicet cum causa morbifica pugnamus.  
Ita ubi haimorrhagia syncopen adferet, vi-  
num crassum & austerum tunc præscribit  
Galenus: at in paroxysmo, tenui ac calido  
vitur. Vinum enim, inquit Aræteus, natu-  
ræ incrementum adfert, ubi inflammatio  
abest; nam in hac dolores auget. nec  
in plethora vinum est propinandum. Si fe-  
bris adit cum cacochymia, præstat mulla  
vino. Si copiosi & crudi ad sint succi, ni vi-  
res fatiscant, mulla videntur, alioqui fe-  
brem adferet vinum, abreptis illis succis per  
venarum spacia, vnde infarctus. Quare ca-  
ue ne dum crudis succis confusus ac synco-  
pi dum studes, topi corpori nocas. Hinc est  
quòd Galenus vinum pani indat, nam ita  
nec viscera ferit, nec fundit cruda. Si febris  
adit, nec valida fuerit syncope, à vino ab-

Vini vsus  
in synco-  
pe.

Dulcorum.

Diala.

Cibum.

stineat. da iuscula cum succo malorum puniceorum. Si valida iam iam inuafura est syncope, cum febre, propine vinum oligophorum pane exceptum. Si febris abfit, & a ventriculi languore si proficitur syncope, da vinum tenue & calidum, quod pervadat tunicas ventriculi. si sit ab haimorrhagia, da vinum austerum. Si a sudore, da vinum actu frigidum aqua dilutum: ita inhibebis vna sudorem. Si squalet admodum præ æstu corpus, cum iusculo puli cocto cum hordeo præbe vinum, vel cum cerevisia & pane misce vinum. Si laborat corpus ab exhaustu a vacuatione, dabis vinum tenuissimum, vel hippocraticū, aut aquam cinnamomi, cum scilicet iam actu syncope affligit, nam celeri refecione tunc opus est. Sed si ex his causis imminet syncope, dabis austerum crassumq. vinū, sique id frigidum actus: hoc enim euseuationem (vt dixi) sistit. Quare in omni syncope, ubi febris magna non adest, est exhibendum vinum. nec merum deur ubi cruditatibus plena sunt omnia: nec per inedia turd illud exhibeas consulsioni aut cephalalgia obnoxiiis. Plerumque sit vinum medicore, aromaticū; detur cum iure restaurante, si sit ab inanitione. Si æstuat corpus, temperetur cum aqua rosata. Si stomachica sit syncope, misce miuam cydoniorum. Utatur viellis odororum ex iusculis & agresta, vel succo granatorum vel aranciorum. dein alis auium. Quibus a cruditatibus syncope, non permittendum, inquit Orisbasius, vt largē bibant: sed primis tribus diebus mulsā sint contenti: ab aqua abstineant: vesperi, inquit Aëtius, illis detur vinum, non manē. iuuenibus tamen, ait, nō ilico ineunte morbo vinū concedatur. Coque pullum dum despumatus sit: adice hordeum tunc deglutatum, eoque simul dum exoffetur serē: exime pullam, ac cum affuso pinguiore illo iusculo, abiecto hordeo, eoque: adice agrestam, vinum, maceem, cinnamomum, saccharum, aliquid croci. In corpore sit summa quies, & in animo hilaritas. Cum causus se iungit syncope, cumque iam ad vigorem morbi ventum est, inquit Aræteus, humiditas verō iam iugulum & frontem irrorat, extrema algent, & pulsus tribuat, tunc paulū quid alimentī triticeī sumendum, & vinum est gustandum, & caput & vesica præmunica-

da irrigationibus. Sed tamen vinum non pleno ore ingerendū ad saturationem. Nam quidam inopportune repleti, postea cibi & potus inappetentiā excelleret vitā, nam natura resolutur copiā. Vetustum & nouum vinum vitare iubet Aræteus. Si euenit syncope a morbo diuturno, eupeptis & euchymis vescatur. Vino collatus os. Auctor est Aræteus, si multus sudor emanat, & concidant arteriæ, vox acuta reddatur, & pectus calore destitatur, vinum vt potet liberaliter, in solo enim vino, refrigeratis, spes posita vitæ est. Id itaque modō cum cibo, modō sine cibo dabitur, ita lassitudo non obrepet: nam qui exiguis vires habent, post assumptum cibum valdē laborant. Quibus autem ob fluxum bilem, auctore Orisbasio, os ventriculi lædente, syncope incidit, vinum frigidum, tenue, antiquum illis offeratur. Sudores etiam coercendi, epithemate corpus refrigerante & astringente. Si febris adfit, refrigeretur cubiculum riuus obstreptentibus, foliis arborū ac heibarum refrigerantium. Mentis oblectatio adfit; nam illa animam fouet & naturam suscitāt viræque restituit. Leue sit operimentum, vt calor a pectore exhalat. Spongia ex frigida faciei admoueatur, quod curis rariis conspissetur. Calida cataplasmata pedibus admove, cum pipere & aceto. Balneum eius aduersissimum his qui ex cruditatibus circa præcordia conceptis in hæc mædia trahuntur, his bene crura, brachia, & spina fricatur, & ne lassitudo fatigaret, vngantur à frictione oleo chamæmelino, & anethino, nec vacuum tempus detur à frictione, nisi vt somno operam det, qui etiam non debet longior concedi. Si sit à veneno vel ab apostemate interno, parcius dormiant, nam nullus omnino à somno arceri debet. Per somnum semper adfians notet faciei colorem & charactere, anhelitum etiam obseruet & pulsus motū. quare nota nam per somnos potius obrepat syncope, an per vigilias. Si per somnum facies muneatur, anhelitus affligatur, pulsus flaccescat, excietur. Venereis animi deliquium & cordis dolorem vulgō vino curabant, vnde Iuuenalis,

*Calceatamq. tenet bulli socialibus vinum,  
Cardiaco cyathū non porreclurum amico.  
Sirupus ex aloë confert: hunc descripsimus  
Capite De palpitatione cordis. Bulli cala-*

*Empir.  
ca.*

mum aromaticum in aqua rosata : bibat. Accipe pimpinellæ, millefolij, betonicæ, cuiusque manipulum: bulli in vino ad tertiam partis consumptionem : utatur cyatho manè. Extunde succum ex citreis & persicis. Rubi idæi fructus conditi. frigidi vini haustus, si febris non obstat. ribes. Accipe margaritarum, coralli rubri, cuiusque scriptulum: lapidis bezoar semiscriptulū: auri folia numero duo folia : vnicornu tantundem: cum iulepo rosato fiat subtilis pulvis: sumat scriptulum cum aqua boraginis: adde parum conferuæ acetosæ. Accipe essentia margaritarum, semiscriptulū: sumat cum duobus cochlearibus aquæ boraginis, & semuncia sirupi citreorum: adde parum vini tenuis. Accum, vinum, & sal simul miscantur, & panno albo lanco pulvis manuum applicetur. Vel id fiat cum aqua rosata, cui parum caphuræ & croci immixtum sit. Accipe florum tilie & rosmarini aliquot manipulos, & summitates melissæ: testa excipe, & adspere vino: adde nucem moscatam & cinnamomū: macerentur octo diebus in furno calido: dein distilla in balneo: huic aquæ iniice flores laudulæ, & cinnamomum, & nucem myristicam, & caryophyllos: & digere. &

distilla. hac aqua asperge liposthymia prostratos, & ori eorum eam infunde. Accipe macis semuncia : cinnamomi, caryophyllorum, cuiusque unciam: rosarum pallidarū manipulos decem: vini maluatici quartarium unum: digere diebus quatuordecim: distilla in balneo rosas impleto: diuites adiciant drachmam musci. Coquatur ius restaurans cum floribus rosarum, boraginis, buglossæ, saluæ, rosmarini, betonicæ, violarum: adde cinnamomi, macis, caryophyllorum, cuiusque drachmas duas: nucis moscatæ semunciam: vel cocta hæc & contusa, distilla per balneum. Aquæ vitæ composita hic titulum habet: ego vnam describo, Accipe florum lilij conuallij manipulos quinque: vini maluatici libras tres, aquæ vitæ libram: per mensem digere: & distilla: huic tuoc liquori adde caryophyllorum drachmas duas: macis sesquidrachmā: piperis longi drachmas florum laudulæ manipulos duos: cinnamomi drachmas tres: seminis sceniculi drachmas sex: digerantur tribus septimanis in sole, ac distillentur tepidè, semicochlear datur etiam huius aquæ apoplectidis: & si quotidie duæ vel tres guttulæ tantum sumantur, præseruat hominem ab apoplexia.

## F I N I S.

## INDEX CAPITVM

## H V I V S L I B R I.

## CAPITE I. De Angina.

II. De Pleurisia.

III. De Empyemate.

IV. De Asthmate, hoc est, Anbelatione.

V. De Peripneumonia; que etiam Pneumonia appellatur: Latine Pulmonia, vel Inflammatio Pulmonum.

VI. De Eruptione sanguinis per os.

VII. De Phthisi, hoc est Tabe.

VIII. De Palpitatione cordis.

IX. De Syncope.

pag. I.

pag. 17, b.

pag. 48, b.

pag. 60, a.

pag. 74, b.

pag. 81, b.

pag. 97, a.

pag. 110, a.

pag. 137, a.



# INDEX in librum DE MORBIS PECTORIS.

Numerus, paginam: littera a primam columnam, b secundam designant.

**A.**  
**A**CTVORVM terminus, ex  
sensitua Hippocrati 17. b.  
Acutus in morbis ut numerandi  
dicit 51. b.  
Adarce quid 90. a.  
Angina l. exquisita Angina de-  
finitio 1. a. causa 1. b. quid  
Hippocrati Angina, & quo-  
suplex 2. a. notia angina 2. b.  
externa causa 2. b. differentia  
2. a. à loco affecto, 3. a. Aras  
angina mirabiliu, 3. a. rectio-  
ru inter angina species distin-  
ctio 3. b. Hippocrati distin-  
ctio, 4. a. differentia à causis  
efficientibus 4. b. & à motu  
4. b. signa 4. b. In qua parte  
stabuletur 4. b. signa causarum  
effluentium 5. b. indica-  
tiones curatiua 6. a. prognos-  
is 6. b. Tres angina species  
Hippocrati 7. b. non repellen-  
dum 8. a. curatio 9. b. phle-  
botomia 9. b. num ea in in-  
gravidatu etiam molienda  
10. a. quando vena secanda  
10. a. quo modo 10. a. qua vo-  
na 10. b. curabitur 11. a. extre-  
ma chirurgia 11. a. vincula  
venulifera 11. b. Pharmacia  
11. b. clyster 11. b. Topica  
in ero admonenda 12. a. in bi-  
liosa Angina remedia 12. a.  
13. a. in pestifera Angina 13. b.  
dolerem placantia 14. a. in  
summa angina 14. a. in  
angina à pituita medela 14. b.  
Topica in pituitosa angina  
15. a. suppuratoria 15. b. in  
fatu angina medela 15. b.  
angina scirrheos qua medi-  
camentis requirit 16. a. qua  
conueniens in pestifera 15. a.  
capitis admonenda in pituita

rheumate 16. a. curatio an-  
gina à melaucholia 16. a. em-  
pirica 16. a. diata 17. a. cibus  
17. a. potus 17. b.  
Anodynorum genera tria 16. b.  
Asthma, hoc est Anhalatio 60. a.  
nomen 60. a. definitio 60. a.  
CAUSA 61. a. SIGNA 61. b.  
nota differentiarum 61. a.  
differentia communes 61. a.  
INDICATIONES curatiua  
62. a. PROGNOSIS 63. b.  
CVRATIO 64. b. praeseruat-  
io 64. b. phlebotomia 64. b.  
cauteria 64. b. praeparantia  
vniuersalia 65. a. purgantia  
totum 65. b. vomitoria 66. b.  
particularia purgatio pectoris  
67. a. curatio in pueris 67. b.  
69. b. Diata 70. b. potus  
71. a. Motus & quies 71. a. In  
paroxysmo quo modo transi-  
gendum 71. b. empirica 72. b.  
**B.**  
Belladonna herba miram vim  
in parasitos habet. 3. a.  
**C.**  
**C**ALCVLI curatio 73. b.  
Carbunculi causa 12. b.  
Catarrhus phibisi se ingens.  
109. b.  
Citriorum vis 79. b.  
Clyster num nutrit. 103. a.  
Corroborantia 123. b.  
**D.**  
**D**IARRHOEA ut distin-  
guatur. 78. a.  
Dies numerandi in acutis 51. b.  
Dolor quid. 18. b.  
**E.**  
**E**MPYEMA 43. b. nomen 43. b.  
Definitio 43. b.  
CAUSA 43. b. differentia 49. b.  
SIGNA 50. a. Tempus  
ruptionis aliud quam vulgu

medicorum putat. 51. a. IN-  
DICATIONES curandi 53. a.  
PROGNOSIS 53. b. CVRATIO  
54. b. phlebotomia, 54. b. chi-  
rurgia 54. b. Pharmacia, 56. a.  
80. a. rumpentia suppurat-  
um 56. b. Expectorantia 56. b.  
TOPICA 58. a. CORRO-  
BORANTIA 59. a. Diata 59. a.  
EMPIRICA, 59. b.  
Empyemati nota 78. a. eius fu-  
sionis significatio 78. b.  
Erysipelatis causa 19. a.  
Erysipelas excellens remedium  
16. a. F.  
**F**AVCVM mirabilis mor-  
bus 17. b.  
Febris tabi se iungens. 109. b.  
Fluxus alui curatio. 109. b.  
Fotium vis praestans. 38. a.  
**G.**  
Galaetophia. 107. a.  
**H.**  
**H**AEMORRHAGIA quae be-  
na & qua mala 78. a.  
Herpetis causa 19. a.  
Historia 1. b. 5. b. 10. b. 11. a.  
61. a. 81. a. 98. a. 105. a. 111. a.  
123. b.  
**I.**  
**I**NFLAMMATIO duplex 19. a.  
Inflamatio quid, 19. a.  
I' d'quid? en quid. 1. b.  
**L.**  
**L**ACTIS natura 103. b.  
Labsperget & glutinas 103. b.  
causae in usu lactis 103. b.  
**M.**  
**M**ACILENTIA elegantia-  
medium 106. a.  
Maciei hostica remedia 108. a.  
Musculi Massoidei 4. a.  
**N.**  
**N**ARCOTICORVM vsus. 92. a.  
Nicotiana symptom. 68. b.  
**PAL-**

**P**ALPITATIO Cordis 110, *a.* nomen 110, *a.* definitio 110, *b.* causa 110, *b.* externa causa 111, *b.* Differentia 111, *b.* signa 111, *b.* Indicaciones curativa 111, *b.* Prognosis 112, *a.* Curatio 112, *a.* chirurgica & phlebotomia 113, *a.* cucurbita 112, *b.* pharmacia 113, *a.* roborantia 113, *b.* foris admo-  
nenda 115, *a.* episthemata 115, *a.* facculi 115, *a.* lini-  
menta 115, *b.* vermes 115, *b.* victus ratio 115, *b.* Air 116, *a.* cibum 116, *a.* potum 116, *a.* mo-  
tus 116, *a.* empirica remedia 116, *b.*

Paracentesis. 54, *b.*  
Pectoris usus 17, *b.*

Peripneumonia, seu Pneumonia:  
Latine pulmonia, vel In-  
flammati pulmonum 74, *b.*  
Definitio 74, *b.* locus affectus 75, *a.* causa 75, *a.* pueri cur  
nō tententur hoc morbo 75, *b.*  
Differentia 75, *b.* signa 76, *a.*  
Signa differentiarum 76, *b.*  
Indicaciones curative 76, *b.*  
Prognosis 77, *a.* Curatio 78, *b.*  
Num vena sit secunda 78, *b.*  
scopia emittendi sanguinis 79, *a.* cucurbita 79, *a.* preparati-  
o & aluiduca 79, *a.* curatio  
pisuitosa 79, *b.* biliosa 79, *b.*  
foris admoenda 80, *a.* robo-  
rancia 80, *a.* victus ratio 80, *a.* Empirica 81, *a.*

**P**htisis, hoc est tabes 97, *a.* cum  
definitio 97, *a.* causa 97, *b.* si-  
gna 98, *b.* 99, *b.* Indicaciones  
curativa 100, *a.* Prognosis 100, *b.* Curatio 102, *a.* chirurgica  
remedia 102, *b.* cucurbita 102, *b.* Causa 102, *b.* vesti-  
catoria 103, *a.* Pharmacia le-  
mians 103, *a.* Pharmacia pur-  
gans 103, *a.* preparatio  
quando hic lectum habeant 103, *b.* vlcus abstergentia &  
purgantia 103, *b.* siccantia  
vlcus, agglutinantia, & cal-  
lum inducentia 104, *b.* corro-

borantia 105, *a.* curatio  
anacephalops 105, *b.* victus  
ratio 106, *b.* in latum usu cau-  
tio, 107, *a.* Empirica 108, *a.*  
accidentia qua se phthisi iun-  
gunt 109, *b.* praeservatio 109, *b.*

Phthisicorum partu explorandi  
ratio 101, *b.*

Phthisici qui natura 95, *b.*

Pleuritis 17, *b.* quid 18, *a.* defini-  
tionis explicatio 18, *a.* patho-  
gnomonica signa vera 18, *a.*  
Pleuritis est cumulus morbo-  
rum 18, *a.* doloris pleuritidis  
species 18, *a.* sedes pleuritidis  
vera 18, *b.* veterum de loco  
pleuritidis sententia 18, *b.*  
causa 18, *b.* ut differat causa  
pleuritidis à Peripneumonia  
causa 19, *b.* causa Pleuritidis  
producentes 19, *b.* causa in flu-  
xum adducens sanguinem  
19, *b.* omnis pleuritis à san-  
guine 20, *a.* tria vasa qua ma-  
teriam pleuritidis transmi-  
tunt 20, *a.* Pestilens Pleuritis  
20, *b.* Differentia 20, *b.*  
à parte 20, *b.* à mediastino  
21, *a.* à causis efficientibus  
21, *a.* Pleuritis ex arteria 21, *a.*  
SIGNA quod sit, 21, *b.* num  
febrem sociam semper habeat  
21, *b.* SIGNA Differentiarum  
21, *b.* Notae causarum 21, *b.*  
A statu & casarbo Pleuritidis  
22, *a.*

Pleuritidis putredo 22, *a.* scir-  
rhus, 22, *a.* suppuratum 22, *a.*  
expuratum 22, *b.* Alia diffe-  
rentia 22, *b.* ut interstingua-  
tur ab aliis vicinis affectibus  
22, *b.* à Peripneumonia 22, *b.*  
à lecerio phlegmone 22, *b.* à  
Diaphragmatico phlegmone  
22, *b.* Falsa Pleuritis 23, *a.* in  
Pulmonem quod abeat 23, *a.*  
INDICATIONES curativae  
ibid. modum inveniendi consilia in  
Pleuritide 23, *a.* secundaria  
Pleuritis 24, *a.* PROGNOSIS  
24, *a.* Pleuritis terminatur  
quinque modis 24, *b.* diarrhoea  
supernequens 26, *b.* lotio indi-

catur pleuritidis. 26, *b.* expe-  
ctorandi tempus. 26, *b.* à qua  
humore sit orta pleuritis. 27, *a.*  
in peripneumoniā abeun-  
tis nota 27, *a.* PHLEROTO-  
MIA, & an vena scanda 28, *a.*  
in pestifera Pleuritide 28, *a.*  
copia educendi sanguinis 28, *b.*  
phlebotomia usus nū sem-  
per necessarius 29, *a.* tempus  
phlebotomiae 29, *a.* modus  
agendi in phlebotomia 29, *b.*  
qua vena scanda 29, *b.* num  
oppositi lateria vena scanda  
30, *a.* si à mensum sit sup-  
pressionē 30, *b.* cucurbita 31, *a.*  
emplastrum loco cucurbitae  
31, *b.* cautio in abidū 32, *a.*  
MEDICAMENTA ad causam  
antecedentem 32, *a.* leucentia  
32, *a.* preparatio 32, *a.* pe-  
stilens pleuritis. 33, *a.* pur-  
gantia, 33, *b.* lenia pharmacia  
34, *b.* mediocria pharmacia, in  
biliosa 35, *a.* in pituitosa 35, *a.*  
in principio pleuritidis alius  
fluxus 35, *a.* in Pleuritide  
syncope 35, *a.* Causa conti-  
nens 35, *a.* Topica 35, *b.* fotus  
35, *b.* in pituitosa pleuritide  
fotus ad Hippocratiū mensum  
37, *a.* in sanguinea aut à ca-  
sarbo orta Hippocraticum  
fomentum 37, *b.* fotum vi  
praestans 38, *a.* cautio in fotu  
usu 38, *a.* fotus duplex 38, *b.*  
varia fotus species 39, *a.* for-  
tius insignes 39, *b.* variorum  
fotuum & ilitium silua  
40, *a.* in notha pleuritide ve-  
medica 40, *b.* suppuratio 40, *b.*  
42, *a.* limētum 41, *a.* cautio 41, *a.*  
in biliosa materia, 41, *a.* in  
pituitosa pleuritide. 41, *b.* pre-  
stans remedium. 42, *a.* à me-  
lancholico sanguine 42, *a.* ob-  
servatio 42, *b.* optima quaedā  
remedia 43, *a.* ad statum. 43, *b.*  
cautio in phthisici 43, *b.*  
VICTUS ratio. 44, *a.* oxyme-  
lis dosis 45, *a.* alimentum &  
medicamentum ut in vlcum  
sic ducendū 45, *a.* potum 46, *b.*

*formae* 47. a. *EMPIRICA* 49. a.  
*Media* *stini* *inflammatio* 43. a.  
*Pulmo* *facile* *putrescit* 98. a.  
*Puru* *copia* *thorace* *concepi* *ut*  
*nosatur.* 10. a.  
*Puru* *&* *putulenta* *materia* *dis-*  
*crimen.* 48. b.  
*Puer* *merum* *unde.* 49. a.  
*Pus* *phthisicorum* *explorandi* *ra-*  
*tio.* 101. b.

R. *ANUNCULI* *radix* 113. a.  
*Respiratio* *in* *strumenta*  
17. b.  
*Respiratio* *qualis* *fit* *actio* 50. a.  
*cum* *causa* 60. b.  
*Respiratio* *difficilis* *quotuplex*  
61. b.  
*Roborantia* *cor* 113. b.

S. *SANGVINIS* *per os* *eruptio* 81. b.  
*definitio* 81. b. *causae* *in-*  
*terna* 81. a. *osterna* 81. b. *fi-*  
*gna* *differe* *ntiarum* 84. a.  
*Indicationes* *curatiua* 86. a.  
*Prognosis* 86. b. *Curatio* 88. a.  
*phlebotomia* 88. a. *pharma-*  
*cia* 89. a. *ob* *anastomosis* 89. a.  
*venericulo* 92. a. *rupto* *in*

*vas* *remedia* 89. b. *fi* *ab* *ero-*  
*sione* 90. b. *narcotica* 92. a. *in*  
*diapedesi* 92. b. *in* *omni* *eru-*  
*ptione* *sanguinis* 94. b. *robo-*  
*rancia* 92. b. *Topica* 91. a. *Alv-*  
*er* 93. b. *cium* 94. a. *potus* 94. b.  
*empirica* 91. a.  
*Sanguis* *conglaciatus* *more* *co-*  
*ralis* 119. a.  
*Sirupus* *Nicotiana* 62. b.  
*Spiritus* *à* *saxetibus* *corrumpun-*  
*tur* 118. a.  
*Sputum* *sanguinolentum* 109. b.  
*Suppuratum* *&* *expuratum,*  
50. a.  
*Synanche* *unde* *dicatur,* 1. a.  
*Syncope* 117. a. *nomen* *&* *morb-*  
*us* 117. a. *definitio* *&* *eius*  
*explicatio* 117. a. *causa* 117. b.  
*figura* 119. a. *mirum* *quid* *in*  
*ea* 119. b. *figura* *causarum* 119. b.  
*indicaciones* *curatiua* 120. b.  
*prognosis* 120. b. *curatio* 121. a.  
*tempore* *paroxysmi* *quid* *ag-*  
*dum* 121. a. *à* *syncope* *recre-*  
*si* *quomodo* *habendi* 121. b.  
*phlebotomia* 121. b. *cum* *copis*  
122. a. *quid* *facienda* 122. a.  
*pharmacia* *in* *syncope* 122. b.

*lenititia* *in* *syncope* 122. b. *pm-*  
*paratia* *à* *calida* *causa* 112. b.  
*in* *causa* *frigida* 123. a. *pur-*  
*gantia.* 123. a. *ex* *Oribasio*  
123. a. *ubi* *ures* *flacciscunt*  
*in* *syncope* *cum* *febre* 124. a.  
*à* *conuulato* *spirituum* 124. b.  
*à* *rara* *textura* *corporis* 124. b.  
*cum* *inflammatione* 124. b.  
*remedia* *foris* *admonenda* *in*  
*syncope* 124. b. *diata* *qualis*  
*prescribenda* *in* *syncope* 125. a.  
*vini* *usus* *in* *syncope* 125. b.  
*Remedia* *empirica* *in* *syncope*  
*curanda.* 126. b.

T. *TABES* *varia* *significatio*  
97. a.  
*Tabietres* *species.* 97. a.  
*Tabes* *hoc* *est* *phthisis* 97. a. *de-*  
*fnitio* 97. a.  
*Terra* *sigillata* *vis* 79. b.  
*Testudinum* *cavo* 108. a.  
*Tyrannis* *frequens* *malum.* 81. b.

V. *VULPIS* *pulmonis* *prepara-*  
*tio.* 104. a.

## I. HEVRNII TVMVLVS.

HIC SITVS EST VIR CELEBER.  
D. D. IOANNES HEVRNIUS, IN  
ACADEMIA LEIDENSI PRIMAR.  
MEDICIN. PROFESS. PER ANNOS XX.  
ET IN EADEM VI. RECTOR. MAGNIF.  
MAGNÆ PRVDENTIÆ: SVMMÆ IN  
DOCENDO ET SCRIBENDO VENVS-  
TATIS AC CELEBRITATIS. VITA  
LAUDAB. TRANSACTA OBIIT XI.  
AVG. AN. CIO. ID. CI. VIXIT AN. LVIII.

CL. V.

D. D. IOANNIS HEVRNII,

huius xui medicorum Principis,

EPITAPHIUM.

HEVRNIVS *bac molli requiescit IANVS in urna,*  
*Quo vino Medices gratia viua fuit.*

A L I V D.

HEVRNIVS *Hippocratis Genius hac conditur urna,*  
*Cui non inueniet terra Batana parem.*  
*Flete ô Peonides, & crines soluite Musa,*  
*Occidit, heu, vestri famam, Solq; chori.*

A L I V D.

HEVRNIVS *hic situs est, quem Gratia, Suada, Lepores*  
*Lugens, & laceris defset Hygeia comis.*

G. VIERDORFIVS MED. posuit.

---

IOANNIS POSTHII,

ARCHIATRI, cùm viueret, WIRZEBURGICI,

Elogium

D E

IOANNE HEVRNIO,

viro optimo & Medico celeberrimo.

Siluar. lib. II.

**I**LLVSTRAT *Medicam feliciter HEVRNIVS artem,*  
*Commodus & vinâ voce librisq; suis.*  
*Quin etiam reddat vitam morientibus agri,*  
*Mirificâ miscens pharmaca rara manu.*  
*Ergo virum presens celebratq; & suspicit atas,*  
*Postera sed facies Dis in honore parem.*

IN CLARISSIMI DOCTISSIMIQUE VIRI  
D. IOHANNIS HEVRNII

τῷ μακαρίτῳ

De Morbis pectoris

LIBRVM.

ΑΛΑΚΑΡ ἰόντα νέσσιο, τόσος πάλαι ἀμυγγάλυψι.  
Εὐρυιάδην κρυερῶν βῆ ἵμεν εἰς ἐτέρην.  
Βῆ ἵμεν, ἱμερόεν δ' ἐλίπει φάος ἡλίοιο  
Διοσῆ Α' ὀβλιωνος τὸ κλέϊ Εὐρυιάδης.  
Τῶν θανάτων ἀλκτῆρα τέλο· θανάσιο κάλυψε,  
Τὸν δ' Α' ἰδεῖν ἐχθρὸν κρύφατο νύξ Α' ἰδεῖν.  
Μὰ ψ δέ μιν δρυμέδοντις ἀνεκλάυσαντο Βαταυοί,  
Κλεποί ἀλισμαίων τέκτονες ἵπποσιμῶν.  
Ζεὺς δὲ πατὴρ ἐξέλασε νέσος πάλαι ἀνδράσιν ὄρτας,  
Ἀντὶ πυρὸς δεινῆ ἱαπεπονίδεα.  
Στυγὲ φλογερῇ κτυπίεσκε πιασομένη καταβάντων,  
Ταινάρη ἀρχαῖες ὄχθαι ἀναξόμοιοι.  
Κλώθις ἀπορρήνυτο, καὶ ἐκ εἰδωλα καμώντων  
Πορθμῖα δειλαίων ἐξέλιπον νικύων.  
Ἀλλὰ μάτην τὰδε πάντα μάττω δολύχεις Α' ἰδωνοὺς,  
Μοιρεδίη δὲ πάλαι ἥρπασέ τιν παλαίω.  
Ὡ πόποι, ὦ μέγα θαῦμα, νέκυς ζωῶσιν ἀρήγει,  
Νέσῳ ἀλῶς, νέσος στυγ' ἀλεξιμέναι.  
Νεκρὸς ἰὼν, μετέπασσι κακὰς δ' ὀπὶ κῆρας ἀλάλχει,  
Νεκρὸς ἰὼν, κλεσθὲς ζῆ πάλην Εὐρυιάδης.  
Νυκτὶ δὲ περὶ φθιμένοισι μέγ' ὀχρεῶν ἀλάλη),  
Καὶ ἱερῶν νέσος ἀμφιπολεῖ μακάρεσσιν.  
Ἀσφοδελὸν λειμῶνα, καὶ ἔχματα πείεστα γαίης,  
Καὶ κλυτὸν ἥρων ναιετάων πεδίον.  
Ἢ χ Διὶ Χθονίῳ καὶ ἱπαιτῇ Περσεφορέῃ  
Φησι, ΘΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΞΕΛΑΣΑΙ ΘΑΝΑΤΟΝ.

DANIEL HEINSIUS.

FINIS.

